


REIVINDICACIONES

1. Una forma cristalina de un compuesto de la siguiente Formula c28.

[Formula c28]



Donde,

(a) la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD= que incluye picos en ángulos de difracción 2θ) de $6.2^\circ \pm 0.2^\circ$, $7.2^\circ \pm 0.2^\circ$, $8.8^\circ \pm 0.2^\circ$, $15.4^\circ \pm 0.2^\circ$, $17.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $18.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $19.0^\circ \pm 0.2^\circ$, $22.5^\circ \pm 0.2^\circ$, $21.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $23.8^\circ \pm 0.2^\circ$ y $25.1^\circ \pm 0.2^\circ$ en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-K $_{\alpha}$; o

(b) la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD= que incluye picos en ángulos de difracción 2θ) de $5.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $7.0^\circ \pm 0.2^\circ$, $9.4^\circ \pm 0.2^\circ$, $11.0^\circ \pm 0.2^\circ$, $14.9^\circ \pm 0.2^\circ$, $17.7^\circ \pm 0.2^\circ$, $18.8^\circ \pm 0.2^\circ$, $20.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $21.8^\circ \pm 0.2^\circ$ y $23.5^\circ \pm 0.2^\circ$ en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-K $_{\alpha}$; o

(c) la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD= que incluye picos en ángulos de difracción 2θ) de $5.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $7.3^\circ \pm 0.2^\circ$, $15.7^\circ \pm 0.2^\circ$, $17.2^\circ \pm 0.2^\circ$, $18.9^\circ \pm 0.2^\circ$, $19.9^\circ \pm 0.2^\circ$, $21.2^\circ \pm 0.2^\circ$ y $21.9^\circ \pm 0.2^\circ$ en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-K $_{\alpha}$; o

(d) la forma cristalina tiene un espectro de difracción de rayos X (XRD= que incluye picos en ángulos de difracción 2θ) de $5.5^\circ \pm 0.2^\circ$, $7.2^\circ \pm 0.2^\circ$, $15.3^\circ \pm 0.2^\circ$, $17.2^\circ \pm 0.2^\circ$, $17.6^\circ \pm 0.2^\circ$, $18.9^\circ \pm 0.2^\circ$, $20.0^\circ \pm 0.2^\circ$, $21.1^\circ \pm 0.2^\circ$, $22.5^\circ \pm 0.2^\circ$ y $25.1^\circ \pm 0.2^\circ$ en el caso de ser irradiado usando una fuente de luz Cu-K $_{\alpha}$.

Solicitud No. NC2018/0014018
Reivindicaciones
Modificación Voluntaria
Recurso de reposición
Abril 13, 2022

2. Según la reivindicación 1, la forma cristalina (a) está caracterizada por tener un pico endotérmico de 159 ° C. en DSC (10 ° C./min).

5 3. Según la reivindicación 1, la forma cristalina (b) está caracterizada por tener un pico endotérmico a los 88 ° C. en DSC (10 ° C./min), y un segundo pico endotérmico a los 111°C, en DSC (10 °C/min).

10 4. Según la reivindicación 1, la forma cristalina (c) está caracterizada por tener un pico endotérmico a los 159 ° C. en DSC (10 ° C./min).

5. Según la reivindicación 1, la forma cristalina (d) está caracterizada por tener un pico endotérmico a los 160 ° C. en DSC (10 ° C./min).