

Figura 4

Clase	Gráfico	Grado de severidad en %	Descripción del daño
1		0%	No hay aparición de necrosis ni acervulos sobre la superficie del tejido, por lo tanto se toma como el 0 % del área total del fruto.
2		1-6%	Los signos de la necrosis avanzan con o sin la producción de acervulos color naranja-salmón sobre la superficie del tejido, hasta el 6% del area total del fruto. El resto del fruto comienza a perder la coloración rojo intenso a un rojo pálido.
3		7-25%	Los signos de la necrosis avanzan intensificando su color a un marrón más intenso con o sin la producción de acervulos color naranja-salmón sobre la superficie del tejido, hasta el 25% del área total del fruto.
4		26-50%	Los signos de la necrosis avanzan intensificando su color a un marrón más intenso con o sin la producción de acervulos color naranja-salmón sobre la superficie del tejido, hasta el 50% del área total del fruto. El resto del fruto comienza a perder la coloración rojiza a un rosa pálido.
5		51-75%	Los signos de la necrosis avanzan intensificando su color a un marrón más intenso con o sin la producción de acervulos color naranja-salmón sobre la superficie del tejido, hasta el 75% del área total del fruto. El resto de la superficie empieza a cambiar de rosa pálido a rosa amarillento.
6		76-100	Los signos de la necrosis avanzan intensificando su color a un marrón oscuro con o sin la producción de acervulos color naranja-salmón sobre la superficie del tejido, hasta el 100% del área total del fruto. En el proceso, el resto de la superficie empieza a cambiar de rosa amarillento a marrón claro hasta culminar completamente en marrón oscuro.