

REIVINDICACIONES

[Reivindicación 1]

Un método para suprimir la inflamación en las células intestinales de un animal no humano, que comprende administrar líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol a un animal no humano.

[Reivindicación 2]

Un método para suprimir la inflamación en las células intestinales de un animal no humano, que comprende: mezclar un alimento con líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol; y administrar el alimento a un animal no humano.

[Reivindicación 3]

Un método para suprimir la inflamación en las células intestinales de un animal no humano, que comprende: mezclar un alimento con 5 ppm a 1000 ppm (peso) de líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol; y administrar el alimento al animal no humano.

[Reivindicación 4]

El método para suprimir la inflamación en las células intestinales según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el animal no humano es un mamífero.

[Reivindicación 5]

El método para suprimir la inflamación en las células intestinales según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el animal no humano es un ave, un cerdo o un rumiante.

[Reivindicación 6]

El método para suprimir la inflamación en las células intestinales según

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el animal no humano es un rumiante.

[Reivindicación 7]

5 El método para suprimir la inflamación en las células intestinales en un animal no humano según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que la administración de líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol da como resultado supresión de la producción de una citocina inflamatoria en las células intestinales para suprimir la inflamación en las células intestinales del animal no humano.

10 [Reivindicación 8]

El método según la reivindicación 7, en el que la citocina inflamatoria es una o más de $\text{TNF}\alpha$, IL-6 y MCP-1.

[Reivindicación 9]

15 Un agente para suprimir la inflamación intestinal de un animal no humano, que comprende, como componentes activos, líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol.

[Reivindicación 10]

20 El agente para suprimir la inflamación intestinal de acuerdo con la reivindicación 9, en el que dicho agente comprende de 5 ppm a 1000 ppm (peso) de líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol.

[Reivindicación 11]

El agente para suprimir la inflamación intestinal según la reivindicación 9 o 10, en el que el ácido anacárdico, el cardanol y/o el cardol son componentes activos.

25 [Reivindicación 12]

Un agente para suprimir la producción de una citocina inflamatoria en las células intestinales de un animal no humano, que comprende, como componentes

activos, líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol.

[Reivindicación 13]

5 El agente para suprimir la producción de una citocina inflamatoria según la reivindicación 12, en el que dicho agente comprende de 5 ppm a 1000 ppm (en peso) de líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol.

[Reivindicación 14]

10 El agente para suprimir la producción de una citocina inflamatoria según la reivindicación 12, en el que el ácido anacárdico, el cardanol y/o el cardol son componentes activos.

[Reivindicación 15]

15 Uso de líquido de cáscara de anacardo, líquido de cáscara de anacardo calentado, ácido anacárdico, cardanol y/o cardol en la fabricación de un agente para suprimir la producción de una citoquina inflamatoria en células intestinales de un animal no humano.