


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de la Fórmula (I'):




Fórmula (I');

En donde:

X es N o C(R₆);

Y es alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉,



o C_6H_4 , en donde alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, o heteroarilo C₂-C₉ son opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, o 4 R₇;

L₁ es un enlace, -O-, -C(O)-, -N(R₉)-, -N(R₉)CH₂-, o -CH₂N(R₉)-

R₁ es cicloalquilo C₃-C₆ sustituido por 1, 2, o 3 R₁₃;

R₂, R₃, y R₄ se selecciona independientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C₁-C₆, y deuteroalquilo C₁-C₆;

R₅ es hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

cada R₆ se selecciona independientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C₁-C₆, y deuteroalquilo C₁-C₆;

cada R₇ se selecciona independientemente de deuterio, halógeno, alquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉, oxo, -OR₁₀, -N(R₁₀)₂, -CN, -C(=O)R₁₁, -C(=O)OR₁₀, -C(=O)N(R₁₀)₂, -NR₁₀C(=O)R₁₁, -NR₁₀S(=O)₂R₁₁, -S(=O)₂R₁₁, y -S(=O)₂N(R₁₀)₂, en donde cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉ son opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo C₂-C₉, -OR₁₂, -N(R₁₂)₂, -C(=O)OR₁₂, y -C(=O)N(R₁₂)₂; o dos R₇ se combinan para formar un anillo heterocicloalquilo de 5, 6 o 7 miembros o un anillo cicloalquilo de 4, 5 o 6 miembros;

R₈ es hidrógeno, deuterio, halógeno, alquilo C₁-C₆, o deuterioalquilo C₁-C₆;

R₉ es hidrógeno o alquilo C₁-C₆;

cada R₁₀ se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, y fenilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo C₂-C₉, -OR₁₂, -N(R₁₂)₂, -C(=O)OR₁₂, y -C(=O)N(R₁₂)₂;

cada R₁₁ se selecciona independientemente de alquilo C₁-C₆, y heteroalquilo C₁-C₆;

cada R₁₂ se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C₁-C₆ y haloalquilo C₁-C₆;

cada R₁₃ se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C₁-C₆, deuterioalquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉, oxo, -OR₁₀, -N(R₁₀)₂, -CN, -C(=O)R₁₁, -C(=O)OR₁₀, -C(=O)N(R₁₀)₂, -NR₁₀C(=O)R₁₁, -NR₁₀S(=O)₂R₁₁, -S(=O)₂R₁₁, y -S(=O)₂N(R₁₀)₂, en donde cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉ son opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, heteroarilo C₂-C₉, -OR₁₂, -N(R₁₂)₂, -C(=O)OR₁₂, y -C(=O)N(R₁₂)₂; y

n es 0, 1, 2, 3, o 4;

o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.


2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es arilo C₆-C₁₀ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o reivindicación 2, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es heteroarilo C₂-C₉ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

5. El compuesto de conformidad con la reivindicación 4, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es heteroarilo C₂-C₉ seleccionado de oxazolilo, tiazolilo, pirazolilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo, en los que oxazolilo, tiazolilo, pirazolilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 R₇.

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal o solvato




farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es


7. El compuesto de conformidad con la reivindicación 6, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque n es 0, 1 o 2.

8. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R7 se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆.


9. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal o solvato




farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es



10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, o una sal o solvato



farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es




11. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R₁₃ se selecciona independientemente de halógeno, -OH, -CN, alquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, y oxo.

12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R_{13} se selecciona independientemente de halógeno, -OH, y -CN.

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_1 es ciclopropilo sustituido con 1 R_{13} .

14. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_1 es ciclobutilo sustituido con 1 o 2 R_{13} .

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal



16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-15, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L_1 es un enlace.

17. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-15, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L_1 es -N(H)-.

18. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-17, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_3 y R_4 se seleccionan independientemente de hidrógeno y alquilo C_1-C_6 .


19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_3 es hidrógeno y R_4 es alquilo C_1-C_6 .



20. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_3 es hidrógeno y R_4 es deuterioalquilo C_1-C_6 .

21. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_6 es hidrógeno.

22. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-21, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R_8 es hidrógeno.





23. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-22, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R_2 es hidrógeno.
24. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_5 es hidrógeno.
25. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es N.
26. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es $C(R_6)$.
27. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-24, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es $C(H)$.
28. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de:








; o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

29. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de:











farmacéuticamente aceptable del mismo.

30. Un compuesto caracterizado porque tiene la estructura de la Fórmula (I) o Fórmula (II):



Fórmula (I);





Fórmula (II);

En donde:

X es N o C(R₆);

Y es alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, heteroarilo C₂-C₉,



o , en donde alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₂-C₉, arilo C₆-C₁₀, o heteroarilo C₂-C₉ son opcionalmente sustituidos por 1, 2, 3, o 4 R₇;

L_1 es un enlace, $-O-$, $-C(O)-$, $-N(R_9)-$, $-N(R_9)CH_2-$, o $-CH_2N(R_9)-$;

R_1 se selecciona de hidrógeno, deuterio, alquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , $-C_1-C_6$ alquil- C_3-C_6 cicloalquilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , y heteroarilo C_2-C_9 , en donde alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , $-C_1-C_6$ alquil- C_3-C_6 cicloalquilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , o heteroarilo C_2-C_9 son opcionalmente sustituidos por 1, 2, o 3 R_7 ;

R_2 , R_3 , y R_4 se selecciona independientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C_1-C_6 , y deuteroalquilo C_1-C_6 ;

R_5 es hidrógeno o alquilo C_1-C_6 ;

cada R_6 se selecciona independientemente de hidrógeno, deuterio, alquilo C_1-C_6 , y deuteroalquilo C_1-C_6 ;

cada R_7 se selecciona independientemente de deuterio, halógeno, alquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo C_6-C_{10} , heteroarilo C_2-C_9 , oxo, $-OR_{10}$, $-N(R_{10})_2$, $-CN$, $-C(=O)R_{11}$, $-C(=O)OR_{10}$, $-C(=O)N(R_{10})_2$, $-NR_{10}C(=O)R_{11}$, $-NR_{10}S(=O)_2R_{11}$, $-S(=O)_2R_{11}$, y $-S(=O)_2N(R_{10})_2$, en donde cicloalquilo C_3-C_6 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , arilo C_6-C_{10} , heteroarilo C_2-C_9 son opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , heteroarilo C_2-C_9 , $-OR_{12}$, $-N(R_{12})_2$, $-C(=O)OR_{12}$, y $-C(=O)N(R_{12})_2$; o dos R_7 se combinan para formar un anillo heterocicloalquilo de 5, 6 o 7 miembros o un anillo cicloalquilo de 4, 5 o 6 miembros;

R_8 es hidrógeno, deuterio, halógeno, alquilo C_1-C_6 , o deuteroalquilo C_1-C_6 ;

R_9 es hidrógeno o alquilo C_1-C_6 ;

cada R_{10} se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , y fenilo, en donde el fenilo está opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 grupos seleccionados de halógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , heteroarilo C_2-C_9 , $-OR_{12}$, $-N(R_{12})_2$, $-C(=O)OR_{12}$, y $-C(=O)N(R_{12})_2$;

cada R_{11} se selecciona independientemente de alquilo C_1-C_6 , y heteroalquilo C_1-C_6 ;


cada R_{12} se selecciona independientemente de hidrógeno, alquilo C_1-C_6 y haloalquilo C_1-C_6 ;

y

n es 0, 1, 2, 3, o 4;


o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

31. El compuesto de conformidad con la reivindicación 30, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque tiene la estructura de la Fórmula (I):



Fórmula (I).

32. El compuesto de conformidad con la reivindicación 30, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque tiene la estructura de la Fórmula (II):



Fórmula (II).


33. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-32, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es arilo C₆-C₁₀ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

34. El compuesto de conformidad con la reivindicación 33, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es fenilo opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

35. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-34, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es heteroarilo C₂-C₉ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

36. El compuesto de conformidad con la reivindicación 35, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es heteroarilo C₂-C₉ seleccionado de oxazolilo, tiazolilo, pirazolilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo, en los que oxazolilo, tiazolilo, pirazolilo, furanilo, tienilo, pirrolilo, imidazolilo, triazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 R₇.


37. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-32, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es




38. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque n es 0, 1 o 2.

39. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-38, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R₇ se selecciona independientemente de halógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆.


40. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-32, o una sal




o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es



41. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-32, o una sal



o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque Y es



42. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-41, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es hidrógeno, alquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, -C₁-C₆alquil-C₃-C₆cicloalquilo, C₂-

C₉heterocicloalquilo, y heteroarilo C₂-C₉, en donde alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, -C₁-C₆alquil-C₃-C₆cicloalquilo, heterocicloalquilo C₂-C₉, o heteroarilo C₂-C₉ son opcionalmente sustituidos con 1, 2, o 3 R₇.

43. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-42, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es hidrógeno.

44. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-42, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es alquilo C₁-C₆ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

45. El compuesto de conformidad con la reivindicación 44, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es alquilo C₁-C₆ no sustituido.

46. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-42, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es cicloalquilo C₃-C₆ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

47. El compuesto de conformidad con la reivindicación 46, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es cicloalquilo C₃-C₆ no sustituido.

48. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-42, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es heterocicloalquilo C₂-C₉ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.

49. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-42, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₁ es heteroarilo C₂-C₉ opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 R₇.


50. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-49, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L₁ es un enlace.






















51. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-49, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque L₁ es -N(H)-.


52. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-51, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₃ y R₄ se seleccionan independientemente de hidrógeno y alquilo C₁-C₆.

53. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-52, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R₃ es hidrógeno y R₄ es alquilo C₁-C₆.

54. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-52, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_3 es hidrógeno y R_4 es deuterioalquilo C_1-C_6 .
55. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-54, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_6 es hidrógeno.
56. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-55, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R_8 es hidrógeno.
57. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-56, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque cada R_2 es hidrógeno.
58. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-57, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque R_5 es hidrógeno.
59. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-58, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es N.
60. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-58, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es $C(R_6)$.
61. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 30-58, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque X es $C(H)$.
62. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de:








farmacéuticamente aceptable del mismo.

63. Un compuesto caracterizado porque se selecciona de:



64. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-63 o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

65. Un método para tratar una enfermedad inflamatoria o autoinmune en un paciente que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar al paciente una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-63, o una sal o solvato farmacéuticamente aceptable del mismo.

66. El método de conformidad con la reivindicación 45, caracterizado porque la enfermedad se selecciona de artritis reumatoide, esclerosis múltiple, psoriasis, lupus, enfermedad intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, espondilitis anquilosante, vitíligo y dermatitis atópica.