

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica intravenosa que comprende:
 - (a) 500 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF);
 - (b) 1 mM a 50 mM de glicina;
 - (c) 1 mM a 50 mM de histidina;
 - (d) menos de 300 mM de cloruro de sodio;
 - (e) 0,01 % a 0,05 % de polisorbato 20 o polisorbato 80; y
 - (f) 0,5 % a 20 % (p/p) de sacarosa;en donde la composición tiene un pH en un rango de 6,0 a 8,0; y
en donde la composición proporciona una actividad total del rVWF que permite incrementar el nivel plasmático de rVWF a entre 50 y 100 IU/dL.
2. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 1000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).
3. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 2000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).
4. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 3000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).
5. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 4000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).
6. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 5000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).
7. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 6000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).

8. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 7000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).

9. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 8000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).

10. La composición farmacéutica intravenosa de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la composición comprende 9000 IU/mL a 10000 IU/mL de factor de Von Willebrand recombinante (rVWF).