



CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula general (I):



en donde

R¹ representa un grupo de la Fórmula




en donde

representa el punto de unión con el anillo 1,2,4-triazolilo,

o una de las sales farmacéuticamente aceptables de estos, solvatos de estos o solvatos de las sales de estos.


2. El compuesto de fórmula general (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R¹ representa un grupo de la Fórmula



en donde


representa el punto de unión con el anillo 1,2,4-triazolilo.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que es (2S)-3-[1-({5-carbamoil-1-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-3-il}metil)-3-(4-clorofenil)-5-oxo-1,5-dihidro-4H-1,2,4-triazol-4-il]-1,1,1-trifluoropropan-2-il fosfato dihidrógeno de acuerdo con la Fórmula a continuación:




o una de las sales farmacéuticamente aceptables de estos, solvatos de estos o solvatos de las sales de estos.

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que es (2S)-3-[1-({5-carbamoil-1-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-3-il}metil)-3-(4-clorofenil)-5-oxo-1,5-dihidro-4H-1,2,4-triazol-4-il]-1,1,1-trifluoropropan-2-il fosfato dihidrógeno de acuerdo con la fórmula a continuación:



5. Un proceso para preparar un compuesto de la Fórmula general (I) o una de las sales farmacéuticamente aceptables de estos, solvatos de estos o solvatos de las sales de estos de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde

[A] un compuesto de la Fórmula




en donde

R¹ tiene el significado como se define para los compuestos de la Fórmula general (I) dado en la Reivindicación 1,

se hace reaccionar en el primer paso con oxiclورو de fósforo y en el segundo paso se hidroliza para proporcionar un compuesto de la Fórmula general (I),

o

[B] un compuesto de la Fórmula



en donde

R¹ tiene el significado como se define para los compuestos de la Fórmula general (I) dado en la Reivindicación 1,

se hace reaccionar en el primer paso con difosfato de tetrabencilo y en el segundo paso los grupos bencilo se retiran en condiciones de reducción para proporcionar un compuesto de la Fórmula general (I),

opcionalmente le sigue, cuando fuera apropiado, convertir el compuesto de la Fórmula general (I) en sus correspondientes sales farmacéuticamente aceptables de estos, solvatos de estos o los solvatos de las sales de estos por tratamiento con los solventes y/o bases correspondientes.

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se define en cualesquiera de las Reivindicaciones 1 a 4 y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

7. La composición farmacéutica de la Reivindicación 6 que comprende un compuesto de Fórmula general (I) de acuerdo con cualesquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, y un agente terapéutico adicional que se selecciona del grupo que consiste en diuréticos, antagonistas de angiotensina AII, inhibidores de ECA, bloqueadores del receptor beta, antagonistas del receptor mineralocorticoide, nitratos orgánicos, donantes de NO, activadores y estimuladores de la guanilato ciclasa soluble y agentes inotrópicos positivos, agentes antiinflamatorios, agentes inmunosupresores, aglutinantes de fosfato y/o compuestos que modulan el metabolismo de vitamina D.
