

REIVINDICACIONES

1. Una composición fungicida que comprende:

el componente (A): protioconazol; y

el componente (B): clorotalonilo,

5 donde la relación en peso del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonil es 1:14,1.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, donde la cantidad total del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonilo presentes en la composición es del 5% al 99% en peso. ~~preferentemente donde la cantidad total del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonilo presentes en la composición es del 20% al 80% en peso.~~

10

3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, donde la cantidad total del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonilo presentes en la composición es del 20 al 80% en peso.

15

~~34.~~ La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el protioconazol está presente en una cantidad de al menos el 0.5% en peso. ~~preferentemente donde el protioconazol está presente en una cantidad de hasta el 70% en peso.~~

20

5. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el protioconazol está presente en una cantidad de hasta el 70%.

25

~~46.~~ La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el clorotalonilo está presente en una cantidad de al menos el 0.5% en peso. ~~preferentemente donde el clorotalonilo está presente en una cantidad de hasta el 70% en peso.~~

30

7. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el clorotalonilo está presente en una cantidad de hasta el 70% en peso.

58. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde el protioconazol está presente en una cantidad del 1 al 50% en peso; ~~y/o~~ donde el clorotalonilo está presente en una cantidad del 2 al 50% en peso.

~~6. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:30 a 1:1; preferentemente donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:5 a 1:25; más preferentemente donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:10 a 1:20.~~

79. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, que comprende además uno o más agentes auxiliares seleccionados de ~~diluyentes, portadores, disolventes y , tensioactivos, estabilizantes, agentes antiespumantes, agentes anticongelantes, conservantes, antioxidantes, colorantes, espesantes, adherentes sólidos y rellenos inertes.~~

810. La composición de acuerdo con cualquier precedente, donde la formulación es ~~un concentrado hidrosoluble (SL), un concentrado emulsionable (EC), una emulsión de aceite en agua (EW), una microemulsión (ME), un concentrado en suspensión (SC) o, un concentrado en suspensión a base de aceite (OD), un concentrado fluido (FS), gránulos dispersables en agua (WG), gránulos hidrosolubles (SG), un polvo humectable (WP), un polvo hidrosoluble (SP), gránulos (GR), gránulos encapsulados (CG), gránulos finos (FG),~~

~~macrogránulos (GG), una suspoemulsión acuosa (SE), una suspensión de cápsulas (CS) o microgránulos (MC).~~

911. Un método para el control y/o la prevención de infestaciones fúngicas en una planta que comprende aplicar a la planta, partes de la planta o el locus de esta:

el componente (A): protioconazol; y

el componente (B): clorotalonilo,

donde la relación en peso del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonil es 1:14,1.

~~10. El método de acuerdo con la reivindicación 9, donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:30 a 1:1; preferentemente donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:5 a 1:25; más preferentemente donde la proporción en peso de protioconazol respecto a clorotalonilo es de 1:10 a 1:20.~~

1112. El método de acuerdo con ~~cualquiera de las reivindicaciones 9 o 10~~ la reivindicación 11, donde la tasa de aplicación de la cantidad total del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonilo está en el intervalo de 10 a 3000 gramos de principios activos por hectárea (g/ha).

1213. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones ~~9-11~~ a 1112, donde la tasa de aplicación de protioconazol está en el intervalo de 10 a 300 g/ha; ~~y/o~~ donde la tasa de aplicación de clorotalonilo está en el intervalo de 100 a 2500 g/ha.

~~13. Uso de una combinación de:~~

~~el componente (A): protioconazol; y~~

~~el componente (B): clorotalonilo~~

~~en el control y/o la prevención de una infestación~~

~~fúngica de una planta.~~

~~14. Use de protioconazol para reducir la fitotoxicidad del clorotalonilo para plantas.~~

~~15. Use de clorotalonilo para reducir la fitotoxicidad del protioconazol para plantas.~~

~~16~~14. Un método para reducir la fitotoxicidad del clorotalonilo, que comprende utilizar clorotalonilo combinado con protioconazol, donde la relación en peso del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonil es 1:14,1.

·

~~17~~15. Un método para reducir la fitotoxicidad del protioconazol, que comprende utilizar protioconazol combinado con clorotalonilo, donde la relación en peso del componente (A) protioconazol y el componente (B) clorotalonil es 1:14,1.