

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende:

(a) Un inhibidor MCL-1 que es ácido (2*R*)-2-[[$(5S_a)$]-5-{3-cloro-2-metil-4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(5-fluorofuran-2-il)tieno[2,3-*d*]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[1-(2,2,2-trifluoroetil)-1*H*-pirazol-5-il]metoxi}fenil)propanoico o ácido (2*R*)-2-[[$(5S_a)$]-5-{3-cloro-2-metil-4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(4-fluorofenil)tieno[2,3-*d*]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[2-(2-metoxifenil)pirimidin-4-il]metoxi}fenil)propanoico, o sus enantiómeros, diastereoisómeros, atropisómeros, o sales de adición de los mismos con un ácido o una base farmacéuticamente aceptables, y (b) un compuesto taxano que es paclitaxel o docetaxel.

2. Una composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el inhibidor de MCL-1 es ácido (2*R*)-2-[[$(5S_a)$]-5-{3-cloro-2-metil-4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(5-fluorofuran-2-il)tieno[2,3-*d*]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[1-(2,2,2-trifluoroetil)-1*H*-pirazol-5-il]metoxi}fenil)propanoico.

3. Una composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el inhibidor de MCL-1 es ácido (2*R*)-2-[[$(5S_a)$]-5-{3-cloro-2-metil-4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(4-fluorofenil)tieno[2,3-*d*]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[2-(2-metoxifenil)pirimidin-4-il]metoxi}fenil)propanoico.

4. La composición farmacéutica según la reivindicación 1, que comprende además uno o más excipientes.

5. Un medicamento que contiene, por separado o conjuntamente,

(a) un inhibidor de MCL-1 como se define en la reivindicación 1, y

(b) un compuesto taxano como se define en la reivindicación 1,

para su administración simultánea, secuencial o separada, y en la que el inhibidor de MCL-1 y el compuesto taxano se proporcionan en cantidades efectivas para el tratamiento del cáncer.