



CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de la Fórmula general (I),



caracterizado porque:

A se selecciona del grupo que consiste en



G es S,

R¹ es hidrógeno o metilo,

R² se selecciona del grupo que consiste en

hidrógeno, cloro, flúor,

-NH₂, -NH(CH₃), -N(CH₃)₂,


metoxi, etoxi,

metilo, etilo, propilo, isopropilo, ciclopropilo,

trifluorometilo y trifluorometoxi,

R³ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, flúor, metilo, metoxi y trifluorometilo,

Q es un anillo fenilo sustituido de la Fórmula (Q1)



en la cual:

Z¹ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo y metoxi,


Z² se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, -OH, metilo, etilo, metoxi, etoxi, -NH(CH₃), -N(CH₃)₂, trifluorometilo, trifluorometoxi,

Z³ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo, metoxi, -NH(CH₃) y -N(CH₃)₂,

Z⁴ se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo y metoxi,


Z^5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo y metoxi,
 o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, o una sal del mismo.

2. Un compuesto de la Fórmula general (II):



caracterizado porque:

A se selecciona del grupo que consiste en




R^1 es hidrógeno o metilo,

R^2 se selecciona del grupo que consiste en
 hidrógeno, cloro, flúor,
 metoxi,
 metilo, etilo, propilo, isopropilo,
 trifluorometilo y trifluorometoxi,

R^3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, flúor, metilo, metoxi y trifluorometilo,

Q es un anillo fenilo sustituido de la Fórmula (Q1)



(Q1)

en la cual:

Z^1 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno,

Z^2 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, -
 N(alquilo- C_1-C_4)₂, - halógenoalquilo- C_1-C_4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno y
 halógenoalcoxi- C_1-C_4 que tiene de 1 a 5 átomos de halógeno,

Z^3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno,


Z^4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno,

Z^5 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y halógeno,

o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, o una sal del mismo.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 2, caracterizado porque

A se selecciona del grupo que consiste en




R¹ es hidrógeno,

R² es isopropilo,

R³ es metilo,

Q es un anillo fenilo sustituido de la Fórmula (Q1)




(Q1)

en la cual:

Z¹, Z³, Z⁴ y Z⁵ se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, flúor y cloro, y

Z² se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, -N(CH₃)₂, trifluorometilo y trifluorometoxi, o un estereoisómero, un tautómero, un N-óxido, un hidrato, una sal del mismo.

4. Un procedimiento para preparar un compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, dicho procedimiento comprende la etapa de permitir un compuesto intermedio de la Fórmula general **1N**:




1N,

en la cual G, A, R¹, R³ y Q son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, para reaccionar con un compuesto de la Fórmula general **1F**:

R²H

1F,

en la cual R² es como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, proporcionando así un compuesto de la Fórmula general (I) o (II):




(I)

(II)

en la cual G, A, R¹, R², R³ y Q son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,

o la etapa de permitir un compuesto intermedio de la Fórmula general **1T**:



1T,

en la cual G, A, R¹, R² y R³ son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y en donde Hal es halógeno, particularmente cloro, bromo o yodo,


para reaccionar con un compuesto de la Fórmula general **1H**:




1H,

en la cual Q es como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con la Reivindicación 1 y cada R está individualmente H o Me o ambos R son pinacolato,

proporcionando así un compuesto de la Fórmula general (I) o (II):




(I)



(II)

en la cual G, A, R¹, R², R³ y Q son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,

o la etapa de permitir un compuesto intermedio de la Fórmula general **1W**:



1W,

en la cual G, Q, R² y R³ son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,


para reaccionar con un compuesto de la Fórmula general **1M**:




1M,

en la cual R¹ y A son como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,

proporcionando así un compuesto de la Fórmula general (I) o (II):



en la cual G, A, R¹, R², R³ y Q son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,
o la etapa de permitir un compuesto intermedio de la Fórmula general **1X**:




en la cual G, Q, A, R¹ y R³ son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,
para reaccionar con un compuesto de la Fórmula general **1Y**:




en la cual R² es alcoxi-C₁-C₄ que está opcionalmente sustituido según se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,

proporcionando así un compuesto de la Fórmula general (I) o (II):



en la cual G, A, R¹, R³ y Q son como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y R² es alcoxi-C₁-C₄ que está opcionalmente sustituido según se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,
o la etapa de permitir un compuesto intermedio de la Fórmula general **1N**:



en la cual G, Q, A, R¹ y R³ son como se definen para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3,


para reaccionar con un compuesto de la Fórmula general **2A**:



2A,


en la cual R² es alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, alqueno-C₂-C₄, cicloalqueno-C₃-C₆, alquino-C₂-C₄ o fenil-alquilo-C₁-C₄, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido como se define para el compuesto de Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 3, Met es magnesio o zinc, y X es cloro, bromo o yodo,

proporcionando así un compuesto de la Fórmula general (I) o (II):



en la cual G, A, R¹, R³ y Q son como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y R² es alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, alqueno-C₂-C₄, cicloalqueno-C₃-C₆, alquino-C₂-C₄ o fenil-alquilo-C₁-C₄, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido según se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II), de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3.

5. Un compuesto de la Fórmula general (VI-INT-1), (VI-INT-2), (VI-INT-3) o (IV-INT-1):



caracterizado porque

R^A se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo y *t*-butilo;

R² se selecciona del grupo que consiste en alquilo-C₁-C₆ y cicloalquilo-C₃-C₆,

R^3 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo- C_1-C_4 , y cicloalquilo- C_3-C_6 , y

A y R^1 son como se define en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, con la condición de que en la formula (VI_INT-3) cuando R^2 es isopropilo R^3 no es metilo.

6. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de la Fórmula general (I) o (II) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- En la Reivindicación 4 se limita la definición de R^2 a “ R^2 es como se define para el compuesto de la Fórmula general (I) o (II)”, y se eliminan completamente los sustituyentes “ R^9 , R^{10} , R^{11} y R^{12} ”.