

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica líquida para administración parenteral que comprende semaglutida y no más de 0.01 % (p/p) de fenol, en donde dicha composición
5
 - a. es una solución acuosa que comprende al menos 60 % p/p de agua; y/o
 - b. comprende además uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables seleccionados del grupo que consiste en un tampón y/o un agente isotónico.
- 10 2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición no comprende fenol.
3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la concentración de semaglutida es de 0.5-10 mg/ml o 0.01-5 mg/ml de dicha
15 composición.
4. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición comprende uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables seleccionados del grupo que consiste en un tampón y/o un agente isotónico.
20
5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde dicho tampón está presente en una concentración de 0,01-50 mM de dicha composición.
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 4, en donde dicho tampón es un
25 tampón de fosfato.
7. La composición de acuerdo con la reivindicación 6, en donde dicho tampón de fosfato es seleccionado del grupo que consiste de fosfato de dihidrógeno de sodio, fosfato de hidrógeno disódico y fosfato de sodio.
30
8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 4-7, en donde dicho agente isotónico es propilenglicol o cloruro de sodio.
9. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde
35 dicha composición no comprende conservante.
10. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición tiene un pH en el intervalo de 6.0-10.0, tal como 7.0-7.8.

- 11. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición es para administración subcutánea.
- 5 12. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición comprende 0.5-5 mg/ml de semaglutida, propilenglicol y 1.42 mg/ml de dihidrato de hidrógeno fosfato de disodio.
- 10 13. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde dicha composición comprende 0.5-5 mg/ml de semaglutida, cloruro de sodio y 1.42 mg/ml de dihidrato de hidrógeno fosfato de disodio.