


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

Q se selecciona a partir de N y CH;

el anillo A es heterociclilo de 4 a 15 miembros sustituido por 1-4 R₇;

R₁ se selecciona de CH₃ y CD₃ y -CH₂-heterociclilo de 5 miembros que comprende átomos de carbono y de 1 a 3 heteroátomos seleccionados a partir de N, NalquiloC₁₋₄, O, y S;

R₂ se selecciona de H, alquilo C₁₋₃ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r cicloalquilo C₃₋₆ sustituido por 0-5 R_e;

R₃ se selecciona de H, F, Cl, Br, -OR_b, y alquilo C₁₋₃ sustituido por 0-5 R_e;

L está ausente o se selecciona de NR_d-, -O-, -C(=O)NR_d-, y -S(O)_p-;

R₄ se selecciona de -(CH₂)_r-arilo sustituido por 1-7 R₅, -(CH₂)_r-cicloalquilo C₃₋₆ (sustituido con 1-2 OR_b, C(=O)OR_b, -C(=O)NR_aR_a, -NR_aC(=O)R_b), -(CH₂)_r-heterociclilo que comprende átomos de carbono y 1-3 heteroátomos seleccionados de N, NR₆, O, y S y sustituido por 1-7 R₅;

R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, =O, nitro, alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-5 R_e, alqueno C₂₋₄ sustituido por 0-5 R_e, alquino C₂₋₄ sustituido por 0-5 R_e, -(CHR_d)_rOR_b, -(CHR_d)_rS(O)_pR_c, -(CHR_d)_rS(O)_pNR_aR_a, -(CHR_d)_rNR_aS(O)_pR_c, -(CHR_d)_rNR_aR_a, -(CHR_d)_rNR_aC(=O)R_b, -(CHR_d)_rNR_aC(=O)OR_b, -(CHR_d)_rNR_aC(=O)NR_aR_a, -(CHR_d)_rC(=O)R_b, -(CHR_d)_rC(=O)OR_b, -(CHR_d)_rC(=O)NR_aR_a, -(CHR_d)_rOC(=O)R_b, -(CHR_d)_rOC(=O)OR_b, -(CHR_d)_rO(CH₂)_rC(=O)NR_aR_a, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido por 0-4 R_e, arilo sustituido por 0-4 R_e, y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R₆ se selecciona de H, alquilo C₁₋₃ sustituido por 0-4 R_e, -S(O)_pR_c, -(CH₂)_rC(=O)R_b, -(CH₂)_rC(=O)OR_b, -(CH₂)_rC(=O)(CH₂)_rNR_aR_a, -C(=O)(CH₂)_rNR_aC(=O)R_b,

-S(O)_pNR_aR_a, -(CH₂)_r cicloalquilo -C₃₋₆ sustituido por 0-4 R_e, -(CH₂)_r-arilo sustituido por 0-4 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R₇ se selecciona de H, F, Cl, CN, alquilo C₁₋₃, =N-OR_b, -(CH₂)_rOR_b, -(CH₂)_rNR_aR_a, -NR_aC(=NH) alquilo C₁₋₃, -NR_aC(=O)OR_b, carbociclilo, y heterociclilo; alternativamente, dos grupos R₇ se toman juntos para formar carbociclilo o heterociclilo;

R_8 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, y alquilo C_{1-4} sustituido por 0-5 R_e ;

R_a , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ; o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e ;

R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_c , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-6} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_d , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , y OH,



R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_f , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , $-(CH_2)_r$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_r$ -arilo, $-(CH_2)_r$ -heterociclilo, Si(alquilo C_{1-4})₃, F, Cl, Br, CN, NO₂, =O, CO₂H, $-(CH_2)_rOR_f$, S(O)_p R_f , C(=O)NR_f R_f , S(O)_pNR_f R_f , y $-(CH_2)_rNR_fR_f$;

R_f , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C_{1-5} opcionalmente sustituido por OH, alqueno C_{2-5} , alquino C_{2-5} , cicloalquilo C_{3-6} , y fenilo, o R_f y R_f junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico opcionalmente sustituido por alquilo C_{1-4} ;


p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2;

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4;

siempre que:

- (1) cuando L está ausente, R_4 no es , y
- (2) cuando L es $-NR_d$, R_4 no es , y
- (3) cuando L es $-O$, R_4 no es cicloalquilo C_{3-6} .

2. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:





R_1 se selecciona de CH_3 y CD_3 ;


R_2 se selecciona de metilo, etilo y $-CH_2$ -ciclopropilo sustituido por 0-3 Re;

R_3 se selecciona de H, F, Cl, Br, y -Oalquilo C_{1-4} ;

L está ausente o se selecciona de NR_d -, -O-, $-C(=O)NH$ -, -S-, y $-S(O)_2$;







R_5 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, =O, alquilo C_{1-4} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-4} , alquino C_{2-4} , $-(CHR_d)_rOR_b$, $-(CH_2)_rS(O)_pR_c$, $-(CH_2)_rS(O)_pNR_aR_a$, $-(CH_2)_rNR_aS(O)_pR_c$, $-(CH_2)_rNR_aR_a$, $-(CH_2)_rNR_aC(=O)R_b$, $-(CH_2)_rNR_aC(=O)OR_b$, $-(CH_2)_rNR_aC(=O)NR_aR_a$, $-(CH_2)_rC(=O)R_b$, $-(CH_2)_rC(=O)OR_b$, $-(CHR_d)_rC(=O)NR_aR_a$, $-(CH_2)_rOC(=O)R_b$, $-(CH_2)_rOC(=O)OR_b$, $-(CH_2)_rO(CH_2)_rC(=O)NR_aR_a$, cicloalquilo C_{3-6} sustituido por 0-4 R_e , arilo sustituido por 0-4 R_e , y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e ;

R_6 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-3} sustituido por 0-4 R_e , $-S(O)_pR_c$, $-C(=O)R_b$, $-(CH_2)_rC(=O)OR_b$, $-(CH_2)_rC(=O)(CH_2)_rNR_aR_a$, $-C(=O)(CH_2)_rNR_aC(=O)R_b$, $-S(O)_pNR_aR_a$, $-(CH_2)_r$ -arilo sustituido por 0-4 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-4 R_e ;

R_a , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ; o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e ;

R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_c , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alqueno C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquino C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-6} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_d , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , y OH;


R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_f , alqueno C_{2-6} , alquino C_{2-6} , $-(CH_2)_r$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_r$ -arilo, $-(CH_2)_r$ -heterociclilo, F, Cl, Br, CN, NO_2 , =O, $-NH_2$, $-N$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4})₂, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, y $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} ;

R_f , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C_{1-5} opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C_{3-6} , y fenilo;


p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

3. El compuesto según la Reivindicación 2, de la Fórmula (II):





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R₂ se selecciona de CH₃, CH₂CH₃ y -CH₂-ciclopropilo sustituido por 0-2 F, Cl, y CH₃;

R₃ se selecciona de H, F, y -OalquiloC₁₋₄;





R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, =O, alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-4 R_e, -(CHR_d)_rOR_b, -(CH₂)_rS(O)_pR_c, -S(O)_pNR_aR_a, -(CH₂)_rNR_aS(O)_pR_c, -(CH₂)_rNR_aR_a, -(CH₂)_rNR_aC(=O)R_b, -NR_aC(=O)OR_b, -NR_aC(=O)NR_aR_a, -(CH₂)_rC(=O)R_b, -(CH₂)_rC(=O)OR_b, -(CHR_d)_rC(=O)NR_aR_a, -(CH₂)_rOC(=O)R_b, -(CH₂)_rOC(=O)OR_b, -(CH₂)_rO(CH₂)_rC(=O)NR_aR_a, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido por 0-4 R_e, arilo sustituido por 0-4 R_e, y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R₆, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₃ sustituido por 0-4 R_e, -S(O)_pR_c, -C(=O)R_b, -(CH₂)_rC(=O)OR_b, -(CH₂)_rC(=O)NR_aR_a, -C(=O)(CH₂)_rNR_aC(=O)R_b, -S(O)_pNR_aR_a, arilo sustituido por 0-4 R_e, y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R_a, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquenilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquinilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₁₀ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e ;

R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_c , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-6} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_d , en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e ;


R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_f , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , $-(CH_2)_r$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_r$ -arilo, $-(CH_2)_r$ -heterociclilo, F, Cl, Br, CN, NO_2 , $=O$, $-NH_2$, $-N$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, y $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} ;

R_f , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C_{1-5} opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C_{3-6} , y fenilo;

p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y


r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

4. El compuesto según la Reivindicación 3 de la Fórmula (III):



(III)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R_2 es $-CH_2$ -ciclopropilo;

R_3 es alquilo $-OC_{1-4}$;

R_5 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, alquilo C_{1-4} sustituido por 0-4 R_e , $-(CHR_d)_rOR_b$, $-(CH_2)_rS(O)_pR_c$, $-S(O)_pNR_aR_a$, $-(CH_2)_rNHS(O)_pR_c$, $-(CH_2)_rNR_aR_a$, $-(CH_2)_rNHC(=O)R_b$, $-NHC(=O)OR_b$, $-(CHR_d)_rC(=O)NR_aR_a$, $-(CH_2)_rC(=O)OR_b$, $-OC(=O)OR_b$, $-O(CH_2)_{0-1}C(=O)NR_aR_a$, cicloalquilo C_{3-6} sustituido por 0-4 R_e , arilo sustituido por 0-4 R_e , y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e ;

R_a , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e ;

R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -alquilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_c , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-6} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_d , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} , y OH;

R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_f , alquenilo C_{2-6} , alquilo C_{2-6} , $-(CH_2)_r$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_r$ -arilo, $-(CH_2)_r$ -heterociclilo, F, Cl, Br, CN, NO_2 , =O, $-NH_2$, $-NH$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4})₂, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} , y SO_2 alquilo C_{1-4} ;

R_f , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C_{1-5} opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C_{3-6} , y fenilo;


p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

5. El compuesto según la Reivindicación 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R_3 es $-OCH_3$;

R_5 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_{0-1}OR_b$, $-S(O)_2NH_2$, $-NHS(O)_2$ alquilo C_{1-3} , $-NHS(O)_2$ alquenilo C_{2-4} ,




R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e ,

R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} , F, Cl, Br, CN, NO_2 , =O, $-NH_2$, $-NH$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4})₂, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} , y SO_2 alquilo C_{1-4} ; y


r en cada aparición, se selecciona independientemente a partir de cero y 1.

6. El compuesto según la Reivindicación 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R₂ es -CH₂-ciclopropilo;

R₃ es alquilo -OC₁₋₄;



R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-4 R_e, -(CH₂)_rOR_b, -S(O)_pR_c, -S(O)_pNR_aR_a, -(CH₂)_rNR_aS(O)_pR_c, -(CH₂)_rNR_aR_a, -(CH₂)_rNR_aC(=O)R_b, -NR_aC(=O)OR_b, -NR_aC(=O)NR_aR_a, -(CH₂)_rC(=O)R_b, -(CH₂)_rC(=O)OR_b, -(CH₂)_rC(=O)NR_aR_a, -(CH₂)_rOC(=O)R_b, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido por 0-4 R_e, arilo sustituido por 0-4 R_e, y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R_a, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquenilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquinilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₁₀ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e; o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e;

R_b, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquenilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-alquinilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₁₀ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

R_c, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquenilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquinilo C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₆ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

R_e, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_f, alquenilo C₂₋₆, alquinilo C₂₋₆, -(CH₂)_r-cicloalquilo C₃₋₆, -(CH₂)_r-arilo, F, Cl, Br, CN, NO₂, =O, -NH₂, -NH alquilo C₁₋₄, -N(alquilo C₁₋₄)₂, -C(=O)OH, -C(=O)O alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_rOH, y -(CH₂)_rO alquilo C₁₋₄;

R_f, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C₁₋₅ opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C₃₋₆, y fenilo;


p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

7. El compuesto según la Reivindicación 6 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:


R₃ es -OCH₃;

R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, alquilo C₁₋₄, -OH, -O alquilo C₁₋₃, -NHS(O)₂ alquenilo C₂₋₄, NHC(=O)O alquilo C₁₋₄, C(=O)NH₂,




R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} , F, Cl, Br, CN, NO_2 , $=O$, $-NH_2$, $-NH$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} , y SO_2 alquilo C_{1-4} .


8. El compuesto según la Reivindicación 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R_2 es $-CH_2$ -ciclopropilo;

R_3 es alquilo $-OC_{1-4}$;





R_5 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN alquilo C_{1-4} , $-OR_b$, $-S(O)_pR_c$, $-(CH_2)_rNR_aS(O)_pR_c$, $-(CH_2)_rNR_aR_a$, $-(CH_2)_rNR_aC(=O)R_b$, $-NR_aC(=O)OR_b$, $-C(=O)OR_b$, $C(=O)NR_aR_a$, cicloalquilo C_{3-6} sustituido por 0-4 R_e , arilo sustituido por 0-4 R_e , y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e ;

R_6 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-3} sustituido por 0-4 R_e , $-S(O)_pR_c$, $-C(=O)R_b$, $-C(=O)OR_b$, $-(CH_2)_r-C(=O)NR_aR_a$, $-C(=O)(CH_2)_rNR_aC(=O)R_b$, $-S(O)_pNR_aR_a$, arilo sustituido por 0-4 R_e , y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e ;

R_a , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ; o R_a y R_a junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocíclico sustituido por 0-5 R_e ;

R_b , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-10} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;

R_c , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_e , alquenilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , alquinilo C_{2-6} sustituido por 0-5 R_e , $-(CH_2)_r$ -carbociclilo C_{3-6} sustituido por 0-5 R_e , y $-(CH_2)_r$ -heterociclilo sustituido por 0-5 R_e ;


R_e , en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} sustituido por 0-5 R_f , alquenilo C_{2-6} , alquinilo C_{2-6} , $-(CH_2)_r$ -cicloalquilo C_{3-6} , $-(CH_2)_r$ -arilo, F, Cl, Br, CN, NO_2 , $=O$, $-NH_2$, $-NH$ alquilo C_{1-4} , $-N$ (alquilo C_{1-4}) $_2$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)O$ alquilo C_{1-4} , $-(CH_2)_rOH$, y $-(CH_2)_rO$ alquilo C_{1-4} ;

R_f , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C_{1-5} opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C_{3-6} , y fenilo;

p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y


r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

9. El compuesto según la Reivindicación 8 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




R_5 , en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, alquilo C_{1-4} y $-C(=O)OH$.

10. El compuesto según la Reivindicación 2 de la Fórmula (IV):




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R_2 se selecciona de CH_3 y $-CH_2$ -ciclopropilo;

R_3 se selecciona de H, F, y -Oalquilo C_{1-4} ;



R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_rOR_b, -NR_aS(O)_pR_c, -NR_aR_a, -NR_aC(=O)R_b, -NR_aC(=O)OR_b, -C(=O)OR_b, -C(=O)NR_aR_a, -NR_aC(=O)NR_aR_a, cicloalquilo C₃₋₆ sustituido por 0-4 R_e, arilo sustituido por 0-4 R_e, y heterociclilo sustituido por 0-4 R_e;

R₆, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₃;

R_a, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alqueno C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquino C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₁₀ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

R_b, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alqueno C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquino C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-C₃₋₁₀ carbociclilo sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

R_c, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alqueno C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, alquino C₂₋₆ sustituido por 0-5 R_e, -(CH₂)_r-carbociclilo C₃₋₆ sustituido por 0-5 R_e, y -(CH₂)_r-heterociclilo sustituido por 0-5 R_e;

R_d, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₃;

R_e, en cada aparición, se selecciona independientemente de alquilo C₁₋₆ sustituido por 0-5 R_f, alqueno C₂₋₆, alquino C₂₋₆, -(CH₂)_r- cicloalquilo C₃₋₆, -(CH₂)_r-arilo, F, Cl, Br, CN, NO₂, =O, -N(alquilo C₁₋₄)₂, -C(=O)OH, -C(=O)Oalquilo C₁₋₄, -(CH₂)_rOH, y -(CH₂)_rOalquilo C₁₋₄;

R_f, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, CN, OH, alquilo C₁₋₅ opcionalmente sustituido por OH, cicloalquilo C₃₋₆, y fenilo;


p, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, y 2; y

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1, 2, 3, y 4.

11. El compuesto según la Reivindicación 10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₂ es CH₂-ciclopropilo;

R₃ es -OCH₃;



R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, alquilo C₁₋₄ y (CH₂)₀₋₁OH; y


R_d es H.

12. El compuesto según la Reivindicación 2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

L es -C(=O)NH-;

R₂ es -CH₂-ciclopropilo;

R₃ es alquilo -OC₁₋₄;



R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, alquilo C₁₋₄, OH, y -CN; y


R₆, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₃.

13. El compuesto según la Reivindicación 2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

L es -O-;


R₂ es -CH₂-ciclopropilo;

R₃ es alquilo -OC₁₋₄;




R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de H, F, Cl, Br, alquilo C₁₋₄, -OH, y -CN.

14. Un compuesto de Fórmula (V):




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




R₂ es -CH₂-ciclopropilo;


R₃ es -OCH₃; y




15. El compuesto según la Reivindicación 2 de la Fórmula (VI):




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:




R₂ es -CH₂-ciclopropilo;






16. El compuesto según la Reivindicación 2 de la Fórmula (VII):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



R₄ se selecciona de , , y ;

R₅, en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, alquilo C₁₋₄, -(CH₂)_rOR_b, -S(O)₂NR_aR_a, -NR_aS(O)₂R_c, y -C(=O)NR_aR_a;

R₆, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₃;

R_a, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-5 R_e;

R_b, en cada aparición, se selecciona independientemente de H y alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-5 R_e;

R_c, en cada aparición, es independientemente alquilo C₁₋₄ sustituido por 0-5 R_e;

R_e, en cada aparición, se selecciona independientemente de F, Cl, Br, -OH, y -OalquiloC₁₋₄;

r, en cada aparición, se selecciona independientemente de cero, 1 y 2.

17. Una composición farmacéuticamente aceptable que comprende el compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, y un portador, adyuvante o vehículo farmacéuticamente aceptable.

18. La composición de acuerdo con la Reivindicación 17, en combinación con un agente terapéutico adicional.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 19 a 22.