




cada R^X se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en alquilo C_1 – C_6 , hidroxi–alquilo C_1 – C_6 , fluoro, cloro, oxo, $-OH$, $-OCH_3$, $-C(O)OH$, $-C(O)OCH_3$, y G^2 ;

cada R^Y se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, oxo, $-CN$, $-OH$, $-CF_3$, $-CHF_2$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH_2CH_2CH_2CH_3$, $-CH=CHCH_2OH$, $-CH_2CH_2OH$, $-CH_2NH_2$, $-NHCH_3$, $-CH_2NHC(O)CH_3$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-C(CH_3)_2OH$, $-CH(CH_3)_2$, $-CH_2CH_2CH_3$, $-C(CH_3)_3$, $-CH_2CH(CH_3)_2$, $-CH_2CH_2OH$, $-CH(OH)CH_3$, $-CH_2CH_2CH_2OCH_3$, $-CH_2CF_3$, $-CH_2C(CH_3)_2OH$, $-CH_2SCH_3$, $-CH_2CN$, $-CH_2CH_2CN$, $-CH_2CH_2C(CH_3)_2OH$, $-CH_2NHC(O)CH_3$, $-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2OCH_3$, $-OCH(CH_3)_2$, $-OCF_3$, $-OCH_2CF_3$, $-OCH_2CH_2N(CH_3)_2$, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-OCH_2CH_2OH$, $-OCHF_2$, $-OCF_3$, $-OCH_3$, $-CH_2OH$, $-C(O)OH$, $-C(O)CH_3$, $-C(O)OCH_3$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NHCH_2CH_2CH_2OH$, $-CH_2CN$, $-C(O)OCH_2CH_3$, $-C(O)NHCH_2CH_3$, $-OCH_2CH_2OSi(CH_3)_2C(CH_3)_3$, $-CH_2N(CH_3)_2$, $-CH_2NHC(O)CH_3$, $-CH_2NHC(O)OC(CH_3)_3$, $-CH=CHCH_2OCH_3$, $-CH=CHC(CH_3)_2OH$, $-N(CH_3)_2$, $-N(CH_2CH_3)_2$, $-NHCH_2CH_3$, $-NHC(O)CH_3$, $-NHC(O)CH_2OCH_3$, $-NHS(O)_2CH_3$, $-SCH_3$, $-SCH_2CH_3$, $-SO_2NH_2$, $-S(O)CH_3$, $-S(O)_2CH_3$, $-G^1$, $-C(O)NHG^1$, $-N(CH_3)CH_2G^1$, $-NHG^1$, $-OG^1$, $-CH_2G^1$, $-CH_2CH_2G^1$, $-CH_2NHC(O)G^1$ o $-CH=CHG^1$; o

2 grupos R^Y en átomos adyacentes, junto con los átomos a los que están unidos, forman un anillo dioxolanilo, hexahidropirimidinilo, piridilo o pirimidinilo, cada uno de los cuales está sustituido con 0–5 R^X ;


cada G^1 o G^2 es, de modo independiente, pirrolidinilo, azetidínilo, ciclopropilo, ciclohexilo, ciclohexenilo, tetrahidropiranilo, dihidropiranilo, tetrahidropiridinilo, piperidinilo, piperazinilo, fenilo, piridilo, piridonilo, pirimidinilo,

piridazinilo, pirazolilo, morfolino, furanilo, imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, oxetanilo o pirazinilo, cada uno de los cuales está sustituido con 0–5 R^Z ;


cada R^Z se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en fluoro, cloro, -OH, -OCH₃, oxo, -CH₃, -CHF₂, -CF₃, -C(O)CH₃ o -C(O)OC(CH₃)₃; y t es 0 ó 1.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^1 y R^2 son cada uno, de modo independiente, hidrógeno o -CH₃.


3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:






1053,



1054,



1055,



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.