

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica líquida para administración parenteral que comprende 0,01-10 mg/ml de semaglutida y no más de 0.01 % (p/p) de fenol, en donde dicha composición
 - a. es una solución acuosa que comprende al menos 60 % p/p de agua; y
 - b. comprende además uno o más agentes isotónicos, en donde el agente isotónico es cloruro de sodio o propilenglicol.
2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha composición no comprende fenol.
3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la concentración de semaglutida es de 0,5-5 mg/ml de dicha composición.
4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicha composición comprende un tampón, en donde dicho tampón está presente en una concentración de 0,01-50 mM de dicha composición.
5. La composición de acuerdo con la reivindicación 4, en donde dicho tampón es seleccionado del grupo que consiste en tampón de fosfato, tampón de TRIS, tampón de citrato, y una mezcla de los mismos.
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 4 o la reivindicación 5, en donde dicho tampón es un tampón de fosfato y en donde el tampón de fosfato es seleccionado del grupo que consiste en fosfato de dihidrógeno de sodio, fosfato de hidrógeno disódico, fosfato de sodio, y una mezcla de los mismos.
7. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición no comprende conservante.

8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición tiene un pH en el intervalo de 6,0-10,0.
9. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición tiene un pH en el intervalo de 6,5-8,5, tal como 7.0-7.8.
10. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición es para administración subcutánea.
11. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicha composición comprende 0,5-5 mg/ml de semaglutida, propilenglicol y 1.42 mg/ml de dihidrato de hidrógeno fosfato de disodio.
12. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en donde dicha composición comprende 0,5-5 mg/ml de semaglutida, cloruro de sodio y 1,42 mg/ml de dihidrato de hidrógeno fosfato de disodio.