


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R^1 es 5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo;

G es $-C(O)R^2$ o R^3 ;

R^2 es C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido por R^{2a} , C_3-C_8 cicloalquilo opcionalmente sustituido por R^{2b} , heterociclilo de 3 a 12 miembros teniendo de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 3 a 12 miembros es opcionalmente sustituido por R^{2c} , C_6-C_{14} arilo opcionalmente sustituido por R^{2d} , heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es opcionalmente sustituido por R^{2e} , $-OR^{2f}$, o $-NR^{2g}R^{2h}$;

R^3 es C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido por R^{3a} , C_3-C_8 cicloalquilo opcionalmente sustituido por R^{3b} , heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 3 a 12 miembros es opcionalmente sustituido por R^{3c} , C_6-C_{14} arilo opcionalmente sustituido por R^{3d} , o heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es opcionalmente sustituido por R^{3e} ;

L^1 es C_2-C_4 alquilenos opcionalmente sustituido por R^4 ;

L^2 es un enlace o C_1-C_3 alquilenos opcionalmente sustituido por R^4 ;

L^3 es C_2-C_4 alquilenos opcionalmente sustituido por R^4 ;

Y es un enlace o C_3-C_5 cicloalquilenos opcionalmente sustituido por Y^a ;

R^{2f} es C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6-C_{14} arilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros que tengan de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados

independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2f} están independientemente sustituidos opcionalmente con R²ⁱ;

R^{2g} y R^{2h} son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2g} y R^{2h} están independientemente opcionalmente sustituidos por R^{2j};

cada R^{2a}, R^{2b}, R^{2c}, R^{2d}, R^{2e}, R²ⁱ, R^{2j}, R^{3a}, R^{3b}, R^{3c}, R^{3d}, R^{3e} e Y^a es independientemente oxo o R⁴;

cada R⁴ es independientemente deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alqueno, C₂-C₆ alquino, C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, -CN, -OR⁵, -SR⁵, -NR⁶R⁷, -NO₂, -C=NH(OR⁵), -C(O)R⁵, -OC(O)R⁵, -C(O)OR⁵, -C(O)NR⁶R⁷, -NR⁵C(O)R⁶, -NR⁵C(O)OR⁶, -NR⁵C(O)NR⁶R⁷, -S(O)R⁵, -S(O)₂R⁵, -NR⁵S(O)R⁶, -NR⁵S(O)₂R⁶, -S(O)NR⁶R⁷, -S(O)₂NR⁶R⁷, o -P(O)(OR⁵)(OR⁶), en donde el C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alqueno, C₂-C₆ alquino, C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R⁴ están independientemente opcionalmente sustituido por R^{4a};

cada R^{4a} es independientemente deuterio, halógeno, oxo, -OR⁸, -NR⁸R⁹, -C(O)R⁸, -C(O)OR⁸, -NR⁸C(O)OR¹⁰, -CN, -S(O)R⁸, -S(O)₂R⁸, -P(O)(OR⁸)(OR⁹), C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y

de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, o C₁-C₆ alquilo, en donde el heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, y C₁-C₆ alquilo de R^{4a} están independientemente opcionalmente sustituidos por R^{4b};

cada R^{4b} es independientemente deuterio, oxo, -OH, -O(²H), halógeno o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -OH, -O(²H), u oxo;

cada R⁵ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, o heterociclilo de 3 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y heterociclilo de 3 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R⁵ están cada uno independientemente opcionalmente sustituidos con R^{5a};

cada R^{5a} es independientemente halógeno, deuterio, oxo, -CN, -OR¹⁰, -NR¹¹R¹², -P(O)(OR¹¹)(OR¹²), heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -OH, -O(²H), u oxo;

cada R⁶ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno o heterociclilo de 3 a 6 miembros tiene de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de

1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y heterociclilo de 3 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^6 están independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR¹⁰, -NR¹¹R¹², o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -OH, -O(²H), u oxo;

cada R⁷ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, o heterociclilo de 3 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₂-C₆ alquenilo, C₂-C₆ alquinilo, C₃-C₆ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo c de 5 a 10 miembros, y heterociclilo de 3 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R⁷ están independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR¹⁰, -NR¹¹R¹², o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, -OH, -O(²H), u oxo;

o R⁶ y R⁷ se toman junto con el átomo al que están unidos para formar un heterociclilo de 3 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 10 miembros es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, oxo, -OR¹⁰, -NR¹¹R¹², o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, oxo -OH, o -O(²H);

cada R⁸ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo, C₂-C₆ alquenilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, o C₂-C₆ alquinilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo;

cada R⁹ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo, C₂-C₆ alquenilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, o C₂-C₆ alquinilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo;

cada R¹⁰ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, C₂-C₆ alquenilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo, o C₂-C₆ alquinilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo;

cada R¹¹ es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, C₂-C₆ alquenilo opcionalmente sustituido por

deuterio, halógeno u oxo, o C₂-C₆ alquilino opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo; y

cada R¹² es independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, C₂-C₆ alqueno opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, u oxo, o C₂-C₆ alquilino opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno u oxo;



o R¹¹ y R¹² se toman junto con el átomo al que están unidos para formar un heterociclilo de 3-6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 3-6 miembros es opcionalmente sustituido por deuterio, halógeno, oxo o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido por deuterio, oxo o halógeno.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde L¹ es C₂ alqueno opcionalmente sustituido por R¹⁰.


3. El compuesto de la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde L¹ es -CH₂CH₂-.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde al menos uno de R^{2g}, R^{2h}, R^{2a}, R^{2b}, R^{2c}, R^{2d}, R^{2e}, R²ⁱ, R^{2j}, R^{3a}, R^{3b}, R^{3c}, R^{3d}, R^{3e}, Y^a, R^{4a}, R^{4b}, R⁵, R^{5a}, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹⁰, R¹¹, o R¹² es deuterio.

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde -L¹-O-L²-Y-L³- se toman juntos para formar una porción seleccionada del grupo que consiste en:




en donde $\textcircled{\text{A}}$ es un C₃-C₅ cicloalquileno opcionalmente sustituido por Y^a, y



en donde $\textcircled{\text{A}}$ es un C₃-C₅ cicloalquileno opcionalmente sustituido por Y^a.


6. El compuesto de la reivindicación 5, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde -L¹-O-L²-Y-L³- se toman juntos para formar una porción seleccionada del

grupo que consiste en:




7. El compuesto de la reivindicación 5, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde $\text{L}^1\text{-O-L}^2\text{-Y-L}^3$ se toman juntos para formar una porción seleccionada del

grupo que consiste en:



8. El compuesto de la reivindicación 5, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde $\text{L}^1\text{-O-L}^2\text{-Y-L}^3$ se toman juntos para formar una porción seleccionada del

grupo que consiste en:



9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es ---C(O)R^2 .

10. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo sustituido por 0-5 grupos R^{2a} .

11. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo no sustituido.

12. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $\text{C}_4\text{-C}_6$ alquilo no sustituido.

13. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $\text{C}_1\text{-C}_5$ alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a} , en donde cada R^{2a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, $\text{C}_1\text{-C}_6$ alquilo, $\text{C}_3\text{-C}_8$ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del

grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, -CN, -OR⁵, -NR⁶R⁷, -NR⁵C(O)OR⁶, y -S(O)₂R⁵, y en donde el C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tengan de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C₆-C₁₄ arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2a} están opcionalmente independientemente sustituidos por R^{4a}.

14. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R² es C₂-C₅ alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a}, y en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es halógeno.

15. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R² es C₁-C₅ alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a}, y en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es C₃-C₈ cicloalquilo.

16. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal de este, en donde R² es C₁-C₃ alquilo está sustituido por C₃-C₆ cicloalquilo, en donde el C₃-C₆ cicloalquilo está sustituido por 0-5 grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, C₁-C₆ alquilo, y -OR⁵.

17. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R² es C₁-C₃ alquilo sustituido por C₃-C₆ cicloalquilo, y en donde el C₃-C₆ cicloalquilo está no sustituido.

18. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y en donde R² es C₁-C₅ alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a}, en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es heterociclilo de 3 a 12 miembros teniendo de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

19. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente de este, y en donde R² es C₁ alquilo sustituido por heterociclilo de 6 miembros teniendo de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

20. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_1-C_5 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es C_6-C_{14} arilo, y en donde el C_6-C_{14} arilo está independientemente opcionalmente sustituido por halógeno o C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 halógeno.

21. El compuesto de la reivindicación 20, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2a} es fenilo no sustituido o fenilo sustituido por 1-5 halógeno.

22. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_2-C_5 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a} , en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 0-5 grupos R^{4a} .

23. El compuesto de la reivindicación 22, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2a} es piridinilo no sustituido.

24. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_1-C_5 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a} , en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es $-OR^5$, y en donde cada R^5 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: hidrógeno, C_1-C_6 alquilo, y C_6-C_{14} arilo.

25. El compuesto de la reivindicación 24, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^5 es C_6-C_{14} arilo sustituido por 0-5 halógeno.

26. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_1-C_5 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2a} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2a} es $-CN$, $-NR^6R^7$, $-NR^5C(O)OR^6$, o $-S(O)_2R^5$.

27. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_1-C_5 alquilo sustituido por 2-5 grupos R^{2a} , y en donde cada R^{2a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6-C_{14} arilo, $-CN$, $-OR^5$, y $-NR^5C(O)OR^6$.

28. El compuesto de la reivindicación 27, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_1-C_5 alquilo sustituido por 2-5 grupos R^{2a} , en donde al menos un grupo R^{2a} es fenilo sustituido por 0-5 halógeno y al menos un grupo R^{2a} es $-OR^5$, y en donde cada R^5 se selecciona independientemente del grupo que consiste de: hidrógeno y C_1-C_6 alquilo.

29. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3-C_8 cicloalquilo sustituido por 0-5 grupos R^{2b} .

30. El compuesto de la reivindicación 29, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3-C_8 cicloalquilo no sustituido.

31. El compuesto de la reivindicación 29, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y en donde R^2 es C_3-C_8 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , en donde cada R^{2b} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, C_1-C_6 alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y $-OR^5$.

32. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3-C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2b} es halógeno.

33. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3-C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , en donde al menos uno de los grupos R^{2b} es C_1-C_6 alquilo, y en donde el C_1-C_6 alquilo de R^{2b} está sustituido por 0-5 grupos R^{4a} .

34. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2b} es C_1-C_2 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{4a} , en donde cada grupo R^{4a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de fenilo sustituido por 0-5 halógeno y heteroarilo de 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heteroarilo de 6 miembros es sustituido por 0-5 halógeno.

35. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2b} es heterociclilo de 3 a 12 miembros teniendo de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

36. El compuesto de la reivindicación 35, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2b} es tetrahidro-2*H*-piranilo o benzodioxolilo.

37. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal de este, en donde R^2 es C_3 - C_4 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , en donde al menos uno de los grupos R^{2b} es C_6 - C_{14} arilo sustituido por 0-5 grupos R^{4a} , y en donde cada R^{4a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, C_1 - C_6 alquilo, y $-OR^8$.

38. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3 - C_7 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2b} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2b} es heteroarilo de 5 a 10 miembros teniendo de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

39. El compuesto de la reivindicación 38, o una sal de este, en donde R^{2b} es piridinilo o isoquinolinilo.

40. El compuesto de la reivindicación 31, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 2-5 grupos R^{2b} , en donde cada R^{2b} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, C_1 - C_6 alquilo, C_6 - C_{14} arilo, y $-OR^5$.

41. El compuesto de la reivindicación 39, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 2-5 grupos R^{2b} , y en donde al menos un grupo R^{2b} es halógeno y al menos un grupo R^{2b} es fenilo sustituido por 0-5 C_1 - C_6 alquilo.

42. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituidos con 0-5 grupos R^{2c} .

43. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 10 miembros no sustituido teniendo de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

44. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2c} , y en donde cada R^{2c} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: oxo, halógeno, C_1 - C_6 alquilo, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, -CN, -OR⁵, -C(O)R⁵, -C(O)OR⁵, y -S(O)₂R⁵.

45. El compuesto de la reivindicación 44, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros sustituidos que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 4 a 6 miembros es con 1-5 grupos R^{2c} , en donde al menos uno de los grupo R^{2c} es C_1 - C_6 alquilo, en donde el C_1 - C_6 alquilo de R^{2c} está sustituido por 0-5 grupos R^{4a} .

46. El compuesto de la reivindicación 45, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2c} es C_1 - C_2 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{4a} , en donde cada grupo R^{4a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, fenilo sustituido por 0-5 halógeno; heteroarilo de 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre, oxígeno; y NR₈C(O)OR₁₀, y donde el heteroarilo de 6 miembros se sustituye por 0-5 halógenos.

47. El compuesto de la reivindicación 44, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclilo de 4 a 6 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2c} , y en donde al menos un grupo R^{2c} es C_6 - C_{14} arilo no sustituido.

48. El compuesto de la reivindicación 44, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 5 miembros que tienen de 1 a 4 átomos de carbono anulares y de 1 a 4 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 5 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2c} , en donde al menos uno de los grupos R^{2c} es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido por 0-5 C_1-C_6 alquilo.

49. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 4 a 6 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2c} , y en donde al menos un grupo R^{2c} es $-C(O)R^5$, $-C(O)OR^5$, o $-S(O)_2R^5$, en donde cada R^5 es independientemente C_1-C_6 alquilo.

50. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 4 a 6 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2c} , y en donde al menos un grupo R^{2c} es oxo.

51. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 4 a 6 miembros es sustituido por 2-5 grupos R^{2c} , y en donde cada R^{2c} se selecciona independientemente de halógeno, C_1-C_6 alquilo, $-C(O)R^5$, y $-C(O)OR^5$.

52. El compuesto de la reivindicación 50, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heterociclilo de 4 a 6 miembros que tienen de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 4 a 6 miembros es sustituido por 2-5 grupos R^{2c} , y en donde al menos un grupo R^{2c} es C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 halógeno y al menos un grupo R^{2c} es $-C(O)R^5$ o $-C(O)OR^5$.

53. El compuesto de la reivindicación 42, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es azetidino, pirrolidino, piperidino, oxetano, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, oxabicyclohexano, oxabicyclooctano, tetrahydro-2H-tiopyranil, morfolino, o benzodioxano, cada uno de los cuales está sustituido por 0-5 grupos R^{2c} .

54. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_6-C_{14} arilo sustituido 0-5 grupos R^{2d} .

55. El compuesto de la reivindicación 54, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_6-C_{10} arilo no sustituido.

56. El compuesto de la reivindicación 54, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_6-C_{10} arilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , en donde cada R^{2d} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, $-CN$, y $-OR^5$, en donde el C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2d} están cada uno sustituidos independientemente por 0-5 halógeno, C_1-C_6 alquilo o $-OR^8$.

57. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_6-C_{10} arilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es halógeno.

58. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es C_6-C_{10} arilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es C_1-C_6 alquilo, y en donde el C_1-C_6 alquilo de R^{2d} está sustituido por 0-5 grupos R^{4a} .

59. El compuesto de la reivindicación 58, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2d} es C_1-C_2 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{4a} , y en donde cada grupo R^{4a} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno y OR^8 .

60. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es C_3 - C_6 cicloalquilo.

61. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es heterociclilo de 6 miembros teniendo de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

62. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es heteroarilo de 5 a 6 miembros que tengan de 1 a 5 átomos de carbono anulares y de 1 a 5 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en donde el heteroarilo de R^{2d} está sustituido por 0-5 grupos C_1 - C_6 alquilo.

63. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 1-5 grupos R^{2d} , en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es $-OR^5$, en donde cada R^5 se selecciona independientemente del grupo que consiste de C_1 - C_2 alquilo sustituido por 0-5 grupos seleccionados de halógeno y $-OR^{10}$.

64. El compuesto de la reivindicación 56, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 2-5 grupos R^{2d} , y en donde cada R^{2d} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, C_1 - C_6 alquilo, $-CN$, y $-OR^5$.

65. El compuesto de la reivindicación 64, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 2-5 grupos R^{2d} , y en donde al menos dos de los grupos R^{2d} son halógeno.

66. El compuesto de la reivindicación 64, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo sustituido por 2-5 grupos R^{2d} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2d} es C_1 - C_6 alquilo y al menos uno de los grupos R^{2d} se selecciona del grupo que consiste en halógeno, CN , y $-OR^5$.

67. El compuesto de la reivindicación 54, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es fenilo, indanilo, o 1,2,3,4-tetrahidronaftalenilo, cada uno de los cuales está sustituido por 0-5 grupos R^{2d} .

68. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es por 0-5 grupos R^{2e} .

69. El compuesto de la reivindicación 68, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido teniendo de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

70. El compuesto de la reivindicación 68, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2e} , y en donde cada R^{2e} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, C_1 - C_6 alquilo, y -OR⁵.

71. El compuesto de la reivindicación 70, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2e} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2e} es halógeno.

72. El compuesto de la reivindicación 68, o una sal farmaceuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2e} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2e} es C_1 - C_4 alquilo, en donde el C_1 - C_4 alquilo de R^{2e} está sustituido por 0-5 grupos halógeno.

73. El compuesto de la reivindicación 68, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 2-5 grupos R^{2e} , y en donde cada

R^{2e} se selecciona independientemente del grupo que consiste de halógeno, C_1-C_6 alquilo, y $-CN$.

74. El compuesto de la reivindicación 73, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido por 2-5 grupos R^{2e} , en donde al menos dos de los grupos R^{2e} son halógeno.

75. El compuesto de la reivindicación 73, o una sal de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido por 2-5 grupos R^{2e} , y en donde al menos dos de los grupos R^{2e} son C_1-C_6 alquilo.

76. El compuesto de la reivindicación 73, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 3-5 grupos R^{2e} , y en donde cada R^{2e} se selecciona independientemente de l grupo que consiste de halógeno, C_1-C_6 alquilo, y $-CN$.

77. El compuesto de la reivindicación 68, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es pirazolilo, piridilo, pirimidinilo, indazolilo, pirrolopiridinilo, quinolinilo, o 4,5,6,7-tetrahidro-indazolilo, cada uno de los cuales está sustituido por 0-5 grupos R^{2e} .

78. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $-OR^{2f}$.

79. El compuesto de la reivindicación 78, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $-OR^{2f}$, y en donde R^{2f} se selecciona del grupo que consiste en C_1-C_6 alquilo, C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6-C_{14} arilo, y heteroarilo c de 5 a 10 miembros.

80. El compuesto de la reivindicación 78, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 grupos R^{2i} .

81. El compuesto de la reivindicación 80, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1 - C_6 alquilo no sustituido.

82. El compuesto de la reivindicación 80, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1 - C_6 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , en donde cada R^{2i} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, C_1 - C_6 alquilo, C_3 - C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, $-OR^5$, $-NR^5C(O)R^6$, y $-NR^5C(O)OR^6$, y en donde el C_1 - C_6 alquilo, C_3 - C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, C_6 - C_{14} arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2i} está sustituido por 0-5 grupos seleccionados del grupo que consiste en halógeno, $-CN$, $-OR^8$, y C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido por halógeno.

83. El compuesto de la reivindicación 82, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1 - C_6 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2i} es halógeno.

84. El compuesto de la reivindicación 82, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1 - C_6 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2i} es fenilo.

85. El compuesto de la reivindicación 82, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_1 - C_6 alquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , en donde al menos uno de los grupos R^{2i} es $-NR^5C(O)OR^6$, y en donde R^5 es hidrógeno y R^6 es C_1 - C_6 alquilo.

86. El compuesto de la reivindicación 79, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido por 0-5 grupos R^{2i} .

87. El compuesto de la reivindicación 86, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_8 cicloalquilo no sustituido.

88. El compuesto de la reivindicación 86, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_8 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , en donde cada R^{2i} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_6 - C_{14} arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y, en donde el C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_6 - C_{14} arilo, y heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno de R^{2i} están sustituidos por 0-5 grupos seleccionados del grupo que consiste en: C_1 - C_6 alquilo y C_6 - C_{14} arilo.

89. El compuesto de la reivindicación 88, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos uno de los grupos R^{2i} es C_1 alquilo.

90. El compuesto de la reivindicación 88, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es C_2 alquinilo sustituido por 0-1 grupo fenilo.

91. El compuesto de la reivindicación 88, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_3 - C_6 cicloalquilo sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es fenilo sustituido por 0-3 grupos C_1 - C_6 alquilo o es pirazolilo sustituido por 0-3 grupos C_1 - C_6 alquilo, cuyos grupos C_1 - C_6 alquilo en fenilo o pirazolilo de R^{2i} pueden ser iguales o diferentes.

92. El compuesto de la reivindicación 78, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, y en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido con 0-5 grupos R^{2i} .

93. El compuesto de la reivindicación 92, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros no sustituido teniendo de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

94. El compuesto de la reivindicación 92, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde cada R^{2i} se selecciona independientemente del grupo que consiste en C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_6 - C_{14} arilo, $-C(O)R^5$, $-C(O)OR^5$, y $-S(O)_2R^5$.

95. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es C_1 - C_6 alquilo o C_2 - C_6 alquinilo, cada uno de los cuales está sustituido por 0-1 grupo fenilo.

96. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , en donde al menos un grupo R^{2i} es C_6 - C_{14} arilo sustituido por 0-5 grupos R^{4a} , en donde cada R^{4a} se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno y C_1 - C_6 alquilo.

97. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , en donde al menos un grupo R^{2i} es $-C(O)R^5$, y en donde R^5 es C_1 - C_6 alquilo.

98. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es $-C(O)OR^5$, en donde R^5 es C_1 - C_6 alquilo.

99. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es $-S(O)_2R^5$, en donde R^5 es C_1-C_6 alquilo.

100. El compuesto de la reivindicación 94, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es heterociclilo de 3 a 12 miembros que tienen de 1 a 11 átomos de carbono anulares y de 1 a 6 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heterociclil de 3 a 12 miembros es sustituido por 2-5 grupos R^{2i} , y en donde al menos un grupo R^{2i} es $-C(O)R^5$, $-C(O)OR^5$, o $-S(O)_2R^5$, en donde R^5 es C_1-C_6 alquilo.

101. El compuesto de la reivindicación 92, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es azetidino, pirrolidinilo, o tetrahidropiranilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 0-5 R^{2i} .

102. El compuesto de la reivindicación 79, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_6-C_{14} arilo sustituido por 0-5 grupos R^{2i} .

103. El compuesto de la reivindicación 102, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2f} es C_6-C_{14} arilo no sustituido.


104. El compuesto de la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es $-NR^{2g}R^{2h}$.


105. El compuesto de la reivindicación 104, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2g} es hidrógeno y R^{2h} es C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 halógeno.


106. El compuesto de la reivindicación 104, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{2g} es C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 halógeno y R^{2h} es C_1-C_6 alquilo sustituido por 0-5 halógeno.


107. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-106, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es $-C(O)R^2$ y R^2 se selecciona del grupo

que consiste en:












108. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-106, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es $-\text{C}(\text{O})\text{R}^2$ y R^2 se selecciona del grupo que consiste en:



que consiste en:





110. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R³.

111. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 0-5 grupos R^{3e} , en donde cada grupo R^{3e} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno; C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido por halógeno; heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno; y C_1 - C_6 alcoxi y en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros se sustituye opcionalmente por halógeno o C_1 - C_6 alquilo.

112. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido teniendo de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno.

113. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es pirimidinilo o quinazolinilo.

114. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{3e} , y en donde cada grupo R^{3e} se selecciona independientemente del grupo que consiste de: halógeno, C_1 - C_6 alquilo, y C_6 - C_{14} arilo.

115. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{3e} , y en donde al menos un grupo R^{3e} es halógeno.


116. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados

independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{3e} , y en donde al menos un grupo R^{3e} es C_1-C_4 alquilo.


117. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 1-5 grupos R^{3e} , y en donde al menos un grupo R^{3e} es fenilo.

118. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es heteroarilo de 5 a 10 miembros que tienen de 1 a 9 átomos de carbono anulares y de 1 a 9 heteroátomos anulares seleccionados independientemente del grupo que consiste en: nitrógeno, azufre y oxígeno, en el que el heteroarilo de 5 a 10 miembros es sustituido por 2-5 grupos R^{3e} , en donde al menos un grupo R^{3e} es C_1-C_6 alquilo, y en donde al menos un grupo R^{3e} es C_6-C_{14} arilo.


119. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R^3 y R^3 se selecciona del grupo que consiste en:



120. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R^3 y R^3 se selecciona del grupo que consiste en:




121. El compuesto de la reivindicación 110, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R³ y R³ se selecciona del grupo que consiste en:




122. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-121, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^2 es 5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo opcionalmente sustituido por R^4 .


123. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:





124. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:





125. Un compuesto seleccionado de un grupo que consiste de:












































,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,


















,





,
















































































o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en la que * indica un átomo que es un estereocentro.

126. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:
 N-(2-cloro-3-fluorobenzoyl)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(1-metil-1H-indazol-4-carbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-

2-il)butil)homoserina; N-(4,4-difluorociclohexano-1-carbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-pentanoil-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-pentanoil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(terc-butoxicarbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(4-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-clorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-clorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-clorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,3-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,4-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-cloro-4-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-cloro-5-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-cloro-2-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,5-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,3-diclorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-cloro-6-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,6-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,5-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,4-diclorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-picolinoil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-nicotinoil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-metil-1H-indazol-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-metil-2H-indazol-6-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-metil-2H-indazol-5-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-metil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-etilbutanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-metil-1H-pirrol[2,3-b]piridin-5-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-(hidroximetil)benzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(quinolin-5-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-ciclopropilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(quinolin-7-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(quinolin-6-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(quinolin-8-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-ciclopropilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-ciclopropilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-isonicotinoil-O-(3-(2-

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-etilpentanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2-cloro-3-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,4-difluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-etilpentanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-isonicotinoil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(3-(tiazol-5-il)benzoil)homoserina; N-(3-hidroxi-2-fenilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)benzoil)-O-(3-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)ciclobutil)homoserina; N-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)benzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(2-hidroxi-2-fenilacetil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(2-hidroxi-2-fenilacetil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(2-hidroxi-2-fenilacetil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-fenilciclopropano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-metil-2-fenilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-fenilciclobutano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,2-dimetil-3-fenilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(terc-butoxicarbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(4-fluorofenil)-2-metilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-metiloxetano-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-metoxi-2,2-dimetilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-metil-2-(piridin-3-il)propanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,3-dihidro-1H-indeno-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-ciano-2,2-dimetilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-pivaloil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,3-dihidro-1H-indeno-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-((neopentiloxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-((1-metilciclopropoxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-((1-metilciclobutoxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(((1,1,1-trifluoro-2-metilpropano)-2-il)oxi)carbonil)homoserina; N-(isopropoxicarbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(dietilcarbamoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(terc-butylcarbamoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(terc-butyl(metil)carbamoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(isopropil(metil)carbamoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(diisopropilcarbamoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,3-dimetilbutanoil)-O-(3-

(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3-metilbutanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-ciclobutilacetil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(1-metilciclopropil)acetil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-ciclopropilacetil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)-3-metilazetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridina)-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((3-metil-1-(metilsulfonil)azetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-acetil-3-metilazetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((3-metilazetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((ciclohexiloxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(isobutoxicarbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((pirrolidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-(metilsulfonil)butanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(metilsulfonil)pirrolidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)pirrolidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-acetilpirrolidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-feniletoksi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((2-fenilciclobutoxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((3-fenilciclobutoxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; ácido 2-(((terc-butoxicarbonil)amino)-3-metil-4-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutoxi)butanoico; N-(((2-fenilciclohexil)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)azetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((4-fenilciclohexil)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-acetilazetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-((terc-butoxicarbonil)amino)propan-2-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridina)-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-acetamidopropan-2-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)ciclopentil)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)ciclohexil)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)-3-(3-clorofenil)azetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)-3-(4-isopropilfenil)azetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(((1-(terc-butoxicarbonil)-3-(feniletinil)azetidin-3-il)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(terc-butoxicarbonil)piperidin-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,3-

difluorociclohexano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-etil-4,4-difluorobutanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(((2-(feniletinil)ciclohexil)oxi)carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2-ciclohexil-2-metilpropanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(piridin-2-il) benzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-etil-4,4,4-trifluorobutanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-morfolinobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-etil-2-fenilbutanoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1H-pirrolo[3,2-b]piridin-7-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-cianotetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(terc-butoxicarbonil)-3-metilazetidin-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etilo)ciclobutil)homoserina; N-(1-(terc-butoxicarbonil)azetidin-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(metilsulfonil)piperidin-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-6-carbonil)-homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-7-carbonil)homoserina; N-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1H-indazol-6-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridina)-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(1-etil-4,4-difluorociclohexano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(6-metilindolina-1-carbonil)ciclopropan-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-(((terc-butoxicarbonil)amino)metil)tetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(piridin-3-ilmetil)ciclopropano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etilo)ciclobutil)homoserina; N-(3-cloro-5-metilisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(2,6-diclorobenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(3,5-dicloroisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)homoserina; N-(1-(4-(terc-butyl)fenil)ciclobutano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(4-(trifluorometil)tetrahidro-2H-piran-4-carbonil)homoserina; N-(3-cloro-5-metilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,5-dicloroisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(biciclo[2.2.2]octano-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo)etil)ciclobutil)homoserina; N-((metilsulfonil)proliil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,4-dimetilnicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-

(4-feniltetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-ciano-2,6-dimetilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(2,4,6-trimetilpirimidin-5-carbonil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(2,4,6-trimetilnicotinoil)homoserina; N-(3-cloro-5-fluoroisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(isoquinolin-1-il)ciclopropano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(piridin-2-il)espiro[3.3]heptano-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)tetrahidrofuran-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,4-dimetil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4,6-dimetilpirimidin-5-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,6-dicloro-4-(trifluorometil)benzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(2-fluorofenil)ciclopropano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclohexano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,2-difluoro-1-(m-tolil)ciclopropano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilo)ciclopropano-1-carbonil)homoserina; N-(4-metoxi-2,6-dimetilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-acetil-4-(trifluorometil)piperidin-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2,3-dihidrobencol[1,4]dioxina-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(1-(3-clorobencil)ciclopentano-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(1-(3-(trifluorometoxi)fenil)ciclopropano-1-carbonil)homoserina; N-(4-fluoro-2,6-dimetilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(3,5-dimetilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(2-(terc-butil)pirimidin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(4-(terc-butil)pirimidin-2-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; O-(3-(2-(1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(quinazolin-4-il)homoserina; N-(6-(terc-butil)pirimidin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; ácido 2-[(4-amino-2,6-dicloro-benzoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etilo]ciclobutoxi]butanoico; N-(4-cloro-2,6-dimetilnicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-[(3-cloro-6-metil-piridin-2-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo)etil]ciclobutoxi]butanoico; N-(2,6-dimetilpiperidin-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2,5-dimetilpirrolidin-1-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2,6-dicloro-4-cianobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2,6-dicloro-3-nitrobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-

naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]-2-[(1,2,4-trimetil-6-oxo-piridin-3-carbonil)amino]butanoico; N-(2-cloro-4-ciano-6-metilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-bromo-5-cloro-2-fluoroisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-carbonilo)-homoserina; N-(3-bromo-2,6-dimetilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-[(3-cloro-5-metoxi-piridin-4-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(2,6-dicloro-4-fluoro-benzoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etilo]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(2-cloro-6-fluoro-benzoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) etil]ciclobutoxi]butanoico; N-(3-bromo-2-cloro-6-fluorobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2,4-dimetil-6-oxo-1-fenil-1,6-dihidropiridin-3-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8)-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(5-bromo-2-hidroxiisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-cloro-5-ciclopropilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-cloro-5-etilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-ciano-2,6-dimetilbenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil) ciclobutil)-homoserina; N-(3-bromo-5-fluoroisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2-metoxi-3,5-dimetilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-cloro-5-(trifluorometil)isonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-bromo-5-cloroisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2-(dimetilamino)-3,5-dimetilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-cloro-5-fluoro-2-metilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2,6-dicloro-3-cianobenzoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-metil-5-(trifluorometil)isonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(2-hidroxi-3,5-dimetilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(3-ciano-2-hidroxi-6-metilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(5-cloro-3-fluoro-2-metilisonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-[(6-metoxi-2,4-dimetil-piridin-3-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil] ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[2,6-dimetil-4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; N-(3,5-dimetilmorfolina-4-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-[[5-cloro-3-fluoro-2-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]piridin-4-carbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; 2-[(7-cloro-5-oxo-2,3-dihidro-1H-indolizina-8-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoato de metilo; ácido 2-[(2,6-difluoro-4-hidroxi-benzoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etilo]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(4-cloro-2-metil-pirazol-3-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(2-metilpirazol-3-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; N-(1-


(fenilsulfonil)piperidina-2-carbonil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-(3,3-dimetilbutanoilamino)-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(2-fenilacetil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]-2-[(4,4,4-trifluoro-3,3-dimetil-butanoil)amino]butanoico; ácido 2-[(4,4-difluoro-3,3-dimetil-butanoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[2-fenilpropanoil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[2-(3,5-difluorofenil)acetil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[2-(terc-butoxicarbonilamino)-1-metil-etoxi]carbonilamino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(3,6-dimetilpiridin-2-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(6-fluorocromano-2-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]-2-[2-[3-(trifluorometil)fenil]butanoilamino]butanoico; ácido 2-[(3-cloro-5-metil-piridin-4-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(3-cloro-5-fluoro-piridin-4-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(4-ciano-2,6-dimetil-benzoil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[4-(2-clorofenil)tetrahidropiran-4-carbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(2-hidroxiindano-2-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(1-ciclopropilciclopropanocarbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[3-(difluorometil)-5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-6-carbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(1-ciclopropilciclobutanocarbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[1-(4-isopropilfenil)ciclopentanocarbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-(biciclo[2.2.2]octano-4-carbonilamino)-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-(3,4,5,6,7,7a-hexahidro-2H-benzofuran-3a-carbonilamino)-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[1-(2-feniletil)ciclopropanocarbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[4-(3-metilisoxazol-5-il)tetrahidropiran-4-carbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[1-(bencenosulfonil)ciclopropanocarbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[1-(fenilcicloheptanocarbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[(4-metilsulfoniltetrahidropiran-4-carbonil)amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; ácido 2-[[1-(4-sulfamoilfenil)ciclopropanocarbonil]amino]-4-[3-[2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil]ciclobutoxi]butanoico; N-((fenilsulfonil)proil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; N-(5-cloro-3-fluoro-2-((4-metilpiperazin-1-il)metil)isonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8)-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-

homoserina; N-(3-cloro-5-fluoro-2-((4-metilpiperazin-1-il)metil)isonicotinoil)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8)-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina; ácido 2-(pirimidin-4-ilamino)-5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propoxi)pentanoico; ácido 2-[(3-cloro-5-metil-piridin-4-carbonil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(2,4-dimetilpiridin-3-carbonil) amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(4-ciano-2,6-dimetil-benzoil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(3,5-dicloropiridin-4-carbonil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(3-cloro-5-fluoro-piridin-4-carbonil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; N-(3,5-dimetilmorfolina-4-carbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(2,6-diclorobenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(3,5-dimetilisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; ácido 2-[(2,4-dicloro-6-fluoro-benzoil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(2,4-dimetil-6-oxo-1H-piridin-3-carbonil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; N-(3-cloro-5-metoxiisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; ácido 2-[(2-cloro-6-fluoro-benzoil)amino]-4-[4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; N-(terc-butoxicarbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(5-bromo-2-hidroxiisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(3-bromo-5-cloro-2-fluoroisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(2,4-dimetil-6-oxo-1-fenil-1,6-dihidropiridin-3-carbonil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-N-(5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-carbonil)-homoserina; N-(3-bromo-2,6-dimetilbenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(3-cloro-5-fluoroisonicotinoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(3-bromo-2-cloro-6-fluorobenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; ácido 2-[(3-cloro-5-metoxi-piridin-4-carbonil)amino]-4-[2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-[(3-cloro-5-fluoro-piridin-4-carbonil)amino]-4-[2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; N-(3-cloro-5-fluoroisonicotinoil)-O-(2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(2,6-diclorobenzoil)-O-(2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(2-cloro-6-fluorobenzoil)-O-(2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; N-(4-fluoro-2-metilnicotinoil)-O-(2-metil-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)-homoserina; ácido 2-[(3-cloro-5-fluoro-piridin-4-carbonil)amino]-4-[2-hidroxi-4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butoxi]butanoico; ácido 2-(1-metil-1H-indazol-4-carboxamido)-5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propoxi)pentanoico; ácido 2-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)benzamido)-5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propoxi)pentanoico; ácido 2-(2-cloro-3-fluorobenzamido)-6-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etoxi)hexanoico; ácido 2-(3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)benzamido)-6-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etoxi)hexanoico; ácido 2-(2-etilbutanamido)-6-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etoxi)hexanoico; ácido 2-(1-metil-1H-indazol-4-carboxamido)-6-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etoxi)hexanoico; ácido 2-((terc-butoxicarbonil)amino)-5-(3-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)propoxi)pentanoico; N-benzoil-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-

il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(quinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil) homoserina; N-(8-fluoroquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(7-fluoroquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(7-metilquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(6-fluoroquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(5-fluoroquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; N-(6-metilquinazolin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)homoserina; y N-(6-(terc-butil)-2-fenilpirimidin-4-il)-O-(3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutil)-homoserina;


o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

127. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de los siguientes:




en donde j y k son respectivamente 2 y 4, 3 y 3, o 4 y 2,
o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

128. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

129. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

130. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

131. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


132. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:



133. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:









134. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:





o una sal farmacéuticamente aceptable de este.







135. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.



136. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:













o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


137. El compuesto de la reivindicación 127, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:






o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

138. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:





en donde j y k son respectivamente 2 y 4, 3 y 3, o 4 y 2,
o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

139. El compuesto de la reivindicación 138, en donde el compuesto está representado por:




140. El compuesto de la reivindicación 138, en donde el compuesto está representado por uno cualquiera de:





o



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

141. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 140 o 144 a 153, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

142. Una preparación farmacéutica o un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 140 o 144 a 153, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en una cantidad o proporción definida.

143. La composición farmacéutica de la reivindicación 141, caracterizada porque la composición farmacéutica comprende además uno o más agentes activos adicionales.

144. Un compuesto que es N-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carbonilo)-O-(cis-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

145. Un compuesto que es O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-N-(4-(trifluorometil)tetrahidro-2H-piran-4-carbonil)-L-homoserina, o una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

146. Un compuesto que es N-(3-cloro-5-fluoroisonicotinoil)-O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

147. Un compuesto que es N-(4-cloro-2,6-dimetilnicotinoil)-O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
148. Un compuesto que es N-(3-bromo-5-cloroisonicotinoil)-O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
149. Un compuesto que es N-(2-hidroxi-3,5-dimetilisonicotinoil)-O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
150. Un compuesto que es N-(5-cloro-3-fluoro-2-metilisonicotinoil)-O-((1r,3R)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.
151. Un compuesto que es N-(3-cloro-5-fluoroisonicotinoil)-O-((1r,3S)-3-(2-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)etil)ciclobutilo)-D-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
152. Un compuesto que es N-(2-cloro-6-fluorobenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable o de los mismos.
153. Un compuesto que es N-(3-bromo-2,6-dimetilbenzoil)-O-(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butilo)-L-homoserina, o una sal farmacéuticamente aceptable o de los mismos.