




Reivindicaciones

1. Un compuesto seleccionado de:





2. El uso de un compuesto de fórmula (I)



donde

R¹ es seleccionado de fluorosulfonilfenil, fluorosulfonilmetilfenil, e isotiocianatometilfenil;


R² y R³ son seleccionados de hidroxilo, y halógeno;

R⁴ es alquilo o fenilhaloalquilo; y

n es 0 o 1;

para la preparación de medicamentos para el tratamiento o profilaxis del dolor, dolor neuropático, aterosclerosis, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética, glaucoma, diabetes mellitus, inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, lesión por isquemia-reperfusión, insuficiencia hepática aguda, fibrosis hepática, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, fibrosis sistémica, rechazo agudo de aloinjerto, nefropatía crónica de aloinjerto, nefropatía diabética, glomerulonefropatía, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, isquemia/infarto de miocardio, esclerosis sistémica, lesión térmica, quemaduras, cicatrices hipertróficas, queloides, gingivitis pirexia, cirrosis hepática o tumores, regulación de la masa ósea, neurodegeneración, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, uveítis, asma, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas, psicosis, oncología, encefalitis, malaria, alergia, trastornos inmunológicos, artritis, trastornos gastrointestinales, artritis reumatoide o alergia.

3. Un compuesto de acuerdo a la formula (I)



donde

R^1 es seleccionado de fluorosulfonilfenil, fluorosulfonilmetilfenil, e isotiocianatometilfenil;

R^2 y R^3 son seleccionados de hidroxilo, y halógeno;


R^4 es alquilo o fenilhaloalquilo; y

n es 0 o 1;

para uso en el tratamiento o profilaxis del dolor, dolor neuropático, aterosclerosis, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética, glaucoma, diabetes mellitus, inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, lesión por isquemia-reperfusión, insuficiencia hepática aguda, fibrosis hepática, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, fibrosis sistémica, rechazo agudo de aloinjerto, nefropatía crónica de aloinjerto, nefropatía diabética, glomerulonefropatía, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, isquemia/infarto de miocardio, esclerosis sistémica, lesión térmica, quemaduras, cicatrices hipertróficas, queloides, gingivitis pirexia, cirrosis hepática o tumores, regulación de la masa ósea, neurodegeneración, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, uveítis, asma, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas, psicosis, oncología, encefalitis, malaria, alergia, trastornos inmunológicos, artritis, trastornos gastrointestinales, artritis reumatoide o alergia.

4. Un método para el tratamiento o profilaxis del dolor, dolor neuropático, aterosclerosis, degeneración macular relacionada con la edad, retinopatía diabética, glaucoma, diabetes mellitus, inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, lesión por isquemia-reperfusión, insuficiencia hepática aguda, fibrosis hepática, fibrosis pulmonar, fibrosis renal, fibrosis sistémica, rechazo agudo de aloinjerto, nefropatía crónica de aloinjerto, nefropatía diabética, glomerulonefropatía, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, isquemia/infarto de miocardio, esclerosis sistémica, lesión térmica, quemaduras,

cicatrices hipertróficas, queloides, gingivitis pirexia, cirrosis hepática o tumores, regulación de la masa ósea, neurodegeneración, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, uveítis, asma, osteoporosis, enfermedades psiquiátricas, psicosis, oncología, encefalitis, malaria, alergia, trastornos inmunológicos, artritis, trastornos gastrointestinales, artritis reumatoide o alergia, cuyo método comprende administrar una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (I)



donde

R¹ es seleccionado de fluorosulfonilfenil, fluorosulfonilmetilfenil, e isotiocianatometilfenil;

R² y R³ son seleccionados de hidroxilo, y halógeno;

R⁴ es alquilo o fenilhaloalquilo; y

n es 0 o 1;

a un paciente en necesidad del mismo.

5. El uso de un compuesto de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 para la detección o imagen del receptor CB2.