

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica mucoadhesiva de corticoesteroide que comprende:
 - (a) budesonida en una cantidad del 0.02 al 0.06 % en p/p de la composición,
 - (b) glicerina en una cantidad del 40 al 70 % en p/p de la composición, y
 - (c) goma xantana en una cantidad del 0.25 al 1.5 % en p/p de la composición,En donde la composición tiene un pH del 4.5 al 7.
2. La composición de la reivindicación 1, que además comprende un tampón ácido acuoso.
3. La composición de la reivindicación 1 o 2, que además comprende sucralosa en una cantidad del 0.05 al 0.5 % en p/p de la composición.
4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que además comprende propilenglicol en una cantidad de hasta el 20 % en p/p de la composición.
5. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, que comprende:
 - (a) budesonida en una cantidad de 0.05 % en p/p de la composición,
 - (b) glicerina en una cantidad de 50 % en p/p de la composición, y
 - (c) goma xantana en una cantidad de 1 % en p/p de la composición.

6. La composición de la reivindicación 5, que además comprende sucralosa en una cantidad de 0.05 % en p/p de la composición.

7. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, que además comprende un agente aromatizante.

8. La composición de la reivindicación 7, en donde el agente aromatizante es seleccionado de entre sabor a frutos rojos, sabor a multifruta, sabor a caramelo, sabor a cerveza de raíz, sabor a nata, sabor a chocolate, sabor a hierbabuena, sabor a menta, sabor a dulce de manteca, sabor a gualteria y cualquier combinación de los mismos.

9. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde la composición es una suspensión.

10. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde la composición es una solución.

11. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, que además comprende un conservante.

12. La composición de la reivindicación 11, en donde el conservante está presente en una cantidad de 0.01 % a 1.0 % en p/p de la composición.

13. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, que además comprende un antioxidante.

14. La composición de la reivindicación 13, en donde el antioxidante está presente en una cantidad de 0.01 % a 1.0 % en p/p

de la composición.

15. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 11-14, en donde el conservante o el antioxidante es o comprende ácido ascórbico, EDTA, edetato de sodio, un sulfito o cualquier combinación de los mismos.

16. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en donde la composición carece de conservantes.

17. La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde el tampón ácido acuoso es un tampón ácido cítrico.

18. La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde el tampón ácido acuoso es un tampón de acetato.

19. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición presenta un trabajo de adhesión de 150 a 350 g/s.

20. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-19, formulada para administración oral.

21. La composición de la reivindicación 20, proporcionada en un envase unidosis que contiene de 1 a 10 ml de la composición.

22. La composición de la reivindicación 20, proporcionada en un envase unidosis que contiene de 2 a 5 ml de la composición.

23. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-19, formulada para administración rectal.

24. Un método de preparación de una composición farmacéutica mucoadhesiva de corticoesteroide de la reivindicación 1, que comprende preparar una solución o suspensión que comprende budesónida, glicerina y goma xantana.

25. El método de la reivindicación 24, en donde la composición además comprende un tampón ácido acuoso.