

REIVINDICACIONES:

1. Un método para la recuperación posoperatoria en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de 3-((metilsulfonil)amino)-2-(((4-fenilciclohexil)oxi)metil)piperidina-1-carboxilato de metilo, o una sal de este.
2. Un método para facilitar la recuperación o reducir un tiempo de recuperación de la anestesia en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de 3-((metilsulfonil)amino)-2-(((4-fenilciclohexil)oxi)metil)piperidina-1-carboxilato de metilo, o una sal de este.
3. Un método para prevenir o tratar trastornos respiratorios/depresión posoperatorios o trastornos respiratorios/depresión inducida por opioides en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de 3-((metilsulfonil)amino)-2-(((4-fenilciclohexil)oxi)metil)piperidina-1-carboxilato de metilo, o una sal de este.
4. Un método para la reducir un efecto secundario de opioides en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de 3-((metilsulfonil)amino)-2-(((4-fenilciclohexil)oxi)metil)piperidina-1-carboxilato de metilo, o una sal de este.
5. Un método para prevenir o tratar la sedación posoperatoria o la sedación inducida por opioides en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de 3-((metilsulfonil)amino)-2-(((4-fenilciclohexil)oxi)metil)piperidina-1-carboxilato de metilo, o una sal de este.
6. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde la administración es administración no oral.
7. El método de la reivindicación 6, donde la administración no oral es administración intravenosa, administración subcutánea, administración transdérmica o administración transmucosa.