


REIVINDICACIONES

LO QUE SE REIVINDICA ES:

1. Un compuesto de Fórmula (II), o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero
5 farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (II),

10 en donde:

el anillo A es fenilo o heteroarilo;

cada R^A es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -

OR^a, -OC(=O)R^a, -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -

S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -

15 NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo

C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deutoalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆,

aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆,

cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo,

alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se
sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Aa} ;

o dos R^A en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

cada R^{Aa} es independientemente deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -OC(=O)R^a,

5 -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -
NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -
C(=O)R^a, -C(=O)C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, -C(=O)C(=O)NR^cR^d, alquilo
C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo
C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo,
10 heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

o dos R^{Aa} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

n es 0-4;

R^1 y R^2 son independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -

OR^a, -NR^cR^d, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo
15 C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆,
heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o
heterocicloalquilo;

o R^1 y R^2 se toman juntos para formar un oxo;

o R^1 y R^2 se toman juntos para formar un cicloalquilo o heterocicloalquilo; en donde

20 el cicloalquilo y heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con deuterio,
halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -NH₂, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -C(=O)CH₃, -C(=O)OH,
-C(=O)OCH₃, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆,
hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, o heteroalquilo C₁-C₆;

X es $-C(R^3)_2-$, $-NR^4-$, $-O-$ o $-S-$;

cada R^3 son independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OH$, -

OR^a , $-NR^cR^d$, $-C(=O)R^a$, $-C(=O)OR^b$, $-C(=O)NR^cR^d$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo

C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 ,

5 heteroalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, o

heterocicloalquilo;

o dos R^3 se toman juntos para formar un oxo;

R^4 es hidrógeno, $-C(=O)R^a$, $-C(=O)OR^b$, $-C(=O)NR^cR^d$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 ,

deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-

10 C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

R^5 es hidrógeno, deuterio, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OH$, $-OR^a$, $-NR^cR^d$, $-C(=O)R^a$, -

$C(=O)OR^b$, $-C(=O)NR^cR^d$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-

C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-

C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

15 R^6 es hidrógeno, deuterio, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OH$, $-OR^a$, $-NR^cR^d$, $-C(=O)R^a$, -

$C(=O)OR^b$, $-C(=O)NR^cR^d$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-

C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-

C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

R^7 es hidrógeno, deuterio, halógeno, $-CN$, $-NO_2$, $-OH$, $-OR^a$, $-NR^cR^d$, $-C(=O)R^a$, -

20 $C(=O)OR^b$, $-C(=O)NR^cR^d$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-

C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-

C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

el anillo B es heterocicloalquilo o heteroarilo;

cada R^B es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -

OR^a, -OC(=O)R^a, -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -

S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -

NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo

5 C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆,

aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆,

cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo,

alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se

sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Ba};

10 o dos R^B en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

cada R^{Ba} es independientemente deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -OC(=O)R^a,

-OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -

NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -

C(=O)R^a, -C(=O)C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, -C(=O)C(=O)NR^cR^d, alquilo

15 C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo

C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo,

heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

o dos R^{Ba} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

m es 0-4;

20 el anillo C es heteroarilo de 5 miembros;

cada R^C es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -

OC(=O)R^a, -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -

S(=O)₂NR^cR^d, -S(=O)(=NR^b)R^a, -SiR^cR^dOR^b, -NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -

$\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$, $-\text{NR}^b\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$, $-\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$, -

$\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo

$\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo,

heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, (alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$)cicloalquilo, (alquilo $\text{C}_1\text{-}$

5 C_6)heterocicloalquilo, (alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$)arilo, o (alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$)heteroarilo; en donde el alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Ca} ;

cada R^{Ca} es independientemente deuterio, halógeno, $-\text{CN}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}^a$, $-\text{OC}(=\text{O})\text{R}^a$,

$-\text{OC}(=\text{O})\text{OR}^b$, $-\text{OC}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$, $-\text{SH}$, $-\text{SR}^a$, $-\text{S}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$, $-\text{S}(=\text{O})_2\text{NR}^c\text{R}^d$, -

10 NR^cR^d , $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$, $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{NR}^b\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$, $-\text{NR}^b\text{S}(=\text{O})_2\text{R}^a$, -

$\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{C}(=\text{O})\text{C}(=\text{O})\text{R}^a$, $-\text{C}(=\text{O})\text{OR}^b$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$, $-\text{C}(=\text{O})\text{C}(=\text{O})\text{NR}^c\text{R}^d$, alquilo

$\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo

$\text{C}_1\text{-C}_6$, heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo,

heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

15 o dos R^{Ca} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

p es 0-4;

cada R^a es independientemente alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$,

hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo $\text{C}_2\text{-C}_6$,

alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alquilo $\text{C}_1\text{-}$

20 C_6 (cicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (heterocicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (arilo), o alquilo $\text{C}_1\text{-}$

C_6 (heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo,

heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye independientemente y

opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, -

S(=O)CH_3 , $\text{-S(=O)}_2\text{CH}_3$, $\text{-S(=O)}_2\text{NH}_2$, $\text{-S(=O)}_2\text{NHCH}_3$, $\text{-S(=O)}_2\text{N(CH}_3)_2$, -NH_2 , -NHCH_3 , $\text{-N(CH}_3)_2$, -C(=O)CH_3 , -C(=O)OH , -C(=O)OCH_3 , alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, o heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;


- 5 cada R^b es independientemente hidrógeno, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (cicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (heterocicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (arilo), o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye independientemente y opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -S(=O)CH_3 , $\text{-S(=O)}_2\text{CH}_3$, $\text{-S(=O)}_2\text{NH}_2$, $\text{-S(=O)}_2\text{NHCH}_3$, $\text{-S(=O)}_2\text{N(CH}_3)_2$, -NH_2 , -NHCH_3 , $\text{-N(CH}_3)_2$, -C(=O)CH_3 , -C(=O)OH , -C(=O)OCH_3 , alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, o heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$; y

- 15 cada R^c y R^d son independientemente hidrógeno, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, haloalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, deuteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, aminoalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, heteroalquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, alquenilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, alquinilo $\text{C}_2\text{-C}_6$, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (cicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (heterocicloalquilo), alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (arilo), o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ (heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye independientemente y opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -S(=O)CH_3 , $\text{-S(=O)}_2\text{CH}_3$, $\text{-S(=O)}_2\text{NH}_2$, $\text{-S(=O)}_2\text{NHCH}_3$, -

$S(=O)_2N(CH_3)_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)OCH_3$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , o heteroalquilo C_1-C_6 ;

o R^c y R^d se toman juntos con el átomo al que están unidos para formar un

- 5 heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más oxo, deuterio, halógeno, $-CN$, $-OH$, $-OCH_3$, $-S(=O)CH_3$, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2NH_2$, $-S(=O)_2NHCH_3$, $-S(=O)_2N(CH_3)_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)OCH_3$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , o heteroalquilo C_1-C_6 ;



10 siempre que el compuesto no sea


2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo A es heteroarilo.
3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo A es piridilo.
- 15 4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo A es fenilo.
5. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^A es independientemente halógeno.

6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde n es 1 o 2.
7. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una sal, solvato,
5 N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R¹ y R² son hidrógeno y deuterio.
8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde X es -O-.
- 10 9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁵ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquinilo C₂-C₆, o cicloalquilo.
- 15 10. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁵ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, o alquilo C₁-C₆.
11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en
20 donde R⁶ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquinilo C₂-C₆, o cicloalquilo.

12. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^6 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, o alquilo C_1-C_6 .
13. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal,
5 solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^7 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, OR^a , alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , o cicloalquilo.
14. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-13, o una sal,
10 solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^7 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, o alquilo C_1-C_6 .
15. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo B es piridinilo.
- 15 16. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^B es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, - OR^a , alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo C_1-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , o cicloalquilo.
- 20 17. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-16, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^B es independientemente halógeno o alquilo C_1-C_6 .

18. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-17, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^B es independientemente alquilo C₁-C₆.
- 5 19. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-18, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde m es 1 o 2.
- 10 20. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-19, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es tiazolilo, pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, tiadiazol, o triazolilo.
21. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es tiazolilo.
- 15 22. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es pirazolilo.
23. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es imidazolilo.
- 20 24. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es tiadiazol.

25. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-20, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es triazolilo.
26. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-25, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^C es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, o heteroalquilo C₁-C₆.
27. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-26, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^C es independientemente hidroxialquilo C₁-C₆.
28. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-27, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde p es 1 o 2.
29. Un compuesto de la Fórmula (I), o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este:



Fórmula (I),

en donde:

el anillo A es fenilo o heteroarilo;

cada R^A es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -

5 OR^a , -OC(=O) R^a , -OC(=O) OR^b , -OC(=O) NR^cR^d , -SH, - SR^a , -S(=O) R^a , -
 S(=O)₂ R^a , -S(=O)₂ NR^cR^d , - NR^cR^d , - $NR^bC(=O)NR^cR^d$, - $NR^bC(=O)R^a$, -
 $NR^bC(=O)OR^b$, - $NR^bS(=O)_2R^a$, -C(=O) R^a , -C(=O) OR^b , -C(=O) NR^cR^d , alquilo
 C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆,
 aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆,
 10 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo,
 alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se
 sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Aa} ;

o dos R^A en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

cada R^{Aa} es independientemente deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, - OR^a , -OC(=O) R^a ,

15 -OC(=O) OR^b , -OC(=O) NR^cR^d , -SH, - SR^a , -S(=O) R^a , -S(=O)₂ R^a , -S(=O)₂ NR^cR^d , -
 NR^cR^d , - $NR^bC(=O)NR^cR^d$, - $NR^bC(=O)R^a$, - $NR^bC(=O)OR^b$, - $NR^bS(=O)_2R^a$, -
 C(=O) R^a , -C(=O)C(=O) R^a , -C(=O) OR^b , -C(=O) NR^cR^d , -C(=O)C(=O) NR^cR^d , alquilo
 C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo
 C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo,
 20 heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

o dos R^{Aa} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

n es 0-4;

R^1 y R^2 son independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -NR^cR^d, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o

5 heterocicloalquilo;

o R^1 y R^2 se toman juntos para formar un oxo;

o R^1 y R^2 se toman juntos para formar un cicloalquilo o heterocicloalquilo; en donde el cicloalquilo y heterocicloalquilo se sustituye opcionalmente con deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -NH₂, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -C(=O)CH₃, -C(=O)OH,

10 -C(=O)OCH₃, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, o heteroalquilo C₁-C₆;

X es -C(R³)₂-, -NR⁴-, -O- o -S-;

cada R³ son independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -NR^cR^d, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo

15 C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

o dos R³ se toman juntos para formar un oxo;

R⁴ es hidrógeno, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-

20 C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

Z es N o CR⁵;

R^5 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -NR^cR^d, -C(=O)R^a, -

C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-

C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-

C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

5 R^6 es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -NR^cR^d, -C(=O)R^a, -

C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-

C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-

C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

el anillo B es cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo o heteroarilo;

10 cada R^B es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -

OR^a, -OC(=O)R^a, -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -

S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -

NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, alquilo

C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆,

15 aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆,

cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo; en donde el alquilo,

alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se

sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Ba};

o dos R^B en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

20 cada R^{Ba} es independientemente deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -OC(=O)R^a,

-OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -

NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -

C(=O)R^a, -C(=O)C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, -C(=O)C(=O)NR^cR^d, alquilo

C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

o dos R^{Ba} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

5 m es 0-4;

el anillo C es heterocicloalquilo o heteroarilo;

cada R^C es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -

OC(=O)R^a, -OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -

S(=O)₂NR^cR^d, -S(=O)(=NR^b)R^a, -SiR^cR^dOR^b, -NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -

10 NR^bC(=O)R^a, -NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -

C(=O)NR^cR^d, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo

C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo,

heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, (alquilo C₁-C₆)cicloalquilo, (alquilo C₁-

C₆)heterocicloalquilo, (alquilo C₁-C₆)arilo, o (alquilo C₁-C₆)heteroarilo; en donde el

15 alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se

sustituye opcional e independientemente con uno o más R^{Ca};

o dos R^C en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

cada R^{Ca} es independientemente deuterio, halógeno, -CN, -NO₂, -OH, -OR^a, -OC(=O)R^a,

-OC(=O)OR^b, -OC(=O)NR^cR^d, -SH, -SR^a, -S(=O)R^a, -S(=O)₂R^a, -S(=O)₂NR^cR^d, -

20 NR^cR^d, -NR^bC(=O)NR^cR^d, -NR^bC(=O)R^a, -NR^bC(=O)OR^b, -NR^bS(=O)₂R^a, -

C(=O)R^a, -C(=O)C(=O)R^a, -C(=O)OR^b, -C(=O)NR^cR^d, -C(=O)C(=O)NR^cR^d, alquilo

C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo

C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, o heteroarilo;

o dos R^{Ca} en el mismo átomo se toman juntos para formar un oxo;

p es 0-4;

- 5 cada R^a es independientemente alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alquilo C₁-C₆(cicloalquilo), alquilo C₁-C₆(heterocicloalquilo), alquilo C₁-C₆(arilo), o alquilo C₁-C₆(heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye independientemente y
- 10 opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -S(=O)CH₃, -S(=O)₂CH₃, -S(=O)₂NH₂, -S(=O)₂NHCH₃, -S(=O)₂N(CH₃)₂, -NH₂, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -C(=O)CH₃, -C(=O)OH, -C(=O)OCH₃, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, o heteroalquilo C₁-C₆;
- 15

cada R^b es independientemente hidrógeno, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, alquilo C₁-C₆(cicloalquilo), alquilo C₁-C₆(heterocicloalquilo), alquilo C₁-C₆(arilo), o alquilo C₁-C₆(heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye independientemente y opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OCH₃, -S(=O)CH₃, -S(=O)₂CH₃, -S(=O)₂NH₂, -S(=O)₂NHCH₃, -

20


$S(=O)_2N(CH_3)_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OH$, $-C(=O)OCH_3$,
alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 ,
aminoalquilo C_1-C_6 , o heteroalquilo C_1-C_6 ; y

cada R^c y R^d son independientemente hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 ,

5 deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , heteroalquilo
 C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo,
heteroarilo, alquilo C_1-C_6 (cicloalquilo), alquilo C_1-C_6 (heterocicloalquilo), alquilo
 C_1-C_6 (arilo), o alquilo C_1-C_6 (heteroarilo); en donde cada alquilo, alquenilo,
alquinilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo se sustituye

10 independientemente y opcionalmente con uno o más oxo, deuterio, halógeno,
 $-CN$, $-OH$, $-OCH_3$, $-S(=O)CH_3$, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2NH_2$, $-S(=O)_2NHCH_3$, -
 $S(=O)_2N(CH_3)_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OH$, -
 $C(=O)OCH_3$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 ,
hidroxialquilo C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , o heteroalquilo C_1-C_6 ;


15 o R^c y R^d se toman juntos con el átomo al que están unidos para formar un
heterocicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más oxo, deuterio,
halógeno, $-CN$, $-OH$, $-OCH_3$, $-S(=O)CH_3$, $-S(=O)_2CH_3$, $-S(=O)_2NH_2$, -
 $S(=O)_2NHCH_3$, $-S(=O)_2N(CH_3)_2$, $-NH_2$, $-NHCH_3$, $-N(CH_3)_2$, $-C(=O)CH_3$, $-C(=O)OH$,
 $-C(=O)OCH_3$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , deuteroalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo
20 C_1-C_6 , aminoalquilo C_1-C_6 , o heteroalquilo C_1-C_6 ;




30. El compuesto de la reivindicación 29, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo A es heteroarilo.
31. El compuesto de la reivindicación 29, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo A es piridilo.
32. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-31, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^A es independientemente halógeno.
33. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-32, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde n es 1 o 2.
34. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-33, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^1 y R^2 son hidrógeno o deuterio.
35. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-34, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde X es -O-.

36. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-35, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁵ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-
5 C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquinilo C₂-C₆, o cicloalquilo.
37. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-36, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁵ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN o alquilo C₁-C₆.
38. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-37, o una sal,
10 solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁶ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuteroalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, heteroalquilo C₁-C₆, alquinilo C₂-C₆, o cicloalquilo.
39. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-38, o una sal,
15 solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde R⁶ es hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, o alquilo C₁-C₆.
40. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-39, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo B es heteroarilo de 6 miembros.
- 20 41. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-40, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo B es piridinilo.

- 15



46. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-39 o 45, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de



47. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-46, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es un heteroarilo de 5 a 6 miembros.

48. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-47, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde el anillo C es un pirimidinilo.

49. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-48, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^C es independientemente hidrógeno, deuterio, halógeno, -CN, -OH, -OR^a, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, deuterioalquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, aminoalquilo C₁-C₆, o heteroalquilo C₁-C₆.

50. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-49, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde cada R^C es independientemente hidroxialquilo C₁-C₆.

51. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 26-50, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde p es 1 o 2.

52. Un compuesto seleccionado de un compuesto que se encuentra en la Tabla 1 o la especificación, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.
53. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-52, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
54. Un método para tratar una afección que comprende administrar a un sujeto que lo necesita una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-52, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, en donde la afección se selecciona del grupo que consiste en un trastorno autoinmunitario, un trastorno inflamatorio crónico, un trastorno inflamatorio agudo, un trastorno autoinflamatorio, un trastorno fibrótico, un trastorno metabólico, un trastorno neoplásico, y un trastorno cardiovascular o cerebrovascular.
55. Un método para tratar una enfermedad mediada por quinasa p38 MAP en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-52, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.
56. Un método para tratar una enfermedad mediada por MK2 en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente efectiva de un anticuerpo de una cualquiera de las

reivindicaciones 1-52, o una sal, solvato, N-óxido, o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.