

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición farmacéutica que comprende florfenicol en una carga de entre aproximadamente 25 % en peso a aproximadamente 50 % en peso, poloxámero, un portador acuoso y un cosolvente orgánico seleccionado del grupo que consiste en N-metil pirrolidona (NMP), dimetilsulfóxido (DMSO), y PEG 400, en donde dicha composición es una composición inyectable a temperatura ambiente, con la condición de que en donde dicha concentración de florfenicol sea inferior al 35 % en peso la composición comprenda además hidroxipropilcelulosa.
2. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una concentración de dicho florfenicol está entre el 10 % en peso y el 35 % en peso.
3. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una concentración de dicho florfenicol es superior al 35 % en peso, y en donde dicha composición está desprovista de hidroxipropilcelulosa.
4. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde una concentración de dicho florfenicol es superior al 35 % en peso, y en donde dicha composición comprende además hidroxipropilcelulosa.
5. La composición farmacéutica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 o 4, en donde la concentración de dicho florfenicol está entre el 35 % en peso y el 50 % en peso.
6. La composición farmacéutica de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho cosolvente orgánico está presente en una cantidad de entre aproximadamente 5 a aproximadamente 15 % en peso.
7. La composición farmacéutica de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho co-solvente orgánico es N-metil pirrolidona.

8. La composición farmacéutica de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho co-solvente orgánico es N-metil pirrolidona, y en donde dicho florfenicol está presente en una concentración de entre 25 % en peso y 50 % en peso.
- 5 9. La composición farmacéutica de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho solvente orgánico es N-metil pirrolidona, y en donde dicho florfenicol está presente en una concentración entre 35 % en peso y 50 % en peso.