


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de la fórmula (I)



CARACTERIZADO PORQUE

R^1 y R^2 cada uno de manera independiente alquilo C_{1-4} ;

R^3 se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-4} , haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , haloalcoxi C_{1-4} , ciano, nitro, amino, amino N -(alquilo C_{1-4}), amino N,N -di(alquilo C_{1-4}) y amino N -(aril-alquilo C_{1-4});

n es un número entero 1, 2 o 3;

R^4 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C_{1-4} , cicloalquilo C_{3-6} , alcoxi C_{1-4} , cicloalquiloxi C_{3-6} , alquilotio C_{1-4} , cicloalquilotio C_{3-6} , amino, amino N -(alquilo C_{1-4}) y amino N,N -di(alquilo C_{1-4});

R^{5A} , R^{5B} , R^{5C} y R^{5D} cada uno se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino y alquilo C_{1-4} ; y

R^6 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-4} ;

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE R^1 es n-butilo.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE R^2 es n-butilo.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE R^2 es etilo.

5. Un compuesto de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 4, CARACTERIZADO PORQUE R^3 se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino, ciano, haloalquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} y haloalcoxi C_{1-4} .

6. Un compuesto de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 5, CARACTERIZADO PORQUE R^4 se selecciona del grupo que consta de halógeno, hidroxilo, ciano, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , alquilotio C_{1-4} , amino, amino N -(alquilo C_{1-4}) y amino N,N -di(alquilo C_{1-4}).

7. Un compuesto de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 6, CARACTERIZADO PORQUE R^{5A} y R^{5B} cada uno se selecciona de manera independiente del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, amino y metilo.

8. Un compuesto de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 7, CARACTERIZADO PORQUE R^6 es hidrógeno o metilo.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consta de:

ácido propiónico 3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dioxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidrobenzo-1,2,5-tiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico 3-((3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico (S)-3-((3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico (R)-3-((3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido hidroxipropiónico 3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi)-2;

ácido hidroxipropiónico (S)-3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi)-2;

ácido hidroxipropiónico (R)-3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi)-2;

ácido butanoico 3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido butanoico (S)-3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido butanoico (R)-3-((3,3-dibutil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico 3-((3,3-dibutil-7-cloro-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico 3-((3,3-dibutil-5-(4-hidroxifenil)-7-(metiltio)-1,1-dióxido-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico 3-((3-Butil-7-(dimetilamino)-3-etil-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico (S)-3-((3-butil-7-(dimetilamino)-3-etil-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

ácido propiónico (R)-3-((3-butil-7-(dimetilamino)-3-etil-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il)oxi);

serina O-(3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il);

serina (S)-O-((R)-3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il);

serina (R)-O-((R)-3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il);

serina (S)-O-((S)-3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il); y

serina (R)-O-((S)-3-butil-3-etil-7-(metiltio)-1,1-dióxido-5-fenil-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,5-benzotiadiazepin-8-il);

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 9, y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.