



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado de la Fórmula 1, tautómeros, *N*-óxidos y sales del mismo,


**1**

en donde


J se selecciona del grupo que consiste en:




J-1




J-2




J-3




J-4




J-5




J-6



J-7



J-8



J-9

en donde el enlace de J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8 o J-9 que se identifica con "a" está conectado a Q¹ de Fórmula 1, y el enlace que se identifica con "b" está conectado a Q² de Fórmula 1;

cada W es independientemente O o S;

Q¹ y Q² son cada uno independientemente un anillo de fenilo sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados independientemente entre R⁵; o un anillo heteroaromático de 5 a 6 miembros, conteniendo cada anillo miembros anulares seleccionados entre átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de N, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados

independientemente entre R^5 ; o un anillo heterocíclico no aromático de 3 a 6 miembros, conteniendo cada anillo miembros anulares seleccionados entre átomos de carbono y de 1 a 4 heteroátomos seleccionados independientemente entre hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 4 de N, donde hasta 2 miembros anulares se seleccionan independientemente entre $C(=O)$, $C(=S)$, $S(=O)$ y $S(=O)_2$, cada anillo sustituido opcionalmente con hasta 5 sustituyentes seleccionados independientemente de R^5 ;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente H, halógeno, ciano, hidroxilo, nitro, amino, $C(=O)NR^{6a}R^{6b}$, $C(=O)OH$, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , halocicloalquilo C_3-C_6 , cianoalquilo C_2-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxialquilo C_2-C_6 , haloalcoxialquilo C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_6 , haloalqueniloxi C_2-C_6 , alquiniloxi C_2-C_6 , haloalquiniloxi C_2-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_6 , halocicloalcoxi C_3-C_6 , alquilcarboniloxi C_2-C_6 , haloalquilcarboniloxi C_2-C_6 , alcoxicarboniloxi C_2-C_6 , haloalcoxicarboniloxi C_2-C_6 , alquiltio C_1-C_6 , haloalquiltio C_1-C_6 , alquilsulfino C_1-C_6 , haloalquilsulfino C_1-C_6 , alquilsulfonilo C_1-C_6 , haloalquilsulfonilo C_1-C_6 , alquilcarbonilo C_2-C_6 , haloalquilcarbonilo C_2-C_6 , alcoxicarbonilo C_2-C_6 , haloalcoxicarbonilo C_2-C_6 , alquilamino C_1-C_6 , haloalquilamino C_1-C_6 , dialquilamino C_2-C_6 , alquilcarbonilamino C_2-C_6 o alcoxicarbonilamino C_2-C_6 ;

R^2 es ciano, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cianoalquilo C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_6 , haloalqueniloxi C_2-C_6 , alquiniloxi C_2-C_6 , haloalquiniloxi C_2-C_6 , cianoalcoxi C_2-C_6 , alquilcarbonilo C_2-C_6 , haloalquilcarbonilo C_2-C_6 , alcoxicarbonilo C_2-C_6 o haloalcoxicarbonilo C_2-C_6 ; o cicloalquilo C_3-C_6 o cicloalquilalquilo C_4-C_6 , cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, ciano y alquilo C_1-C_3 ;

R^3 es amino, ciano, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cianoalquilo C_2-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_6 , haloalqueniloxi C_2-C_6 , alquiniloxi C_2-C_6 , haloalquiniloxi C_2-C_6 , cianoalcoxi C_2-C_6 , alquilcarbonilo C_2-C_6 , haloalquilcarbonilo C_2-C_6 , alcoxicarbonilo C_2-C_6 o haloalcoxicarbonilo C_2-C_6 ;

R^4 es ciano;

cada R^5 es independientemente amino, ciano, halógeno, hidroxilo, nitro o -U-V-T; o alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , cicloalquilalquilo C_4-C_6 , cianoalquilo C_2-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , alqueniloxi C_2-C_6 , alquiniloxi C_2-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_6 , cianoalcoxi C_2-C_6 , alquilcarboniloxi C_2-C_6 , alquilcarbonilo C_2-C_6 , alcoxicarbonilo C_2-C_6 , alquilamino C_1-C_6 o dialquilamino C_2-C_6 , cada uno opcionalmente sustituido con hasta 5 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y alquilo C_1-C_3 ;

cada R^{6a} y R^{6b} es independientemente H, alquilo C_1-C_3 , haloalquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , haloalcoxi C_1-C_3 , alquilcarbonilo C_2-C_4 o alcoxicarbonilo C_2-C_4 ;

cada U es independientemente un enlace directo, O, $C(=O)$ o NR^7 ;

cada V es independientemente alquilenilo C_1-C_6 , alquenilenilo C_2-C_6 o alquinilenilo C_3-C_6 , en donde hasta 2 átomos de carbono son $C(=O)$, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes

seleccionados independientemente de halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆ y haloalcoxi C₁-C₆;

cada T es independientemente NR^{8a}R^{8b}, OR⁹ o S(=O)_pR¹⁰;

cada p es independientemente 0, 1 o 2;

cada R⁷ es independientemente H, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alquilcarbonilo C₂-C₆, haloalquilcarbonilo C₂-C₆, alcoxicarbonilo C₂-C₆, (alquiltio)carbonilo C₂-C₆ o alcoxi(tiocarbonilo) C₂-C₆;

cada R^{8a} y R^{8b} es independientemente H, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, haloalquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, haloalquinilo C₂-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, halocicloalquilo C₃-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, alquilcarbonilo C₂-C₆ o alcoxicarbonilo C₂-C₆; o

R^{8a} y R^{8b} se toman junto con el átomo de nitrógeno al que están unidos para formar un anillo heterocíclico totalmente saturado de 3 a 6 miembros, conteniendo cada anillo miembros en el anillo, además del átomo de nitrógeno de conexión, seleccionados de átomos de carbono y hasta 2 heteroátomos seleccionados independientemente de hasta 2 átomos de O, hasta 2 de S y hasta 2 de N, cada anillo opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de R¹¹;

cada R⁹ y R¹⁰ es independientemente H, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, haloalquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, haloalquinilo C₂-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, halocicloalquilo C₃-C₆, alquilcarbonilo C₂-C₆, haloalcoxicarbonilo C₂-C₆, alcoxicarbonilo C₂-C₆ o haloalcoxicarbonilo C₂-C₆; y cada R¹¹ es independientemente halógeno, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃ o haloalcoxi C₁-C₃;

siempre que:

(a) cuando J es J-1, entonces como máximo solo uno de Q¹ y Q² es un anillo de fenilo opcionalmente sustituido;

(b) cuando J es J-8, entonces Q¹ es un anillo de fenilo sustituido con al menos un sustituyente R⁵ en una posición orto, y Q² es un anillo de fenilo opcionalmente sustituido;

(c) el compuesto de Fórmula 1 no es:

5-(4-clorofenil)-4-(2,4-diclorofenil)-2,6-bis(1-metiletoxi)pirimidina,

5-(4-clorofenil)-4-(2,4-diclorofenil)-2,6-dietoxipirimidina,

5-(4-clorofenil)-4-(2,4-diclorofenil)-2,6-dimetoxipirimidina,

2,4-dicloro-5-(4-metoxifenil)-6-fenilpirimidina,

2,4-dicloro-5-(4-clorofenil)-6-fenilpirimidina,

2,4-dicloro-6-(4-clorofenil)-5-fenilpirimidina,

2,4-dicloro-6-(4-metilfenil)-5-fenilpirimidina,

2,4-dicloro-5,6-difenilpirimidina,

4-cloro-6-(4-clorofenil)-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,

4-cloro-6-(3-fluorofenil)-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,


4-cloro-6-(3,5-dimetoxifenil)-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,
 4-(4-clorofenil)-6-metil-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,
 4-(3-fluorofenil)-6-metil-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,
 4-(3,5-dimetoxifenil)-6-metil-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina,
 4-(4-clorofenil)-5-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-6-metilpirimidina,
 5-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-4-(3-fluorofenil)-6-metilpirimidina y
 5-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-4-(3,5-dimetoxifenil)-6-metilpirimidina.

2. Un compuesto de la reivindicación 1, en donde


J es J-1, J-2, J-4, J-6, J-7, J-8 o J-9;

W es O;


Q¹ y Q² se seleccionan cada uno independientemente de:




A-1




A-2




A-3




A-4




A-5




A-6




A-7




A-8




A-9




A-10




A-11




A-12




A-13







A-14




A-15




A-16




A-17




A-18




A-19




A-20




A-21




A-22




A-23




A-24




A-25




A-26




A-27




A-28




A-29




A-30




A-31




A-32




A-33




A-34




A-35




A-36




A-37




A-38




A-39




A-40




A-41



A-42




A-43




A-44




A-45



A-46



A-47



en donde el enlace flotante se conecta a la Fórmula 1 a través de cualquier átomo de carbono o

nitrógeno disponible del anillo representado;

cada q es independientemente 0, 1, 2, 3 o 4;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente H, halógeno, ciano, C(=O)NR^{6a}R^{6b}, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, alquenilo C₂-C₃, haloalquenilo C₂-C₃, alquinilo C₂-C₃, haloalquinilo C₂-C₃, cicloalquilo C₃-C₅, halocicloalquilo C₃-C₅, hidroxialquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃, haloalcoxi C₁-C₃, alqueniloxi C₂-C₃, haloalqueniloxi C₂-C₃, alquiniloxi C₂-C₃, haloalquiniloxi C₂-C₃, cicloalcoxi C₃-C₅, alquilamino C₁-C₃ o dialquilamino C₂-C₃;

R² es alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, alquenilo C₂-C₃, haloalquenilo C₂-C₃, cianoalquilo C₂-C₃, alcoxi C₁-C₃ o haloalcoxi C₁-C₃; o cicloalquilo C₃-C₅, opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y metilo;

R³ es ciano, hidroxil, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, cianoalquilo C₂-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, alqueniloxi C₂-C₆, haloalqueniloxi C₂-C₆ o cianoalcoxi C₂-C₆;

cada R⁵ es independientemente ciano, halógeno, nitro o -U-V-T; o alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, cianoalquilo C₂-C₆, alcoxi C₁-C₆, alqueniloxi C₂-C₆, alquiniloxi C₂-C₆, cicloalcoxi C₃-C₆, cianoalcoxi C₂-C₆, alquilcarbonilo C₂-C₆ o alcoxicarbonilo C₂-C₆, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; cada R^{6a} y R^{6b} es independientemente H, metilo, trifluorometilo, metoxi o metilcarbonilo;

cada U es independientemente un enlace directo, O, C(=O) o NH;

cada V es independientemente alquileo C₁-C₃, en donde hasta 1 átomo de carbono es C(=O), cada uno opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, metilo, halometilo y metoxi;

cada T es independientemente NR^{8a}R^{8b} o OR⁹;

cada R^{8a} y R^{8b} es independientemente H, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, ciclopropilo, alquilcarbonilo C₂-C₃ o alcoxicarbonilo C₂-C₃; y

cada R⁹ es independientemente H, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, alquenilo C₂-C₃, haloalquenilo C₂-C₃ o ciclopropilo.

3. Un compuesto de la reivindicación 2, en donde

J es J-1, J-2, J-4, J-6, J-8 o J-9;

Q¹ y Q² se seleccionan cada uno independientemente entre A-1, A-2, A-4, A-19, A-25, A-28, A-31 y A-43;

cada q es independientemente 1, 2 o 3;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente H, halógeno, ciano, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, ciclopropilo, hidroxialquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃ o haloalcoxi C₁-C₃;

R² es alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃, alcoxi C₁-C₃ o haloalcoxi C₁-C₃; o ciclopropilo, opcionalmente sustituido con hasta 2 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y metilo;

R³ es ciano, hidroxil, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆ o cianoalcoxi C₂-C₆;

cada R⁵ es independientemente ciano, halógeno, nitro o -U-V-T; o alquilo C₁-C₃, alqueno C₂-C₃, alquino C₂-C₃, alcoxi C₁-C₃, alqueno C₂-C₃, alquino C₂-C₃, cicloalcoxi C₃-C₆ o cianoalcoxi C₂-C₃, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno;

cada U es independientemente un enlace directo, O o NH;

cada V es independientemente CH₂, CH₂CH₂, C(=O), CH₂C(=O) o C(=O)CH₂;

cada R^{8a} y R^{8b} es independientemente H, alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂ o ciclopropilo; y

cada R⁹ es independientemente metilo o etilo.

4. Un compuesto de la reivindicación 3, en donde

Q¹ y Q² se seleccionan cada uno independientemente entre A-1, A-4 y A-19;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente H, halógeno, ciano, alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂ ciclopropilo o hidroxialquilo C₁-C₂;

R² es alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂ o haloalcoxi C₁-C₂;

R³ es alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃ o alcoxi C₁-C₃; y

cada R⁵ es independientemente ciano, halógeno, nitro, alquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, alqueno C₂-C₃ o cianoalcoxi C₂-C₃, cada uno opcionalmente sustituido con hasta 3 sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno.

5. Un compuesto de la reivindicación 4, en donde

J es J-2, J-4, J-6 o J-8;

Q¹ y Q² son cada uno A-1;

cada q es independientemente 2 o 3;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente H, Br, Cl, F, ciano, metilo, etilo o CH₂F;

R² es metilo, etilo o metoxi;

R³ es metilo o etilo; y

cada R⁵ es independientemente ciano, halógeno, nitro, alquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂ o cianoalcoxi C₂-C₃.

6. Un compuesto de la reivindicación 5, en donde

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente Br, Cl, F, metilo o etilo;

R² es metilo o etilo; y

cada R⁵ es independientemente ciano, Br, Cl, F, metilo o metoxi.

7. Un compuesto de la reivindicación 6, en donde

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente Br, Cl, F, metilo o etilo;

R² es metilo; y

cada R⁵ es independientemente Br, Cl, F, metilo o metoxi.

8. Un compuesto de la reivindicación 7, en donde

J es J-2, J-6 o J-8;

R^{1a} y R^{1b} son cada uno independientemente Br, Cl o metilo;

cada R⁵ es independientemente Br, Cl, F o metoxi.

9. Un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde

J es J-2, J-4, J-6 o J-8; y

Q¹ y Q² son cada uno A-1.

10. Un compuesto de la reivindicación 1 que se selecciona del grupo:

6-(2,4-difluorofenil)-1-(3,5-dimetoxifenil)-3,5-dimetil-4(1*H*)-piridazinona;

1-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-6-(2,4-difluorofenil)-3,5-dimetil-4(1*H*)-piridazinona;

5-cloro-1-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-3-metil-2,4(1*H*,3*H*)-pirimidindiona;

4-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-(2-cloro-4-fluorofenil)-2,6-dimetilpirimidina;

2-cloro-4-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-(2-cloro-4-fluorofenil)-6-metilpirimidina;

4-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-2,6-dimetil-5-(2,4,6-trifluorofenil)pirimidina;

4-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-(2-cloro-4-fluorofenil)-6-etil-2-metilpirimidina;

4-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-(2,6-difluorofenil)-6-etil-2-metilpirimidina;

4-(2-bromo-3,5-dimetoxifenil)-2,6-dimetil-5-(2-cloro-4-fluorofenil)pirimidina;

5-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-1,2-dihidro-1-metil-2-oxo-6-(2,4,6-trifluorofenil)-3-piridincarbonitrilo;

1,2-dihidro-5-(3,5-dimetoxifenil)-1-etil-2-oxo-6-(2,4,6-trifluorofenil)-3-piridincarbonitrilo;

5-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-1,2-dihidro-1-etil-2-oxo-6-(2,4,6-trifluorofenil)-3-piridincarbonitrilo;

3-cloro-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-metil-4(1*H*)-piridazinona;

3-bromo-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-1-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-5-metil-4(1*H*)-piridazinona;

6-(2-cloro-4-fluorofenil)-3,5-dimetil-1-(3,5-dimetoxifenil)-4(1*H*)-piridazinona;

5-cloro-1-(2-cloro-5-metoxifenil)-6-(4-fluorofenil)-3-metil-4(1*H*)-piridazinona;

5-cloro-1-(2-cloro-5-metoxifenil)-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-3-metil-4(1*H*)-piridazinona;

5-bromo-1-(2-cloro-5-metoxifenil)-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-3-metil-4(1*H*)-piridazinona;

5-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,2-dihidro-1-metil-2-oxo-3-piridincarbonitrilo;

y

5-(2-cloro-3,5-dimetoxifenil)-6-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,2-dihidro-1-etil-2-oxo-3-piridincarbonitrilo.

11. Una composición fungicida que comprende (a) un compuesto de la reivindicación 1; y

(b) al menos un componente adicional seleccionado del grupo que consiste en tensioactivos, diluyentes sólidos y diluyentes líquidos.

12. Un método para controlar enfermedades de las plantas provocadas por fitopatógenos fúngicos que comprende aplicar a la planta o porción de la misma, o a la semilla de la planta, una cantidad eficaz como fungicida de un compuesto de la reivindicación 1.