

## **REIVINDICACIONES**

1. Una formulación farmacéutica, que comprende:

un inhibidor de péptido relacionado con gen de calcitonina (CGRP) sintético  
o natural poco permeable o una sal o solvato de éste en una cantidad de 0,01 a  
20% en peso del peso total de la formulación, en donde el inhibidor de CGRP  
sintético o natural poco permeable comprende (R)-N-(3-(7-metil-1H-indazol-5-il)-1-  
(4-(1-metilpiperidin-4-il)piperazin-1-il)-1-oxopropan-2-il)-4-(2-oxo-1,2-  
dihidroquinolin-3-il)piperidina-1-carboxamida (BHV-3500);

una fase lipofílica que comprende triglicéridos de ácidos grasos en una  
cantidad de 50 a 80% en peso del peso total de la formulación; y

por lo menos un tensoactivo lipofílico que comprende ésteres parciales de  
poliol y ácidos grasos en una cantidad de 10 a 50% en peso del peso total de la  
formulación.

2. La formulación de la reivindicación 1, que además comprende por lo menos  
un tensoactivo hidrófilo con un equilibrio lipofílico hidrófilo ("HLB") mayor a 10 en  
una cantidad de 1 a 30% en peso del peso total de la formulación.

3. La formulación de la reivindicación 2, en donde el por lo menos un tensoactivo  
hidrófilo se selecciona del grupo que consiste de monooleato de polioxietileno (20),  
glicéridos caprílico/cáprico de PEG 8, glicéridos caprílico/cáprico de PEG 6,  
poli(oxietileno)(4)Lauril éter y mezclas de estos.

4. La formulación de la reivindicación 1, en donde los triglicéridos de ácidos  
grasos son ácidos grasos de cadena media.

5. La formulación de la reivindicación 1, en donde el tensoactivo lipofílico  
comprende una mezcla de mono y diglicérido de ácidos grasos de cadena media.

6. La formulación de la reivindicación 1, en donde la formulación no incluye agua.

7. Una forma de dosificación farmacéutica de liberación retardada que  
5 comprende:

una formulación farmacéutica que comprende:

un inhibidor de CGRP sintético o natural poco permeable o sal o  
solvato de éste en una cantidad de 0,01 a 20% en peso del peso total de la  
formulación, en donde el inhibidor de CGRP sintético o natural poco  
10 permeable comprende (R)-N-(3-(7-metil-1H-indazol-5-il)-1-(4-(1-  
metilpiperidin-4-il)piperazin-1-il)-1-oxopropan-2-il)-4-(2-oxo-1,2-  
dihidroquinolin-3-il)piperidina-1-carboxamida (BHV-3500);

una fase lipofílica que comprende triglicéridos de ácidos grasos en una  
cantidad de 50 a 80% en peso del peso total de la formulación; y

15 por lo menos un tensoactivo lipofílico que comprende ésteres parciales  
de poliol y ácidos grasos en una cantidad de 10 a 50% en peso del peso total  
de la formulación, en donde la forma de dosis de liberación retardada es una  
forma de dosificación recubierta cuya liberación es dependiente del pH.