

F16			F17					F33			
T6M	T9M	T12M	T0(lyo)	T3M	T6M	T9M	T12M	T0(lyo)	T3M	T6M	T14M
104,1	n.a	101,4	102,8	105,3	102,2	n.a	101,3	69,4	67,5	72,4	n.a
7,5	n.a	7,4	7,7	7,8	7,7	n.a	7,8	7,3	7,3	7,2	n.a
57,6	55,6	58,1	59,9	58,2	57,9	56,1	59,1	61,9	63,5	63,4	62,5
7,5	10,6	7,2	6,9	8,3	7,1	10,3	7,1	8,4	7,7	8,4	7,8
34,9	33,8	34,7	33,3	33,5	35,0	33,5	33,8	29,8	28,8	28,3	29,8
88,6	87,3	89,1	89,7	89,7	89,9	88,8	90,6	93,2	93,1	94,0	92,7
4,1	4,8	3,9	4,0	3,5	3,3	4,0	3,1	2,7	2,7	2,3	2,5
7,2	7,9	6,7	6,2	6,7	6,6	7,1	6,1	3,9	4,2	3,5	4,8
0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1
81,7	81,5	81,4	83,0	82,8	82,4	82,6	82,9	84,1	84,9	83,9	83,8
7,4	7,6	6,7	7,2	7,2	7,8	7,4	6,8	8,4	7,5	8,2	8,1
10,8	11,0	11,8	9,9	10,1	9,8	9,9	10,3	7,4	7,6	7,9	8,1
92,2		90,5	91,6	92,0	92,0		90,5	n.a.			
6,0	n.a	6,1	7,0	6,2	6,4	n.a	6,2				
1,9		3,4	1,5	1,8	1,7		3,3				
88,1	87,6	89,5	89,9	88,8	88,3	89,1	89,5	89,3	n.a.		90,8
10,5	8,1	7,8	9,0	9,7	10,4	7,2	9,2	10,7			9,2
1,4	4,2	2,7	1,1	1,5	1,3	3,7	1,3	0,0			0,0
74%	85%	82%	111%	97%	68%	85%	88%	86%	97%	90%	91%
8,757		4,693	1,541	24,470	16,971		8,171	9,905	984	327	1,172
1,039	n.a	459	155	3,089	2,382	n.a	884	1,106	73	15	64
233		85	28	643	481		240	176	15	0	9
0,1	n.a	0,2	0,0	0,1	0,1	n.a	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
14:11	19:08	07:10	08:53	08:24	12:51	21:29	14:15	14:18 + - 01:12	11:07 + - 05:56	10:22 + - 02:19	04:43 + - 00:31

Apariencia visual, OD_{350} , OD_{550} , $T_{agg, inicio}$, $T_{m, inicio}$, T_m , T_g y

XRD. Para F33, no se determinaron cambios principales con los siguientes métodos analíticos: Apariencia visual, turbidez y color.

FIG. 38 (Continuación)