


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileno o heteroalquileno, en donde cuando R^{1a} es alquileno o heteroalquileno, el alquileno o heteroalquileno se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileno, heteroalquileno o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileno o heteroalquileno, el alquileno o heteroalquileno se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileno o heteroalquileno, en donde cuando R^3 es alquileno o heteroalquileno, el alquileno o heteroalquileno se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;

R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;

D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y


k es un número entero de uno a treinta.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo antiinflamatorio que comprende hidroxilo, amino o tiol.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, en donde el compuesto biológicamente activo antiinflamatorio es un esteroide o un residuo del mismo.

4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, en donde el compuesto biológicamente activo antiinflamatorio es un agonista de LXR o un residuo del mismo.

5. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileo, heteroalquileo o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^3 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;

R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;



D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo antiinflamatorio que comprende hidroxilo, amino o tiol;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y

k es un número entero de uno a treinta.

6. El compuesto de conformidad con la reivindicación 5, en donde D^* es un residuo de un esteroide que comprende hidroxilo, amino o tiol.

7. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador que comprende

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilenos o heteroalquilenos, en donde cuando R^{1a} es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquilenos, heteroalquilenos o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquilenos o heteroalquilenos, en donde cuando R^3 es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;

R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;


R^6 es hidrógeno o alquilo;

D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y


k es un número entero de uno a treinta.

8. El compuesto de conformidad con la reivindicación 7, en donde



L es un enlazador que comprende , y R² es hidrógeno.

9. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alqueno o heteroalqueno, en donde cuando R^{1a} es alqueno o heteroalqueno, el alqueno o heteroalqueno se une además a R³ para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R² es hidrógeno, alqueno, heteroalqueno o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R² es alqueno o heteroalqueno, el alqueno o

heteroalquileo se une además a R³ para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R³ es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R³ es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R² para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R⁴ es hidrógeno o alquilo;

R⁵ es oxígeno, NR⁶ o azufre;

R⁶ es hidrógeno o alquilo;


D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis;

en donde la conjugación de L a BA se selecciona del grupo que consiste en un residuo de química de clic, un residuo de amida y un residuo que comprende dos residuos de cisteína de un solo BA que están químicamente unidos a L; y

k es un número entero de uno a treinta.

10. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquilenos o heteroalquilenos, en donde cuando R^{1a} es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquilenos, heteroalquilenos o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquilenos o heteroalquilenos, en donde cuando R^3 es alquilenos o heteroalquilenos, el alquilenos o heteroalquilenos se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;

R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;


R^6 es hidrógeno o alquilo;

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y

k es un número entero de uno a treinta.

11. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10 que tiene la estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo o alquileno, en donde cuando R^{1a} es alquileno, el alquileno se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^2 es hidrógeno o una cadena lateral de aminoácidos;


R^3 es hidrógeno, alquilo o alquileno, en donde cuando R^3 es alquileno, el alquileno se une además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y

k es un número entero de uno a treinta.

12. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10 que tiene la siguiente estructura



L es un enlazador;

BA es un agente de unión;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo o alquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo, el alquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^2 es hidrógeno o una cadena lateral de aminoácidos;

R^3 es hidrógeno, alquilo o alquileo, en donde cuando R^3 es alquileo, el alquileo se une además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;


D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo;

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis; y


k es un número entero de uno a treinta.

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las



reivindicaciones 1-12, en donde el enlazador comprende




14. El compuesto de la reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en




15. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en







,







,



, y






$$\text{BA} \left[\text{SP}^1 - (\text{AA})_p - \text{SP}^2 - \left[\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{N} - \text{CH}_2 - \text{C}(=\text{O}) - \text{N}(\text{R}^3) - \text{C}(\text{R}^{1a})(\text{R}^{1b}) - \text{O}-\text{D}^* \\ | \\ \text{R}^2 \end{array} \right]_n \right]_k \text{ en donde}$$

cada AA es un aminoácido; y

p es un número entero de 1 a 10.

13

18. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde BA es un anticuerpo modificado con transglutaminasa o un fragmento de unión a antígeno del mismo que comprende al menos un residuo de glutamina para la conjugación.


19. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde BA es un anticuerpo modificado con transglutaminasa o un fragmento de unión a antígeno del mismo que comprende al menos dos residuos de glutamina para la conjugación.

20. El compuesto de conformidad con la reivindicación 17, en donde BA es un anticuerpo modificado con transglutaminasa o un fragmento de unión a antígeno del mismo que comprende al menos cuatro residuos de glutamina para la conjugación.


21. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde BA es un anticuerpo modificado por transglutaminasa o un fragmento de unión a antígeno del mismo, en donde la conjugación es en dos residuos Q295; y k es 2.

22. El compuesto de conformidad con la reivindicación 20, en donde BA es un anticuerpo modificado con transglutaminasa o un fragmento de unión a antígeno del mismo, en donde la conjugación es en dos residuos Q295 y dos residuos N297Q; y k es 4.


23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, que tiene la siguiente estructura




24. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, que tiene la siguiente estructura



25. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, que tiene la siguiente estructura




26. El compuesto de conformidad con la reivindicación 10, que tiene la siguiente estructura




27. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, en donde SP¹ comprende un grupo reactivo que comprende un alquino.

28. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, en donde



SP² comprende

29. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, en donde



SP² comprende , y R² es hidrógeno o alquilo.

30. El compuesto de conformidad con la reivindicación 16, en donde el agente de unión es un anticuerpo modificado con un compuesto de amina primaria de acuerdo con la Fórmula H₂N-LL-X, en donde LL es un enlazador divalente seleccionado del grupo que consiste en

un grupo polietilenglicol divalente (PEG);

-(CH₂)_n-;

$-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-(\text{CH}_2)_p-$;
 $-(\text{CH}_2)_n-\text{N}(\text{H})\text{C}(\text{O})-(\text{CH}_2)_m-$;
 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{N}(\text{H})\text{C}(\text{O})-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m-(\text{CH}_2)_p-$;
 $-(\text{CH}_2)_n-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{H})-(\text{CH}_2)_m-$;
 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{H})-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m-(\text{CH}_2)_p-$;
 $-(\text{CH}_2)_n-\text{N}(\text{H})\text{C}(\text{O})-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m-(\text{CH}_2)_p-$;
 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{N}(\text{H})\text{C}(\text{O})-(\text{CH}_2)_m-$;
 $-(\text{CH}_2)_n-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{H})-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_m-(\text{CH}_2)_p-$; y
 $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{H})-(\text{CH}_2)_m-$,


en donde

n es un número entero seleccionado de 1 a 12;

m es un número entero seleccionado de 0 a 12;

p es un número entero seleccionado de 0 a 2; y


X se selecciona del grupo que consiste en $-\text{SH}$, $-\text{N}_3$, $-\text{C}\equiv\text{CH}$, $-$




31. El compuesto de conformidad con la reivindicación 27, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición.

32. El compuesto de conformidad con la reivindicación 31, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con el agente de unión, en donde el agente de unión es un agente de unión funcionalizado con azido.


33. El compuesto de conformidad con la reivindicación 32, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con el agente de unión, el agente de unión es un agente de unión funcionalizado con




34. El compuesto de conformidad con la reivindicación 32, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con el agente de unión, el agente de unión es un agente de unión funcionalizado con



35. El compuesto de conformidad con la reivindicación 30, en donde el agente de unión es un anticuerpo modificado con una amina primaria que tiene la siguiente estructura



36. El compuesto de conformidad con la reivindicación 35, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en



;





















;




;



;





;



;




























37

















;




45



;




;



;

en donde k es 1, 2, 3 o 4.

37. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

L es un enlazador que comprende un resto reactivo con un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileo, heteroalquileo o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^3 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;

R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol; y


n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis.

38. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, en donde cuando D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol, entonces el compuesto biológicamente activo o residuo del mismo es un compuesto biológicamente activo antiinflamatorio o residuo del mismo.

39. El compuesto de conformidad con la reivindicación 38, en donde el compuesto biológicamente activo antiinflamatorio es un esteroide o un residuo del mismo.

40. El compuesto de conformidad con la reivindicación 38, en donde el compuesto biológicamente activo antiinflamatorio es un agonista de LXR o un residuo del mismo.

41. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

L es un enlazador que comprende un resto reactivo con un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileo o heteroalquileo, en

donde cuando R^{1a} es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileo, heteroalquileo o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^3 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;


R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis.

42. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41 que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

L es un enlazador que comprende un resto reactivo con un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo o alqueno, en donde cuando R^{1a} es alqueno, el alqueno se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;


R^2 es hidrógeno o una cadena lateral de aminoácidos;

R^3 es hidrógeno, alquilo o alqueno, en donde cuando R^3 es alqueno, el alqueno se une además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis.

43. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41 que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

L es un enlazador que comprende un resto reactivo con un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo;

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo o alqueno, en donde cuando R^{1a} es alqueno, el alqueno se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;


R^2 es hidrógeno o una cadena lateral de aminoácidos;

R^3 es hidrógeno, alquilo o alquileo, en donde cuando R^3 es alquileo, el alquileo se une además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;


D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis.


44. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 37-43, en donde el enlazador comprende además




45. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, seleccionado del grupo que consiste en




L1-PI;




L1-P11-1;




L1-P11-2;




L1-P11-3;




L1-P11-4;




L1-P11-5;




L1-P11-6;




L1-P11-7;




L1-P11-8;




L1-P11-9;




L1-P11-10;




L1-P11-1;




L2-P11-1;




L3-P11-1;




PIII-1;




L5-PIII-1;




L1-PIII-4;



L6-P11-9;




L7-P11-1;




L4-


PI;




L1-P11-11;




L1-P11-12;




L8-P11-1;




L9-P11-1;




L10-P11-1;



L11-P11-2;




L12-P11-2;




L13-P11-


1;




L14-P11-1;




L15-P11-1;




L16-P11-1;




L17-P11-1;




L6-P11-13;




L18-PII-1;




L19-PIII-1;



L9-PIII-1;




L12-PIII-5;




L13-PIII-

1;




L1-PIV; and



L14-PIV.


46. Un método para preparar un conjugado de anticuerpo-fármaco, que comprende poner en contacto un agente de unión con un compuesto de conformidad con la reivindicación 41.

47. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

50. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

51. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, en donde el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

SP¹ y SP², cuando están presentes, son grupos separadores en los que SP¹ comprende además un resto reactivo con un anticuerpo o un fragmento de unión a antígeno del mismo;


cada AA es un aminoácido; y

p es un número entero de 1 a 10.


52. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde SP¹ comprende un grupo reactivo que comprende un alquino.

53. El compuesto de conformidad con la reivindicación 52, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición.

54. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde




55. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde




56. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con una azida para formar restos regioisoméricos de 1,2,3-triazolilo, en donde la azida comprende un agente de unión funcionalizado con azido.

57. El compuesto de conformidad con la reivindicación 56, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con una azida para formar restos regioisoméricos de 1,2,3-triazolilo, la azida comprende un agente de unión funcionalizado con azido, y SP² comprende



58. El compuesto de conformidad con la reivindicación 56, en donde el alquino es capaz de participar en una reacción de 1,3-cicloadición con una azida para formar restos regioisoméricos de 1,2,3-triazolilo, la azida comprende



un agente de unión azido-funcionalizado, SP^2 comprende

y R^2 es hidrógeno o alquilo.

59. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno o metilo;

R^3 es hidrógeno; y


n es dos.

60. El compuesto de conformidad con la reivindicación 59, en donde


D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

61. El compuesto de conformidad con la reivindicación 60,


seleccionado del grupo que consiste en



;




; y




una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

62. El compuesto de conformidad con la reivindicación 61, en donde el compuesto es



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

63. El compuesto de conformidad con la reivindicación 61, en donde el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

64. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno, metilo o $-\text{CH}_2\text{Ph}$;

R^3 es hidrógeno o alquilo; y


n es uno.


65. El compuesto de conformidad con la reivindicación 64, en donde

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.


66. El compuesto de conformidad con la reivindicación 65,

seleccionado del grupo que consiste en







;








;













;




;












;




;





;



;




;




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

67. El compuesto de conformidad con la reivindicación 66, en donde el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

68. El compuesto de conformidad con la reivindicación 66, en donde el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

69. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno;

R^3 es alquilo; y


n es uno.

70. El compuesto de conformidad con la reivindicación 69, en donde

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

71. El compuesto de conformidad con la reivindicación 70 que tiene

una estructura



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

72. El compuesto de conformidad con la reivindicación 69, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno;


R^3 es alquilo;

R^4 es alquilo; y

n es uno.

73. El compuesto de conformidad con la reivindicación 72, en donde D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

74. El compuesto de conformidad con la reivindicación 73, que tiene la siguiente estructura



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

75. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde

R^{1a} es alquilo o arilalquilo;

R^{1b} es hidrógeno;


R^2 es hidrógeno;

R^3 es hidrógeno; y


n es uno.

76. El compuesto de conformidad con la reivindicación 75, en donde D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

77. El compuesto de conformidad con la reivindicación 76, seleccionado del grupo que consiste en



; y



;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

78. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde R^{1a} es alquileo, adicionalmente unido a R³ para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^{1b} es hidrógeno;


R² es hidrógeno;

R³ es alquileo unido además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros; y


n es uno.

79. El compuesto de conformidad con la reivindicación 78, en donde D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

80. El compuesto de conformidad con la reivindicación 79, seleccionado del grupo que consiste en




; y



; o


una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

81. El compuesto de conformidad con la reivindicación 79, que tiene la estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

82. El compuesto de conformidad con la reivindicación 80, en donde el compuesto es



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

83. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno;

R^3 es hidrógeno; y


n es uno.

84. El compuesto de conformidad con la reivindicación 83, en donde

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

85. El compuesto de conformidad con la reivindicación 84, que tiene

la siguiente estructura



una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

86. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno o $-\text{CH}_2\text{Ph}$;


R^3 es hidrógeno; y

n es cuatro.


87. El compuesto de conformidad con la reivindicación 86, en donde


D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

88. El compuesto de conformidad con la reivindicación 87, seleccionado del grupo que consiste en



;





o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

89. El compuesto de conformidad con la reivindicación 43, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^3 es hidrógeno; y


n es cero.

90. El compuesto de conformidad con la reivindicación 89, en donde


D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

91. El compuesto de conformidad con la reivindicación 90,

seleccionado del grupo que consiste en



y



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

92. El compuesto de conformidad con la reivindicación 41, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es hidrógeno o $-CH_2OH$;

R^3 es hidrógeno; y


n es seis.

93. El compuesto de conformidad con la reivindicación 92, en donde

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

94. El compuesto de conformidad con la reivindicación 93, que tiene

la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

95. El compuesto de conformidad con la reivindicación 51, en donde

R^{1a} y R^{1b} son hidrógeno;

R^2 es alquileo, en donde el alquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 6 miembros; R^3 es alquileo, en donde el alquileo se une además a R^2 para formar el heterociclilo de 6 miembros; y


n es uno.

96. El compuesto de conformidad con la reivindicación 95, en donde

D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.


97. El compuesto de conformidad con la reivindicación 96, en donde

el compuesto es



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

98. Un compuesto que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alqueno, alquino, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileo, heteroalquileo o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^3 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 3, 4, 5, 6, 7 u 8 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;


R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis.

99. El compuesto de conformidad con la reivindicación 98, que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^2 es hidrógeno, alquileo, heteroalquileo o una cadena lateral de aminoácido, en donde cuando R^2 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^3 es hidrógeno, alquilo, alquileo o heteroalquileo, en donde cuando R^3 es alquileo o heteroalquileo, el alquileo o heteroalquileo se une además a R^{1a} o R^2 para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^4 es hidrógeno o alquilo;


R^5 es oxígeno, NR^6 o azufre;

R^6 es hidrógeno o alquilo;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo, amino o tiol; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro o cinco.

100. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, que tiene la siguiente estructura



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R^{1a} y R^{1b} son, independientemente, hidrógeno, alquilo, alcoxi, alquenilo, alquinilo, arilo, arilalquilo, heteroarilo o alquileo, en donde cuando R^{1a} es alquileo, el alquileo se une además a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;


R^2 es hidrógeno o una cadena lateral de aminoácidos;

R^3 es hidrógeno, alquilo o alquileo, en donde cuando R^3 es alquileo, el alquileo se une además a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

D^* es acilo o un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo; y

n es cero, uno, dos, tres, cuatro o cinco.

101. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, en donde el compuesto tiene la siguiente estructura




102. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 98 a 101, en donde R^{1a} y R^{1b} son cada uno hidrógeno.

103. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 98 a 102, en donde n es dos.


104. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 98 a 103, en donde n es dos y R² es hidrógeno o metilo.

105. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 98 a 104, en donde n es dos, R² es hidrógeno o metilo, R³ es hidrógeno y D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.


106. El compuesto de conformidad con la reivindicación 105, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



,



, y



; o


una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

of 


109. El compuesto de conformidad con la reivindicación 108, en hidrógeno, metilo o $-\text{CH}_2\text{Ph}$.

111. El compuesto de conformidad con la reivindicación 110, en donde D* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.


86




,




,




,




,



,



, y




una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

113. El compuesto de conformidad con la reivindicación 108, en donde R^2 es hidrógeno o metilo.

114. El compuesto de conformidad con la reivindicación 113, en donde R^3 es alquilo.


115. El compuesto de conformidad con la reivindicación 114, en donde D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

116. El compuesto de conformidad con la reivindicación 115, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en



una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

117. El compuesto de conformidad con la reivindicación 108, en donde el compuesto es




118. El compuesto de conformidad con la reivindicación 108, en donde R^2 es alquileo, en donde el alquileo está adicionalmente unido a R^3 para formar un heterociclilo de 6 miembros; y

R^3 es alquileo, en donde el alquileo se une además a R^2 para formar el heterociclilo de 6 miembros.

119. El compuesto de conformidad con la reivindicación 118, en donde D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

120. Los compuestos de conformidad con la reivindicación 119, en donde el compuesto es



; o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

121. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, en donde R^{1a} es alquilo o arilalquilo y R^{1b} es hidrógeno.


122. El compuesto de conformidad con la reivindicación 121, en donde n es uno.

123. El compuesto de conformidad con la reivindicación 122, en donde R^2 es hidrógeno.

124. El compuesto de conformidad con la reivindicación 123, en donde R^3 es hidrógeno.

125. El compuesto de conformidad con la reivindicación 124, en donde D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.

126. El compuesto de conformidad con la reivindicación 125, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en



una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

127. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, en donde R^{1a} es alquileo, en donde el alquileo está adicionalmente unido a R^3 para formar un heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros;

R^{1b} es hidrógeno; y



R^3 es alquileo unido adicionalmente a R^{1a} para formar el heterociclilo de 4, 5 o 6 miembros.

128. El compuesto de conformidad con la reivindicación 127, en donde n es uno.



129. El compuesto de conformidad con la reivindicación 128, en donde R^2 es hidrógeno.







130. El compuesto de conformidad con la reivindicación 129, en donde D^* es un residuo de un compuesto biológicamente activo que comprende hidroxilo.







131. El compuesto de conformidad con la reivindicación 130, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en




132. El compuesto de la reivindicación 98, seleccionado del grupo que consiste en












PII-12;



PII-13;









PIII-5; and




PIV.


133. Un conjugado anticuerpo-fármaco que comprende un anticuerpo, o un fragmento de unión a antígeno del mismo, en donde dicho anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del mismo se conjuga con un compuesto de conformidad con la reivindicación 41 o 99.

134. El conjugado anticuerpo-fármaco de conformidad con la reivindicación 133, en donde el compuesto conjugado se selecciona del grupo que consiste en







;




;




;




;




;




;




;




;




;




;




;




;



;




; y




.

135. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

136. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

137. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

138. El compuesto de conformidad con la reivindicación 99, que tiene la siguiente estructura




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


139. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en




Q1L1-PI;





Q2L1-P11-1;




Q1L1-P1I-2;




Q1L1-P1I-3;




Q1L1-PII-4;




Q1L1-P11-5;





Q1L1-PII-6;





Q1L1-PII-8;




Q1L1-PII-9;




Q2L3-PIII-1;




Q1L5-PIII-1;




Q1L1-P11-1;




Q1L1-PIII-4;







Q2L6-P1I-9;





Q2L7-PII-1;




Q1L1-PII-11;




Q1L1-PII-12;




Q1L6-P1I-9;




Q1L7-P1I-1;





Q1L15-P1I-1;



Q1L17-P1I-1;




Q1L6-P11-13;



Q1L13-PIII-1; and





Q1L1-PIV.

140. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 45 o 47 a 139 y un excipiente, portador o diluyente farmacéuticamente aceptable.