


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto conforme a la Fórmula (I):



en donde

A se selecciona a partir del grupo que consiste en O, C(=O), S(=O)₂, NR¹ y CR¹R², donde R¹ y R² considerados en forma independiente se seleccionan a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C₁-C₆ y cicloalquilo C₃-C₈;

m es 0, 1 o 2;

T se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, o -alquilo C₁-C₆;

R³ y R⁴ considerados en forma independiente se seleccionan a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo C₁-C₆, y cicloalquilo C₃-C₈;

R⁵ se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, y alcoxi C₁-C₆;

L representa un enlace directo o L se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilenilo C₁-C₆, alquilenilo C₁-C₆ sustituido en un mismo átomo de carbono con dos sustituyentes que forman en forma conjunta con el átomo al que están unidos un cicloalquilo C₃-C₈, alquilenilo C₂-C₆, y cicloalquilenilo C₃-C₈;

en donde los sustituyentes L alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes L^{Sa} que pueden ser el mismo o diferente

L^{Sa} se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno;

R⁶ se selecciona a partir del grupo que consiste en indanilo, 1,2,3,4-tetrahidro-naftalenilo, espiro[ciclopropano-1,2'-indano]-1-ilo, fenilo, naftilo, 2,3-dihidrobenzofuranilo, indolinilo, 1,3-benzodioxolilo, cromanilo, isocromanilo, tiocromanilo, 2,3-dihidro-1,4-benzodioxinilo, 5,6,7,8-tetrahidroquinolinilo, 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofenilo, furanilo, tienilo, piridinilo, pirimidinilo, indolilo, benzofuranilo, benzotiofenilo, benzoxazolilo, quinolinilo, isoquinolinilo, pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilo, fenoxi, benciloxi y fenilsulfanilnon;

en donde los sustituyentes R⁶ cíclicos o la porción cíclica de los mismos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R^{6S} que pueden ser el mismo o diferentes,

R^{6S} se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, haloalcoxi C₁-C₆, alquilenilo C₂-C₆, haloalquilenilo C₂-C₆, alquinilo C₂-C₆, haloalquinilo C₂-C₆, alquilsulfanilo C₁-C₆, haloalquilsulfanilo C₁-C₆, cicloalquilfenilo C₃-C₈, piridinilo, pirimidinilo, tienilo, furanilo, imidazolilo, triazolilo, pirazolilo,

oxazolilo, triazolilo, oxetanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropirano, pirrolidinilo, azetidinilo y morfolinilo;

en donde los sustituyentes cíclicos R^{6S} pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 y alcóxicarbonilo C_1-C_6 ;

en donde los sustituyentes R^{6S} alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, y $-Si(C_1-C_6\text{-alquilo})_3$;

R^7 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , hidroxialquilo C_1-C_4 , alquilcarbonilo C_1-C_4 , alcoxí C_1-C_4 , alqueno C_2-C_4 , alquino C_2-C_4 , alquilsulfano C_1-C_4 , alquensulfano C_1-C_4 , -alquilsulfonilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , piridinilo, imidazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxetanilo, tetrahidrofurano, pirrolidinilo, $-N(R^e)_2$, $-C(=NR^f)R^f$, y $-C(=O)N(R^g)_2$;

en donde R^e se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 , y cicloalquilo C_3-C_6 ;

en donde R^f se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en alquilo C_1-C_4 , y alcoxí C_1-C_4 ;

en donde R^g se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 , y cicloalquilo C_3-C_6 ;

en donde los sustituyentes R^7 , R^e , R^f y R^g alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R^{7Sa} que pueden ser los mismos o diferentes;

en donde los sustituyentes R^7 cíclicos o la porción cíclica de los mismos, R^e cíclico y R^g cíclico pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R^{7Sc} que pueden ser los mismos o diferentes;

R^{7Sa} se selecciona a partir del grupo que consiste en ciano, hidroxilo, alcoxí C_1-C_6 , y $-O-Si(\text{alquilo } C_1-C_6)_3$;

R^{7Sc} se selecciona a partir del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , -haloalquilo C_1-C_6 , alcoxí C_1-C_6 , haloalcoxí C_1-C_6 , y cicloalquilo C_3-C_8 ;

R^8 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , -alcoxí C_1-C_6 , -haloalcoxí C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , haloalqueno C_2-C_6 , alquino C_2-C_6 , -haloalquino C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo, oxetanilo, azetidinilo, tetrahidrofurano, pirrolidinilo, furano, tienilo, oirrolilo, pirazolilo, tiazolilo, imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, piridinilo, pirimidinilo, $-N(R^h)_2$, y $-SR^i$;

en donde R^h se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , alcoxí C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , haloalqueno C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo, oxetanilo, azetidinilo, pirrolidinilo y tetrahidrofurano;

en donde R^i se selecciona a partir del grupo que consiste en alquilo C_1-C_6 , y haloalquilo C_1-C_6 ;

en donde los sustituyentes R^8 , R^h y R^i alifáticos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R^{8Sa} que pueden ser los mismos o diferentes,

en donde los sustituyentes R^8 , y R^h cíclicos pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes R^{8Sc} que pueden ser los mismos o diferentes,

R^{8Sa} se selecciona a partir del grupo que consiste en hidroxilo, carboxilo, alcoxi C_1-C_6 , alcóxicarbonilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , alquilsulfanilo C_1-C_6 , haloalquilsulfanilo C_1-C_6 , oxetanilo, dioxolanilo, azetidino, pirrolidinilo y tetrahidrofuranilo;

R^{8Sc} se selecciona a partir del conjunto que consiste en halógeno, hidroxilo, oxo, alquilo C_1-C_4 , -haloalquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , oxetanilo, azetidino, pirrolidinilo y tetrahidrofuranilo, o dos sustituyentes R^{8Sc} junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de oxetanilo;

Q se selecciona a partir del grupo que consiste en fenilo, naftilo, biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienilo, benzodioxolilo, 2,3-dihidrobenzofuranilo, ciclopenta[b]piridinilo, indanilo, benzofuranilo, benzotienilo, quinolinilo, piridinilo, pirazolilo, tiazolilo, tienilo e indolilo, en donde dichos grupo Q pueden estar sustituidos con uno a tres sustituyentes Q^S seleccionados independientemente del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, formilo, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , alquilcarbonilo C_1-C_4 , alquilcarbonilo C_1-C_4 , alcóxicarbonilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , haloalcoxi C_1-C_4 , alqueno C_2-C_4 , alquino C_2-C_4 , alquilsulfanilo C_1-C_4 , haloalquilsulfanilo C_1-C_4 , alquilsulfonilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , heterociclo monocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, fenilo, heterociclo aromático de 5 o 6 miembros y $-N(R^k)_2$, en donde R^k se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_6 ;

en donde dichos sustituyentes Q^S alifáticos pueden estar sustituidos por uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en hidroxilo, alcoxi C_1-C_4 , haloalcoxi C_1-C_4 , alcóxicarbonil C_1-C_4 , haloalcóxicarbonil C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_6 ;

así como sales, N-óxidos y solvatos de los mismos.

2. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R^6 se selecciona a partir del grupo que consiste en indanilo, fenilo, naftilo, 2,3-dihidro-benzofuranilo, 1,3-benzodioxolilo, furanilo, tienilo, piridinilo, indolilo, benzo-furanilo, benzotiofenilo, pirrolo[2,3-b]piridin-3-ilo, fenoxi, benciloxi y fenilsulfanilo, donde dichos grupos R^6 pueden estar sustituidos con de uno a tres sustituyentes R^{6S} independientemente seleccionados a partir del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxilo, alquilo C_1-C_4 , halo-alquilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , haloalcoxi C_1-C_4 , alqueno C_2-C_4 , alquino C_2-C_4 , -haloalquilsulfanilo C_1-C_4 , ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, piridinilo, oxetanilo y tetrahidrofuranilo;

en donde los sustituyentes R^{6S} cíclicos pueden estar sustituidos con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 y alcoxycarbonilo C_1-C_4 .

3. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde R^7 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_1-C_4 , haloalquilo C_1-C_4 , hidroxialquilo C_1-C_4 , alquilcarbonilo C_1-C_4 , alcoxi C_1-C_4 , alquenilo C_2-C_4 , alquinilo C_2-C_4 , alquilsulfanilo C_1-C_4 , alquensulfanilo C_1-C_4 , alquilsulfonilo C_1-C_4 , cicloalquilo C_3-C_6 , piridinilo, imidazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxetanilo, tetrahidrofuranilo, pirrolidinilo, $-N(R^e)_2$, $-C(=NR^f)R^f$ y $-C(=O)N(R^g)_2$;

en donde R^e se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_6 ,

en donde R^f se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en alquilo C_1-C_4 y alcoxi C_1-C_4 ,

en donde R^g se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C_1-C_4 y cicloalquilo C_3-C_6 , en donde

dichos sustituyentes R^7 , R^e y R^g alifáticos pueden estar sustituidos con de uno a tres sustituyentes R^{7Sa} seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en hidroxilo, -alcoxi C_1-C_4 y -cicloalquilo C_3-C_6 , y

dichos sustituyentes R^7 , R^e y R^g cíclicos pueden estar sustituidos con de uno a tres sustituyentes R^{7Sc} seleccionados independientemente a partir del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_4 y alcoxi C_1-C_4 .

4. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde A se selecciona a partir del grupo que consiste en O, $C(=O)$, $S(=O)_2$, NR^1 y CR^1R^2 , en donde R^1 es hidrógeno o alquilo C_1-C_4 y R^2 es un átomo de hidrógeno.

5. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde

m es 0, 1 o 2;

T se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno;

R^3 y R^4 se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno, flúor, cloro, y alquilo C_1-C_4 ;

R^5 se selecciona a partir del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, y alcoxi C_1-C_4 .

6. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde L representa un enlace directo o L se selecciona a partir del conjunto que consiste en alquilenos C_1-C_6 ,

en donde los sustituyentes L alifáticos pueden estar sustituidos con de uno a tres sustituyentes L^{Sa} que se seleccionan independientemente a partir del grupo que

consiste en flúor, cloro, hidroxilo, alcoxi C₁-C₄, -haloalcoxiC₁-C₄ y -cicloalquilo C₃-C₆;

en donde los sustituyentes L cíclicos o la porción cíclica de los mismos pueden estar sustituidos con de uno a tres sustituyentes L^{Sc} que se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en flúor, cloro, hidroxilo, oxo, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄ y cicloalquilo C₃-C₆.

7. El compuesto de Fórmula (I) conforme a cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde

A es O;

m es 1;

T es hidrógeno;

R³ y R⁴ se seleccionan independientemente a partir del grupo que consiste en hidrógeno o flúor;

R⁵ es hidrogeno;

L representa un enlace directo o L es metileno;

R⁶ es fenilo;

en donde el fenilo puede estar sustituido con uno o dos sustituyentes R^{6S} que pueden ser iguales o diferentes,

R^{6S} se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄, alquenilo C₂-C₄, alquinilo C₂-C₄, haloalquilo-sulfanilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₅, piridinilo, oxetanilo y tetrahidrofuranilo.

R⁷ se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁-C₄,

R⁸ es hidrógeno,

Q es fenilo,

en donde dicho fenilo puede estar sustituido con uno o dos sustituyentes Q^S que pueden ser iguales o diferentes,

Q^S se selecciona del grupo que consiste en halógeno, ciano, nitro, formilo, alquilo C₁-C₄, haloalquilo C₁-C₄, alcoxi C₁-C₄, haloalcoxi C₁-C₄, alquenilo C₂-C₄, alquinilo C₂-C₄ alquilsulfanilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₅, oxiranilo y oxetanilo.

8. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona entre:


(5RS)-3-[3-(3-cloro-2-fluorofenoxi)-6-metilpiridazin-4-il]-5-(2-cloro-4-metilbencil)-5,6-dihidro-4H-1,2,4-oxadiazina;

(5R)-3-[3-(3-cloro-2-fluorofenoxi)-6-metilpiridazin-4-il]-5-(2-cloro-4-metilbencil)-5,6-dihidro-4H-1,2,4-oxadiazina;

(5S)-3-[3-(3-cloro-2-fluorofenoxi)-6-metilpiridazin-4-il]-5-(2-cloro-4-metilbencil)-5,6-dihidro-4H-1,2,4-oxadiazina.

9. El compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es: (5S)-3-[3-(3-cloro-2-fluorofenoxi)-6-metilpiridazin-4-il]-5-(2-cloro-4-metilbencil)-5,6-dihidro-4H-1,2,4-oxadiazina.


10. Un proceso para preparar un compuesto conforme a la Fórmula (I-a-1),



en donde L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, y

m es 1 o 2,


en el cual un compuesto de la Fórmula (1)



en donde Q, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba, y

U¹ es hidróxido, halógeno o alcoxi C₁-C₆,


se hace reaccionar con un compuesto de la Fórmula (2)



en donde m, L, R³, R⁴, R⁵ y R⁶ son tal como se definen más arriba, y


W es hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo, alilo o (4-metoxifenil)metilo, o una sal del mismo

para dar lugar a un compuesto de Fórmula (3)



en donde m, L, W, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba,


a partir del cual se elimina un grupo ftalamida para dar lugar a un compuesto conforme a la Fórmula (4)



(4)

en donde m, L, W, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba,
el cual luego se trata con un agente deshidratante tal como POCl₃, P₂O₅ o anhídrido tríflico, opcionalmente en la presencia de una base.

11. Un proceso para preparar un compuesto conforme a la Fórmula (I-a-1) o (I-a-2)



(I-a-1) o (I-a-2),


en donde Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, y

T es hidrógeno,

m es 1 o 2,

A es O para los compuestos de Fórmula (I-a-1) y A es NH para los compuestos de Fórmula (I-a-2),

en el cual un compuesto de Fórmula (1)




(1)

en donde Q, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba, y

U¹ es hidroxilo, halógeno o alcoxi C₁-C₆,

se hace reaccionar con un compuesto de Fórmula (19)



(19)


en donde m, L, R³, R⁴, R⁵ y R⁶ son tal como se definen más arriba, y

E¹ es hidroxilo o halógeno;

W es hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo, alilo o (4-metoxifenil)metil,


o una sal del mismo,

para dar lugar a un compuesto de Fórmula (21)



(21)

en donde m, E¹, L, Q, W, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba, el cual se trata con un agente deshidratante seguido de hidroxilamina o hidrazina para formar un compuesto de Fórmula (20)



(20)


en donde m, E¹, L, Q, W, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba, y

E² es hidroxilo o amino,

el cual luego se convierte en un compuesto de Fórmula (I-a-1) utilizando las condiciones de la reacción de Mitsunobu cuando E¹ y E² son ambos hidroxilo, o

el cual luego se convierte en un compuesto de Fórmula (I-a-1) o (I-a-2) en la presencia de una base cuando E¹ es halógeno y E² es hidroxilo o amino.

12. Un proceso para preparar un compuesto conforme a la Fórmula (I-a-1) o (I-a-2)




(I-a-1) o (I-a-2),

en donde Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, y

m es 1 o 2,

A es O para los compuestos conforme a la Fórmula (I-a-1) y A es NH para los compuestos conforme a la Fórmula (I-a-2),


en el cual un compuesto conforme a la Fórmula (5)




(5)

en donde Q, R⁷ y R⁸ son tal como se definen más arriba y


U^1 es hidroxilo, halógeno o alcoxi C_1-C_6 ,
X es halógeno, preferiblemente cloro,
se hace reaccionar con un compuesto de Fórmula (19)



en donde m, L, R^3 , R^4 , R^5 y R^6 son tal como se definen más arriba, y
 E^1 es hidroxilo o halógeno
W es hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo, alilo o (4-metoxifenil)metilo
o una sal del mismo,
para dar lugar a un compuesto de Fórmula (22)





en donde m, E^1 , L, W, X, R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 y R^8 son tal como se definen más arriba,
el cual se trata con un agente deshidratante seguido de hidroxilamina o hidrazina para formar
un compuesto de Fórmula (23)




en donde m, E^1 , L, W, X, R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 y R^8 son tal como se definen más arriba,
y

E^2 es hidroxilo o amino,
el cual se convierte en un compuesto de Fórmula (7) utilizando las condiciones de la
reacción de Mitsunobu cuando E^1 y E^2 son ambos hidroxilo, o
el cual se convierte en un compuesto de Fórmula (7) o (24) en la presencia de una
base cuando E^1 es halógeno y E^2 es hidroxilo o amino,




en donde m, E^1 , L, W, X, R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 y R^8 son tal como se definen más arriba,
el cual luego se hace reaccionar con un compuesto de Fórmula (8)



en donde Q es tal como se define más arriba,
en la presencia de una base y opcionalmente en la presencia de una sal o complejo de
cobre adecuado para dar lugar a un compuesto conforme a la Fórmula (I-a-1) o (I-a-2).


13. Un compuesto intermediario de Fórmula (3)



en donde

Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en la Reivindicación 1,
m es 1 o 2, y
W representa hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo, alilo o (4-metoxifenil)metilo.


14. Un compuesto intermediario de Fórmula (4)



en donde

Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en la Reivindicación 1,
m es 1 o 2, y
W representa hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo, alilo o (4-metoxifenil)metilo.


15. Un compuesto intermediario de Fórmula (7)



en donde

Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en la Reivindicación 1,
m es 1 o 2,
W representa hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo o (4-metoxifenil)metilo, y
X representa halógeno.


16. Un compuesto intermediario de Fórmula (20):



en donde

- Q, L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son tal como se definen en la Reivindicación 1,
m es 1 o 2,
E¹ representa hidroxilo o halógeno,
E² representa hidroxilo o amino, y
W representa hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo o (4-metoxifenil)metilo.

17. Un compuesto intermediario de Fórmula (23)



en donde

- L, R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷, R⁸ son tal como se definen en la Reivindicación 1,
m es 1 o 2,
X representa halógeno,
E¹ representa hidroxilo o halógeno,
E² representa hidroxilo o amino, y
W representa hidrógeno, *ter*-butoxicarbonilo, bencilo o (4-metoxifenil)metilo.

18. Una composición que comprende al menos un compuesto de Fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9 y al menos un auxiliar agrícolamente adecuado.
