


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de Fórmula (II):



en donde

R^1 , R^2 y R^3 son un átomo de cloro;

R^4 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ciclopropilo sustituido con C_2 - C_6 -alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R^5 es un átomo de hidrógeno; o

R^4 y R^5 forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo;

R^6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, C_1 - C_6 -alquilo, C_1 - C_6 -haloalquilo, C_1 - C_6 -cianoalquilo, C_2 - C_6 -alquenilo, C_2 - C_6 -alquinilo, C_3 - C_8 -cicloalquilo, arilo, aralquilo, $-C_1$ - C_6 -alquil-Si(C_1 - C_6 -alquil) $_3$ y $-C_1$ - C_6 -alquil- C_3 - C_8 -cicloalquilo;

R^7 es un átomo de hidrógeno o un C_1 - C_6 -alquilo.

2. El compuesto de Fórmula (II) de acuerdo con la Reivindicación 1 CARACTERIZADO PORQUE R^6 se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, C_1 - C_6 -alquilo, C_1 - C_6 -haloalquilo, C_1 - C_6 -cianoalquilo, C_2 - C_6 -alquenilo, C_2 - C_6 -alquinilo, ciclopropilo, fenilo, bencilo, $-C_1$ - C_6 -alquil-Si(C_1 - C_6 -alquil) $_3$ y $-C_1$ - C_6 -alquil-ciclopropilo.


3. El compuesto de Fórmula (II) de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2 CARACTERIZADO PORQUE R^7 es un átomo de hidrógeno o un metilo.

4. El compuesto de Fórmula (II) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes CARACTERIZADO PORQUE R^4 es un átomo de hidrógeno o isobutilo.

5. El compuesto de Fórmula (II) de acuerdo con la Reivindicación 1, 2 o 3 CARACTERIZADO PORQUE R^4 y R^5 forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo.

6. Una composición CARACTERIZADA PORQUE comprende un compuesto de Fórmula (II) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes y un vehículo o tensioactivo agrícolamente aceptable.

7. Un proceso para preparar un compuesto de Fórmula (II),



(II)

en donde

R¹, R² y R³ son un átomo de cloro;


R⁴ se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 2-metilpropilo, 1-metilpropilo, ciclopropilo, ciclopropilo sustituido con C₂-C₆-alquenilo, aralquilo y aralquilo sustituido con hidroxilo y R⁵ es un átomo de hidrógeno; o

R⁴ y R⁵ forman junto con el átomo de carbono al cual están unidos un ciclopropilo;

R⁶ se selecciona entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, C₁-C₆-alquilo, C₁-C₆-haloalquilo, C₁-C₆-cianoalquilo, C₂-C₆-alquenilo, C₂-C₆-alquinilo, C₃-C₈-cicloalquilo, arilo, aralquilo, -C₁-C₆-alquil-Si(C₁-C₆-alquil)₃ y -C₁-C₆-alquil- C₃-C₈-cicloalquilo;

R⁷ es un átomo de hidrógeno o un C₁-C₆-alquilo

en donde el proceso comprende el paso de hacer reaccionar un compuesto de Fórmula (XIV) o una sal del mismo con un compuesto de Fórmula (XV) o una sal del mismo:



en donde

R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶ y R⁷ son como se definen para la Fórmula (II); y

U¹ es un átomo de halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo C₁-C₆-alcoxi.
