

Anexo Adjunto

Los rangos deseados por el solicitante para la relación de mezcla del primer componente y el segundo componente corresponden a los siguientes:

Compuesto 1-7 : fluxapiraxad	= 100 : 0.3~1.0
Compuesto 1-7 : tebuconazol	= 100 : 0.3~1.0
Compuesto 1-7 : epoxiconazol	= 100 : 0.5~67
Compuesto 1-7 : diflumetorim	= 100 : 10
Compuesto 1-7 : fludioxonil	= 100 : 3.0~200
Compuesto 1-7 : azoxystrobina	= 100 : 0.3~500
Compuesto 1-7 : protioconazol	= 100 : 6.25~25.0
Compuesto 1-7 : piraclostrobina	= 100 : 1.0~10.0
Compuesto 1-7 : fluopiram	= 100 : 3~10
Compuesto 1-7 : piraziflumid	= 100 : 0.5~2.0
Compuesto 1-7 : boscalida	= 100 : 2~22.0
Compuesto 1-7 : fenhexamid	= 100 : 7~200

Compuesto 1-5 : epoxiconazol	= 100 : 0.4~3.3
Compuesto 1-5 : piraziflumid	= 100 : 0.2~6.7
Compuesto 1-5 : fluxapiraxad	= 100 : 0.07~6.0

Lo anterior se basa en una combinación de los siguientes ejemplos con efectos sinérgicos:

Las siguientes combinaciones del Compuesto 1-5 o del Compuesto 1-7 y lo siguiente:

azoxistrobina, epoxiconazol, diflumetorim, tebuconazol, piraclostrobina, piraziflumid, fluopiram, fluxapiraxad, fludioxonil, protioconazol, fenhexamid, boscalida, azoxistrobina o piraclostrobina.

En la prueba de eficacia contra el añublo del arroz en aplicación foliar (Ejemplo de Prueba 1, párr. 0226-0233)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes (los números después de los compuestos siguientes son ppm):

fluxapiraxad	100+ 1、0.3
tebuconazol	100+ 1、0.3
epoxiconazol	100+ 2、0.5
diflumetorim	100+ 10
fludioxonil	100+ 10、3
azoxystrobina	100+ 0.3 o
protioconazol	100+ 25、6.25

En la prueba de eficacia contra la mancha foliar moteada del trigo (*Septoria tritici*) (Ejemplo de Prueba 2, párr. 0234-0239)

Combinaciones del Compuesto 1-5 y los siguientes:

Epoxiconazol	100+ 10、3.3、1.1、0.4
piraziflumid	100+ 20、6.7、2.2、0.7、0.2 o

fluxapirroxad 100+ 6.0、 2.0、 0.67、 0.22、 0.07

En la prueba de eficacia contra la mancha foliar moteada del trigo (*Septoria tritici*) (Ejemplo de Prueba 2, párr. 0234-0239)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

fluxapirroxad 100+ 1
tebuconazol 100+ 1
epoxiconazol 100+ 8、 2
fluopiram 100+ 10 o
piraziflumid 100+ 2

En la prueba del efecto de prevención de aspersión contra la antracnosis del pepino (Ejemplo de Prueba 3, párr. 0240-0243)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

fluxapirroxad 100+ 1
tebuconazol 100+ 0.3
epoxiconazol 100+ 2、 0.5
fludioxonil 100+ 10、 3
piraclostrobina 100+ 3
diflumentorim 100+ 10
fluopiram 100+ 10、 3
piraziflumid 100+ 2、 0.5
azoxystrobina 100+ 3、 0.3 o
protioconazol 100+ 6.25

En una prueba del efecto de prevención de la aspersión contra la roya de la hoja del trigo (Ejemplo de Prueba 4, párr. 0244-0247)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

epoxiconazol 100+ 2、 0.5
fludioxonil 100+ 200、 10、 3
piraclostrobina 100+ 3、 1
diflumentorim 100+ 10
piraziflumid 100+ 2
azoxystrobina 100+ 3、 0.3 o
protioconazol 100+ 25、 6.25

En la prueba del efecto de prevención de aspersión contra el moho gris del pepino (Ejemplo de Prueba 5, párr. 0248-0251)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

epoxiconazol 100+ 67
fludioxonil 100+ 22、 7
boscalida 100+ 22、 7、 2 o
fenhexamid 100+ 200、 22、 7

En la prueba del efecto de prevención de aspersión contra el tizón tardío del tomate (Ejemplo de Prueba 7, párr. 0254-0257)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

fluxapiroxad	100+	1
tebuconazol	100+	1
piraclostrobina	100+	3
piraziflumid	100+	2
azoxystrobina	100+	3, 0.3 o
protioconazol	100+	25

En la prueba del efecto de control contra la polilla del lomo de diamante (Ejemplo de Prueba 8, párr. 0258-0261)

Combinación del Compuesto 1-7 y el siguiente:

piraclostrobina	100+	10
-----------------	------	----

En la prueba del efecto de control contra el saltamontes marrón (Ejemplo de Prueba 9, párr. 0262-0266)

Combinaciones del Compuesto 1-7 y los siguientes:

azoxistrobina	100+	500, 100
piraclostrobina	100+	10