


REIVINDICACIONES

Se reivindica lo siguiente:

1. Un método para tratar la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) en un paciente que lo necesita, que comprende administrar por vía oral al paciente un compuesto de fórmula:



5

o una sal farmacéuticamente aceptable de este una vez al día en una dosis de alrededor de 0,5 mg a alrededor de 25 mg.

2. El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 1 mg a alrededor de 15 mg.

3 El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 2 mg a alrededor de 10 mg.


4 El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 1 mg.

5 El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 3 mg.

6 El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 6 mg.


7 El método de la reivindicación 1, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra una vez al día en una dosis de alrededor de 10 mg.

8. Un método para tratar la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) en un paciente que lo necesita, que comprende administrar por vía oral al paciente un compuesto de fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este para obtener un área bajo la curva en estado estacionario de cero a infinito ($AUC_{0-\infty}$) de alrededor de 2500 ng*h/mL a alrededor de 50 000 ng*h/mL.

- 5 9. El método de la reivindicación 8, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra en una dosis para obtener un $AUC_{0-\infty}$ en estado estacionario de alrededor de 5000 ng*h/mL a alrededor de 50 000 ng*h/mL.
- 10 10. El método de la reivindicación 8, en donde el compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, se administra en una dosis para obtener un $AUC_{0-\infty}$ de estado estacionario de alrededor de 5000 ng*h/mL a alrededor de 25 000 ng*h/mL.
11. El método de cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, en donde el compuesto se administra oralmente una vez al día.
12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde el compuesto se administra como una sal de potasio.
- 15 13. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde el compuesto se administra como una sal de sodio.
14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en donde el compuesto se administra en una composición farmacéutica que comprende un tensioactivo iónico.
15. El método de la reivindicación 14, en donde el tensioactivo iónico es laurilsulfato de sodio.
- 20 16. El método de la reivindicación 15, en donde el laurilsulfato de sodio está presente en la composición en de alrededor del 1 % a alrededor del 8 % en peso.
17. El método de la reivindicación 15, en donde el laurilsulfato sódico se encuentra presente en la composición de alrededor del 1 % a alrededor del 5 % en peso.
18. El método de la reivindicación 15, en donde el laurilsulfato sódico se encuentra presente
- 25 en la composición de alrededor del 5 % en peso.
19. Una sal de potasio cristalina de un compuesto de fórmula:




20. La sal de potasio cristalina de la reivindicación 19 producida mediante el método del ejemplo 8.
21. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la reivindicación 19 o la
5 reivindicación 20.
22. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto en la composición farmacéutica es de alrededor de 1 mg a alrededor de 15 mg.
23. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto en la composición farmacéutica es de alrededor de 2 mg a alrededor de 10 mg.
- 10 24. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto en la composición farmacéutica es alrededor de 1 mg.
25. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto en la composición farmacéutica es de alrededor de 3 mg.
26. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto
15 en la composición farmacéutica es alrededor de 6 mg.
27. La composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde la cantidad del compuesto en la composición farmacéutica es alrededor de 10 mg.
28. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 21 a 27, que comprende además un tensioactivo iónico.
- 20 29. La composición farmacéutica de la reivindicación 28, en donde el tensioactivo iónico es laurilsulfato de sodio.
30. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este y laurilsulfato de sodio.

31. Una sal de potasio cristalina de un compuesto de fórmula:




5 que tiene un espectro de XRPD sustancialmente como se muestra en la FIG. 16.

32. Una sal de potasio cristalina de un compuesto de fórmula:




que tiene un espectro de XRPD que comprende picos en ángulos 2-teta de $6,78 \pm 0,20$, $11,35 \pm 0,20$ y $20,51 \pm 0,20$ grados.

10 33. Una sal de sodio cristalina de un compuesto de fórmula:



que tiene un espectro XRPD sustancialmente tal como se muestra en la FIG. 18.

34. Una sal de sodio cristalina de un compuesto de fórmula:



que tiene un espectro de XRPD que comprende picos en ángulos 2-teta de $5,51 \pm 0,20$, $8,47 \pm$

5 $0,20$ y $16,57 \pm 0,20$ grados.