



REIVINDICACIONES

1. Un método para preparar un compuesto de fórmula:




, que comprende poner en contacto un




compuesto de fórmula:

con un compuesto de fórmula:




, en presencia de una Base de Hünig, para obtener un compuesto de



fórmula:


, al cual se añade primero anhídrido

trifluoroacético y piridina, y luego metanol e hidróxido de litio para obtener un



compuesto de fórmula:

, el cual se pone en contacto con un




compuesto de fórmula:


en 1,2-Dimetoxietano, y (2-

diciclohexilfosfino-2', 4', 6'-triisopropil-1,1'-bifenil) [2- (2'-amino-1,1'-bifenil)] paladio


(II) metanosulfonato, para obtener un compuesto de fórmula:



2. Un método para preparar un compuesto de fórmula:




, que comprende poner en contacto un




compuesto de fórmula:

con hidróxido de litio y metanol en agua, para




obtener

, el cual se pone en contacto con un compuesto de fórmula:




, en hexafluorofosfato de 3-óxido de 1-[Bis(dimetiloamino)metileno]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridinio y una Base de Hünig para obtener un compuesto de



fórmula:


, el cual se pone en contacto con un compuesto de




fórmula:

en (2-diciclohexilfosfino-2', 4', 6'-triisopropil-1,1'-bifenil) [2- (2'-amino-1,1'-bifenil)] paladio (II) metanosulfonato, 1,2-Dimetoxietano y



fosfato de tripotasio para obtener un compuesto de fórmula:





3. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, donde compuesto de fórmula:




, se prepara con un método que comprende poner en contacto un

compuesto de fórmula:  con un compuesto de fórmula:  en tetrahidrofurano y tert-butoxido de potasio para obtener un compuesto de fórmula:



ácido clorhídrico y metanol para obtener  , el cual se pone en contacto con N-bromosuccinimida y diclorometano para obtener un compuesto de fórmula:



, el cual se pone en contacto con bis(pinacolato)diboro, dicloruro de bis(trifenilfosfina)paladio(II), dioxano y dimetilformamida a 120°C para obtener un

