

Figura 9

Tratamientos de temperatura ^a	Parámetros de bombardeo	n.º embriones bombardeados	n.º eventos transgénicos	Frecuencia de transformación en nivel de planta T0 (%) ^b	n.º eventos de mutación	Eficiencia de mutación en nivel de evento transgénico (%) ^c	Eficiencia de mutación en nivel de embrión donante (%) ^d
26°C	0,6 um 650 psi	219	33	15,1%	3	9,1%	1,4%
	0,6 um 1100 psi	130	20	15,4%	3	15,0%	2,3%
	Subtotal	349	53	15,2%	6	11,3%	1,7%
30°C	0,6 um 650 psi	220	25	11,4%	2	8,0%	0,9%
	0,6 um 1100 psi	131	11	8,4%	2	18,2%	1,5%
	Subtotal	351	36	10,3%	4	11,1%	1,1%
34°C	0,6 um 650 psi	221	29	13,1%	5	17,2%	2,3%
	0,6 um 1100 psi	131	19	14,5%	8	42,1%	6,1%
	Subtotal	352	48	13,6%	13	27,1%	3,7%
37°C	0,6 um 650 psi	223	17	7,6%	2	11,8%	0,9%
	0,6 um 1100 psi	131	8	6,1%	1	12,5%	0,8%
	Subtotal	354	25	7,1%	3	12,0%	0,8%

^a Tratamiento de temperatura de 1 día a la temperatura indicada, 4 días después del bombardeo

^b Calculado como la cantidad de eventos transgénicos producidos dividido la cantidad total de embriones bombardeados

^c Calculado como la cantidad total de eventos de mutación dividido la cantidad total de eventos transgénicos

^d Calculado como la cantidad total de eventos de mutación dividido la cantidad total de embriones bombardeados.