

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica mucoadhesiva de corticoesteroide que comprende:

(a) budesonida en una cantidad del 0.02 al 0.06 % en p/p de la composición,

(b) glicerina en una cantidad del 40 al 70 % en p/p de la composición,

(c) goma xantana en una cantidad del 0.25 al 1.5 % en p/p de la composición, y

(d) un tampón de ácido cítrico,

En donde la composición tiene un pH del 4.8 a 5.8.

2. La composición de la reivindicación 1, que además comprende sucralosa en una cantidad del 0.05 al 0.5 % en p/p de la composición.

3. La composición de la reivindicación 1 o 2, que además comprende propilenglicol en una cantidad de hasta el 20 % en p/p de la composición.

4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que comprende:

(a) budesonida en una cantidad de 0.05 % en p/p de la composición,

(b) glicerina en una cantidad de 50 % en p/p de la composición, y

(c) goma xantana en una cantidad de 1 % en p/p de la composición.

5. La composición de la reivindicación 4, que además comprende

sucralosa en una cantidad de 0.05 % en p/p de la composición.

6. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, que además comprende un agente aromatizante.

7. La composición de la reivindicación 6, en donde el agente aromatizante es seleccionado de entre sabor a frutos rojos, sabor a multifruta, sabor a caramelo, sabor a cerveza de raíz, sabor a nata, sabor a chocolate, sabor a hierbabuena, sabor a menta, sabor a dulce de mantequilla, sabor a gaulteria y cualquier combinación de los mismos.

8. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde la composición es una suspensión.

9. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde la composición es una solución.

10. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, que además comprende un conservante.

11. La composición de la reivindicación 10, en donde el conservante está presente en una cantidad de 0.01 % a 1.0 % en p/p de la composición.

12. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, que además comprende un antioxidante.

13. La composición de la reivindicación 12, en donde el antioxidante está presente en una cantidad de 0.01 % a 1.0 % en p/p de la composición.

14. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 10-13, en donde el conservante o el antioxidante es o comprende ácido ascórbico, EDTA, edetato de sodio, un sulfito o cualquier combinación de los mismos.

15. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde la composición carece de conservantes.

16. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición presenta un trabajo de adhesión de 150 a 350 g/s.

17. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, formulada para administración oral.

18. La composición de la reivindicación 17, proporcionada en un envase unidosis que contiene de 1 a 10 ml de la composición.

19. La composición de la reivindicación 17, proporcionada en un envase unidosis que contiene de 2 a 5 ml de la composición.

20. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-16, formulada para administración rectal.

21. Un método de preparación de una composición farmacéutica mucoadhesiva de corticoesteroide de la reivindicación 1, que comprende preparar una solución o suspensión que comprende budesónida, glicerina, goma xantana y un tampón de ácido cítrico.