



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula I,





I

- 5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde
- R¹** es un anillo heterociclilo aromático de 5 miembros que comprende:
- (1) dos átomos de carbono y (ii) dos de N y uno de NH o (i) tres de N,
 - (2) tres átomos de carbono y (i) dos de N, (ii) N y NH, o (iii) N y uno de S u O, o
 - (3) cuatro átomos de carbono y uno de S u O,
- 10 en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1 o 4 sustituyentes, según lo permita la valencia, seleccionados independientemente en cada caso entre halo y alquilo C₁₋₆;
- R²** es un anillo heterociclilo aromático de 5 miembros que comprende:
- (1) tres átomos de carbono y (i) dos de N, (ii) N y NH, o (iii) N y uno de S u O, o
 - 15 (2) dos átomos de carbono y (i) tres de N, (ii) dos de N y uno de NH o (iii) dos de N y uno de S u O,
- en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes, según lo permita la valencia, seleccionados independientemente en cada caso entre:
- (a) halo, (b) -NH₂, (c) -cicloalquilo C₃₋₆,
 - 20 (d) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH y -NH₂, y
 - (e) -Oalquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH y -NH₂;



representa un
anillo bicíclico
que es:



R³ es -H, halo o -alquilo C₁₋₆;



R⁴ es -O- o -NH-;

Uno de **X¹**, **X²** y **X³** es N y cada uno de los otros es CH;

R⁵ se selecciona entre:

- 5 (1) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH, -NR^xR^y y -C(O)NR^xR^y,

(2) -C(O)NR^xR^y,



en donde R^x y R^y se seleccionan independientemente entre -H, -alquilo C₁₋₆ y R^z es -alquilo C₁₋₆; y

- 10 **R⁶** se selecciona entre:

(1) fenilo, sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre:

(a) halo, (b) -CN,

(c) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados

- 15 independientemente en cada caso entre halo y -OH;

(d) -Oalquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados


independientemente en cada caso entre halo y -OH, y

(e) -cicloalquilo C₃₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados

independientemente en cada caso entre halo, -OH, -alquilo C₁₋₆ y -Oalquilo C₁₋₆;


- 20 (2) piridinilo, sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados

independientemente en cada caso entre (i) halo, (ii) CN y (iii) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;




en donde cada uno de R^{7a} y R^{7b} se selecciona entre -H, -alquilo C₁₋₆ sin

sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;



en donde cada uno de R^{8a} y R^{8b} se selecciona entre -H, -alquilo C₁₋₃ y -CF₃;

(5) Un sistema de anillo bicíclico seleccionado entre:



en donde R⁹, R¹⁰ y R¹¹ se seleccionan independientemente en cada caso entre -H, -alquilo C₁₋₆, -CF₃ y 1, 2 o 3 de halo;

(6) -cicloalquilo C₃₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados

10 independientemente en cada caso entre halo, -OH, -alquilo C₁₋₆ y -Oalquilo C₁₋₆; y

(7) pirazolilo, sin sustituir o sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados

independientemente en cada caso entre:

(a) 1 a 3 de halo, (b) CN,

(c) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados


15 independientemente en cada caso entre halo, -OH y -Oalquilo C₁₋₆;

(d) -Oalquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados

independientemente en cada caso entre halo, -OH y Oalquilo C₁₋₆, y

(e) -cicloalquilo C₃₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados

independientemente en cada caso entre halo, -OH y -Oalquilo C₁₋₆; y




2. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal del farmacéuticamente

aceptable del mismo, en donde **R¹** es un anillo heterociclilo aromático de 5 miembros seleccionado entre tiazolilo, imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, triazolilo, tiofenilo y furanilo, en donde cada anillo está sin sustituir o sustituido con 1 a 4 sustituyentes, según lo permita la valencia, seleccionados independientemente en cada caso entre halo y alquilo C₁₋₆.

5

3. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R¹** se selecciona entre:



10 en donde el anillo heterociclilo está sin sustituir o sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes, según lo permita la valencia, seleccionados independientemente en cada caso entre halo y alquilo C₁₋₆.


4. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R¹** está sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados en cada caso entre F, Cl y alquilo C₁₋₃.


15

5. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R²** se selecciona entre tiadiazolilo, triazolilo, pirazolilo, tiazolilo e isotiazolilo, en donde cada uno está sin sustituir o sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados entre (i) halo, (ii) -NH₂, (iii) alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados entre halo, -OH y cicloalquilo C₃₋₆.

20

6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R²** se selecciona entre:






en donde * es el punto de unión a R¹,


y cada uno de R^a, R^b, R^{b1}, R^c, R^d, R^e, R^{e1}, R^f, R^{f1} y R^g se selecciona independientemente entre:

- 5 (a) -H, (b) halo, (c) -NH₂, (d) -cicloalquilo C₃₋₆, (e) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH y -NH₂, y (f) -Oalquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH y -NH₂.

- 10 7. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



- 15 8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:



- 20 9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R³** se selecciona entre -H, halo o -alquilo C₁₋₃.

10. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R⁴** es -O-.



11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R⁴** es -NH-.

5 12. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde X¹ es N y cada uno de X² y X³ es CH; X² es N y cada uno de X¹ y X³ es CH; o X³ es N y cada uno de X¹ y X² es CH.

10 13. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R⁵** se selecciona entre:

(a) -alquilo C₁₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH, -NH₂ y -C(O)NH₂,

(b) -C(O)NH₂,



15 14. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde **R⁶** es

(1) fenilo, sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre:

(a) F y Cl, (b) -CN,


20 (c) -alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre -F, -Cl y -OH,

(d) -Oalquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre -F, -Cl y -OH, y


(e) -cicloalquilo C₃₋₆, sin sustituir o sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre -F, -Cl, -OH y

25 -alquilo C₁₋₃ y -Oalquilo C₁₋₃;

(2) piridinilo, sin sustituir o sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre (i) F y Cl, (ii) CN y (iii) alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;




en donde cada uno de R^{7a} y R^{7b} se selecciona entre -H y -alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;




en donde cada uno de R^{8a} y R^{8b} se selecciona entre -H, -alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;

(5) Un sistema de anillo bicíclico seleccionado entre:




en donde R⁹, R¹⁰ y R¹¹ se seleccionan independientemente en cada caso entre -H, 1, 2 o 3 de halo y -alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl;

(6) -cicloalquilo C₃₋₆ sin sustituir o sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independientemente en cada caso entre halo, -OH, -alquilo C₁₋₆ y -Oalquilo C₁₋₆;



, en donde R¹² se selecciona entre (a) -H, (b) halo, (c) CN, (d) -alquilo C₁₋₃ sin sustituir o sustituido con 1 a 6 de F y/o Cl y (e) -cicloalquilo C₃₋₆; y



15. El compuesto de la reivindicación 1 que es:

<i>rel</i> -((1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-2-azabicyclo[2.2.0]hexan-2-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>rel</i> -((1 <i>R</i> ,4 <i>R</i> ,5 <i>R</i>)-5-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-2-azabicyclo[2.2.0]hexan-2-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(oxazol-2-il)tiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(5-metiloxazol-2-il)tiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(2-(isoxazol-3-il)-4-metiltiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-[2,2'-bitiazol]-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-ciclopropil-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona
(2-(1 <i>H</i> -imidazol-2-il)-4-metiltiazol-5-il)((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-il)tiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-etil-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-3-il)tiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(tiofen-2-il)tiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(2-(furan-2-il)-4-metiltiazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-(difluorometil)-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-(difluorometil)-2-(oxazol-2-il)tiazol-5-il)metanona
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-(1-hidroxietil)-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-(1-hidroxietil)-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona (enantiómero 2)
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>S</i>)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona

((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-etil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(5-fluorotiazol-4-il)-1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(5-metiloxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(2-metiltiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-fluoro-1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-fluoro-1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(tiazol-4-il)-1,2,4-tiadiazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-metil-1-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-4-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(tiazol-4-il)isotiazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2,4-difluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(oxazol-2-il)tiazol-5-il)
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2,4-difluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(2-(isoxazol-3-il)-4-metiltiazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2,4-difluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2,4-difluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-ciclopropil-[2,4'-bitiazol]-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(7,7-difluorobicciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-3-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(7,7-difluorobicciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-3-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona

((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(4-metil-2-(oxazol-2-il)tiazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-ciclopropil-1H-pirazol-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(bicciclo[1.1.1]pentan-1-ilmetoxi)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>rel</i> -((1R,5S,6S)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-1-metil-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
2-(4-fluorofenil)-6-(((1R,5S,6s)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)isonicotinamida
2-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1R,5S,6s)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)-2-metilpropanamida
<i>ent</i> -2-amino-2-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1R,5S,6s)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)propanamida (enantiómero 1)

<i>ent</i> -2-amino-2-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)propanamida (enantiómero 2)
<i>ent</i> -3-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)-3-metilazetidín-2-ona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -3-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)-3-metilazetidín-2-ona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -3-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)-3-metilpirrolidín-2-ona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -3-(2-(4-fluorofenil)-6-(((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-3-(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-carbonil)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-6-il)oxi)piridin-4-il)-3-metilpirrolidín-2-ona (enantiómero 2)
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(1-aminociclobutil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(1-aminociclopentil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(1-amino-2-metilpropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((6-(4-fluorofenil)-4-(2-metilazetidín-2-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((6-(4-fluorofenil)-4-(2-metilazetidín-2-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((6-(4-fluorofenil)-4-(2-metilpirrolidín-2-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((6-(4-fluorofenil)-4-(2-metilpirrolidín-2-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(2-amino-1-hidroxipropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(2-amino-1-hidroxipropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(2-amino-1-hidroxipropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((4-(2-amino-1-hidroxipropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
((1 <i>R</i> ,5 <i>S</i> ,6 <i>s</i>)-6-((6-(2-aminopropan-2-il)-4-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicciclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1 <i>H</i> -pirazol-5-il)metanona

((1R,5S,6s)-6-((6-(2-aminopropan-2-il)-4-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(1-aminoetil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(1-aminoetil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(1-aminoetil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(1-aminoetil)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1'-metil-1'H-[1,3'-bipirazol]-5'-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-fluorofenil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2-hidroxi-4,4-dimetilciclohexil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 1)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2-hidroxi-4,4-dimetilciclohexil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 2)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2-hidroxi-4,4-dimetilciclohexil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 3)
<i>ent</i> -((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(2-hidroxi-4,4-dimetilciclohexil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona (enantiómero 4)
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(oxazol-2-il)-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(4-(trifluorometil)piperidin-1-il)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(3-(isoxazol-3-il)-1-metil-1H-pirazol-5-il)metanona
((1R,5S,6s)-6-((4-(2-aminopropan-2-il)-6-(1-metilciclopentil)piridin-2-il)oxi)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il)(1-metil-3-(tiazol-4-il)-1H-pirazol-5-il)metanona

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

16. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un transportador farmacéuticamente aceptable.

17. Un método para la inhibición de la replicación del hRSV en un sujeto

humano que lo necesita que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

- 5 18. Un método para el tratamiento de una infección por hRSV en un sujeto humano que lo necesita que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 10 19. Un método para la profilaxis de una infección por hRSV en un sujeto humano que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 15 20. Un método para la inhibición de la replicación del hMPV en un sujeto humano que lo necesita que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 20 21. Un método para el tratamiento de una infección por hMPV en un sujeto humano que lo necesita que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 25 22. Un método para la profilaxis de una infección por hMPV en un sujeto humano que comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz del compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 30 23. Un compuesto de la reivindicación 1 para su uso en terapia.

