


Gráfico de líneas para la media (EE) de MC del cambio con respecto al valor basal en la puntuación total de GSGC a lo largo del tiempo (Población de ITT-LOCF) – Población sin tratamiento previo con ERT que excluye al sujeto 4005-2511 – Estudio ATB200-03



Abreviaturas: ANCOVA = análisis de covarianza; AT2221 = miglustat; ATB200 = cipaglucosidasa alfa; ERT = terapia de reemplazo enzimático; GSGC = Marcha, Escaleras, Maniobra de Gowers y Ensayo de la silla; ITT = intención de tratar; LOCF = última observación trasladada; MC = mínimos cuadrados; EE= error estándar

Nota: La puntuación de marcha se basó en el ensayo de caminata de 10 m; la puntuación de las escaleras se basó en que el sujeto subiera escaleras; la puntuación de la maniobra de Gowers se basó en que el sujeto se tumbara en el suelo y después se levantara del suelo para ponerse de pie; la puntuación de la silla se basó en que el sujeto se levantara de una posición sentada en una silla para ponerse de pie. La puntuación total de GSGC fue la suma de 4 ensayos y varía de un mínimo de 4 puntos (rendimiento normal) a un máximo de 27 puntos (puntuación peor).

Nota: La media de MC y el EE se obtuvieron a partir del modelo ANCOVA.

FIG. 84