



en donde el heterociclo y el heteroarilo incluyen cada uno uno o más de un heteroátomo seleccionado entre N, O, P y S.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el compuesto tiene una Fórmula



3. El compuesto de la Reivindicación 1 o la Reivindicación 2, en donde el compuesto tiene una estructura que cumple una Fórmula



en donde L es oxígeno o CH₂.




4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-3, en donde el anillo B tiene



una estructura que cumple una Fórmula en donde al menos un W es nitrógeno y cada W restante se selecciona independientemente de carbono, CH, oxígeno, azufre, nitrógeno o NH.

5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, en donde el anillo B es un diazol, un triazol, un oxadiazol, un oxazol o un piridinilo.

6. El compuesto de la Reivindicación 5, en donde



7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-6, en donde R⁵ es Rᵉ, en donde Rᵉ es halógeno o metilo.


8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, en donde el conector del grupo enlazador- R^6 es R^a , en donde R^a es un grupo alifático C_1 , C_2 , C_3 o C_4 que comprende un grupo alquilo, alquenilo o alquinilo.

9. El compuesto de la Reivindicación 8, en donde, el grupo C_2 comprende un alquino y en donde R^6 es R^b , en donde R^b es $-C(R^f)_3$, en donde un R^f es R^e y cada otro R^f , independientemente para cada aparición, es R^a , en donde R^a es alquilo C_{1-4} .


10. El compuesto de la Reivindicación 9, en donde R^e es $-OR^a$, en donde R^a es H.


11. El compuesto de la Reivindicación 9 o la Reivindicación 10, en donde R^a es metilo.

12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 9-11, en donde el anillo B es







































13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-12, en donde R^1 es






14. El compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1-13, en donde el compuesto es

 I-5;	 I-6;
 I-7;	 I-8;
 I-18;	 I-19;
 I-21;	 I-25;
 I-26;	 I-29;
 I-32;	 I-33;
 I-37;	 I-39;
 I-42;	 I-44;
 I-46;	 I-48;

 I-50;	 I-52;
 I-54;	 I-56;
 I-58;	 I-62;
 I-64;	 I-67;
 I-68;	 I-71;
 I-72;	 I-77;
 I-82;	 I-83;
 I-84;	 I-85;
 I-87;	 I-90.

15. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-14, en donde el compuesto es



16. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, un excipiente, un agente terapéutico o combinaciones de los mismos.

17. Un método que comprende poner en contacto *ex vivo* o *in vivo* una proteína quinasa 1 que interactúa con el receptor (RIP1) con un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, o una composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 16.


18. Un método para preparar el compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, que comprende:

acoplar un material de partida que tiene una Fórmula A con un reactivo que contiene R¹, combinando el material de partida y el reactivo que contiene R¹, en donde R¹ comprende un grupo enlazador-R⁶, con un catalizador de metal de transición, una base y un disolvente para formar un producto funcionalizado;

desproteger un grupo amina del producto funcionalizado para proporcionar un compuesto de amina; y


formar un enlace amida entre el compuesto de amina y una pareja de acoplamiento que contiene ácido para proporcionar un compuesto que contiene amida;

en donde la Fórmula A es




Formula A;

el producto funcionalizado tiene una estructura que cumple la Fórmula B



Formula B;

y la pareja de acoplamiento que contiene ácido tiene una estructura que cumple la Fórmula C



Formula C;

en donde

X es un halógeno o un triflato;

GP es un grupo protector amina;

y cada uno del anillo B, L, R¹, R², R⁴, R⁵, m, n y p son como se reclaman en cualquiera de las Reivindicaciones 1-15.
