


**REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A OFICIO No.
16864**

1. Un compuesto de fórmula (II)



(II), donde;

R^{B1} es metilo;


X es O o S ;

Q^1 es un pirazol di-sustituido, sustituido en un nitrógeno del anillo por R^{B2} y sustituido en uno o más átomos de carbono del anillo por R^{B3} , donde

R^{B2} es alquilo C_1-C_3 ;

y cada R^{B3} es independientemente cloro, fluoro, bromo, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, haloalcoxy C_1-C_3 o alcoxy C_1-C_3 ,

en donde Q^1 se selecciona del grupo que consiste en Q^1 -2a, Q^1 -2b, Q^1 -2c, Q^1 -2d, y Q^1 -2e,



donde R^{B3SN} es un sustituyente R^{B3} soportado en un átomo de carbono del anillo que es adyacente a un átomo de nitrógeno

del anillo que está sustituido con R^{B2} ; y la línea irregular indica el punto de unión al resto de la molécula;

Q^2 es un sistema de anillo de fenilo o piridinilo, opcionalmente sustituido por 1, 2, o 3 sustituyentes R^{B5} ; y


cada R^{B5} es independientemente fluoro, etilo, trifluorometilo, difluoroetilo, metoxi, difluorometoxi o trifluorometoxi, o una forma salina de los mismos.

10

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 donde X es O.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde Q^2 se selecciona del grupo que consiste en Q^2 -1, Q^2 -2 y Q^2 -3,

20



25

donde n es un número entero de 0, 1, 2, o 3, R^{B5} es tal como se define en la reivindicación 1, y la línea irregular representa el punto de unión al resto de la molécula.

30

4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde R^{B2} se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, y n-propilo.