


NOVEDAD DE LA INVENCIONREIVINDICACIONES


- 5 1. Un método para tratar una infección de virus del Dengue en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 1,000 mg del Compuesto 1,



Compuesto 1

- 10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, dos, tres veces o cuatro veces al día.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque el compuesto es



Compuesto 2

- 15 3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque se proporciona una sal farmacéuticamente aceptable del Compuesto 1.
4. El método de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado además porque se administra desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 850 mg del Compuesto.
- 20 5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además porque se administra desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 800 mg del Compuesto.
6. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque se administra desde aproximadamente 700 a 900 mg del Compuesto 2.
7. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque se
- 25 administra desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 900 mg de sal farmacéuticamente

aceptable del mismo.

8. El método de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado además porque se administra desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 800 mg de sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5 9. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque se administra desde aproximadamente 800 mg a aproximadamente 1000 mg de sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque el compuesto se administra dos veces al día.

10 11. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque el compuesto se administra tres veces al día.

12. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado además porque el compuesto se administra cuatro veces al día.

15 13. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante tres días consecutivos.

14. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante cuatro días consecutivos.

15. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante cinco días consecutivos.

20 16. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante seis días consecutivos.

17. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante siete días consecutivos.

25 18. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante ocho días consecutivos.

19. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante nueve días consecutivos.

20. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado además porque el compuesto se administra durante diez días consecutivos.

30 21. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado además porque el humano tiene el serotipo 1 del virus del Dengue.

22. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado además porque el humano tiene el serotipo 2 del virus del Dengue.

35 23. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado además porque el humano tiene el serotipo 3 del virus del Dengue.

24. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, caracterizado además porque el humano tiene el serotipo 4 del virus del Dengue.

25. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 24, caracterizado además porque el compuesto se administra en combinación con un compuesto antiviral adicional.

26. El método de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de proteasa NS2B-NS3.

27. El método de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de NS3.

28. El método de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de interacción de NS3-NS4B.

29. El método de conformidad con la reivindicación 28, caracterizado además porque el inhibidor de interacción NS3B-NS4B es JNJ-1802 o JNJ-A07.

30. El método de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es otro inhibidor de NS5.

31. El compuesto de conformidad cualquiera de las reivindicaciones 1 a 30, caracterizado además porque el portador farmacéuticamente aceptable comprende celulosa microcristalina silicificada.


32. El compuesto de conformidad cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31, caracterizado además porque el portador farmacéuticamente aceptable comprende además croscarmelosa sódica.

33. El compuesto de conformidad cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32, caracterizado además porque el portador farmacéuticamente aceptable comprende además estearato de magnesio.

34. El compuesto de conformidad cualquiera de las reivindicaciones 1 a 32, caracterizado además porque el portador farmacéuticamente aceptable comprende además dióxido de silicio coloidal.


35. El compuesto de conformidad cualquiera de las reivindicaciones 1 a 34, caracterizado además porque el portador farmacéuticamente aceptable comprende fumarato de estearil de sodio.

36. Un método para tratar una infección de virus del Dengue en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar desde aproximadamente 700 a aproximadamente 1000 mg de un compuesto de la Fórmula I:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; en donde: R^2 es alquilo de 1 a 6 átomos de carbono (incluyendo metilo, etilo, propilo e isopropilo), cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, arilo, arilo(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-, heteroarilo, heteroarilo(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)- o heteroalquilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R^{22} ; R^3 es hidrógeno o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R^{33} ; R^{4a} y R^{4b} se seleccionan independientemente entre hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, arilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, heteroarilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)- y arilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R^{44} ; R^5 es hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono (incluyendo metilo, etilo, propilo e isopropilo), haloalquilo de 1 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono y, en una modalidad alternativa, R^5 es arilo(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-, arilo, heteroarilo o heteroalquilo, opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R^{55} . R^{22} , R^{33} , R^{44} y R^{55} se seleccionan independientemente en cada aparición de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, alqueno, alquino, F, Cl, Br, I, heterociclo, heterocicloalquilo, haloalcoxi, haloalquilo, $C(O)R^{66}$, $C(O)OR^{66}$, $C(O)N(R^{66})_2$ y ciano; R^{66} se selecciona independientemente en cada aparición de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, arilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, heteroarilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)- y arilo.

37. El compuesto de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado además porque el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


38. El compuesto de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado además porque el compuesto es



5


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

39. El compuesto de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado además porque el compuesto es




10 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

40. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado además porque el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


41. El compuesto de conformidad con la reivindicación 37, caracterizado además porque el compuesto es



5

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


42. El compuesto de conformidad con la reivindicación 36, caracterizado además porque el compuesto es



10


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

43. El compuesto de conformidad con la reivindicación 38, caracterizado además porque el compuesto es



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


44. El compuesto de conformidad con la reivindicación 38, caracterizado además porque el compuesto es



5

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

45. Un método para tratar una infección de virus del Dengue en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar desde aproximadamente 700 a aproximadamente 1000 mg de un compuesto de un compuesto de Fórmula II,




10

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, en donde R^3 es hidrógeno o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R^{33} ; R^{4a} y R^{4b} se seleccionan independientemente de hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, arilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 7 átomos de

15

- carbono(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)-, heteroarilo(alquilo de 1 a 6 átomos de carbono)- y arilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R⁴⁴; y R⁵ es hidrógeno, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono (incluyendo metilo, etilo, propilo e isopropilo), haloalquilo de 1 a 6 átomos de carbono o cicloalquilo de 3 a 7 átomos de carbono y en una modalidad alternativa, R⁵ es arilo(alquilo de 1 a 4 átomos de carbono)-, arilo, heteroarilo o heteroalquilo, opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados independientemente en cada aparición de R⁵⁵.

46. El método de conformidad con la reivindicación 45, caracterizado además porque el compuesto es de la Fórmula IIA





10

, o una sal farmacéuticamente aceptable


del mismo.

47. El método de conformidad con la reivindicación 46, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de







48. El método de conformidad con la reivindicación 45, caracterizado además porque el compuesto es de la Fórmula IIB:





49. El método de conformidad con la reivindicación 48, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de







50. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 49, caracterizado además porque el compuesto se administra una vez al día.
- 5 51. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 49, caracterizado además porque el compuesto se administra dos veces al día.
52. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 49, caracterizado además porque el compuesto se administra tres veces al día.
- 10 53. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 49, caracterizado además porque el compuesto se administra cuatro veces al día.
54. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 53, caracterizado además porque el compuesto se administra durante tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez días consecutivos.
- 15 55. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 54, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 1.
56. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 54, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 2.
57. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 54, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 3.
- 20 58. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 45 a 54, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 4.
59. Un método para tratar una infección de virus del Dengue en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar desde aproximadamente 700 a aproximadamente 800 mg de un compuesto de un compuesto de la Fórmula II, IIA o IIB, en donde
- 25 R^{4a} es alquilo de 7 a 15 átomos de carbono, la variable R^{4b} es hidrógeno y todas las demás variables son como se definen aquí.
60. El método de conformidad con la reivindicación 59, caracterizado además porque el compuesto se selecciona de






61. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 o 60, caracterizado además porque el compuesto se administra una vez al día.
- 5 62. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 o 60, caracterizado además porque el compuesto se administra dos veces al día.
63. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 o 60, caracterizado además porque el compuesto se administra tres veces al día.
64. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 o 60, caracterizado además porque el compuesto se administra cuatro veces al día.
- 10 65. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 a 64, caracterizado además porque el compuesto se administra durante tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o diez días consecutivos.
66. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 a 65, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 1.
- 15 67. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 a 65, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 2.
68. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 a 65, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 3.
- 20 69. El método de conformidad con las reivindicaciones 59 a 65, caracterizado además porque el virus del Dengue es serotipo 4.
70. Un proceso para la preparación del Compuesto 1 caracterizado porque comprende:






- a. hacer reaccionar un compuesto de fórmula Intermedio A con Intermedio B en presencia de un activador y una base de trialkilamina o piridina para formar un compuesto de fórmula Intermedio C;
- y b. hacer reaccionar un compuesto de fórmula Intermedio C con fenol en presencia de una base de guanidina.

71. El proceso de conformidad con la reivindicación 70, caracterizado además porque el compuesto de la fórmula Intermedio A es Intermedio A-1:




, o una sal del mismo.

72. El proceso de conformidad con la reivindicación 70, caracterizado además porque el compuesto de la fórmula Intermedio A es Intermedio A-3:




, o una sal del mismo.

73. El proceso de conformidad con la reivindicación 70, caracterizado además porque el compuesto de la fórmula Intermedio A es Intermedio A-5:



, o una sal del mismo.

74. El proceso de conformidad con la reivindicación 70, caracterizado además porque el compuesto de la fórmula Intermedio A es Intermedio A-6:



, o una sal del mismo.

75. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 74, caracterizado además porque el activador se selecciona entre hexafluorofosfato de 1-[Bis(dimetilamino)metileno]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridinio 3-óxido (HATU) y hexafluorofosfato de 1-ciano-2-etoxi-2-oxoetilidenaminoxi)dimetilamino-morfolino-carbenio (COMU).

76. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 75, caracterizado además porque el activador es COMU.

77. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 75, caracterizado además porque el activador es HATU.

78. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 77, caracterizado además porque se utiliza una base de trialquilamina en el paso (a).

79. El proceso de conformidad con la reivindicación 78, caracterizado además porque la base de trialquilamina es trietilamina.

80. El proceso de conformidad con la reivindicación 78, caracterizado además porque la base de trialquilamina es diisopropiletilamina.


81. El proceso de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 70 a 77, caracterizado además porque se utiliza una base de piridina en la etapa (a).

82. El proceso de conformidad con la reivindicación 81, caracterizado además porque la base de piridina es piridina.

83. El proceso de conformidad con la reivindicación 81, caracterizado además porque la base de piridina es lutidina.

84. El proceso de conformidad con la reivindicación 81, caracterizado además porque la base de piridina es colidina.


85. Un método para tratar una infección de virus del Dengue de serotipos 1, 3 o 4 en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar desde aproximadamente 700 mg a aproximadamente 1000 mg del Compuesto 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo:



Compuesto 1

opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, dos, tres o cuatro veces al día.

86. El método de conformidad con la reivindicación 85, caracterizado además porque
5 el compuesto es el Compuesto 2:



Compuesto 2

87. El método de conformidad con la reivindicación 85, caracterizado además porque
el compuesto es el Compuesto 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
- 10 88. El método de conformidad con la reivindicación 86, caracterizado además porque
se administran aproximadamente 750 mg del Compuesto 2.
89. El método de conformidad con la reivindicación 87, caracterizado además porque
se administran aproximadamente 750 mg del Compuesto 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo.
- 15 90. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 89,
caracterizado además porque el compuesto se administra dos veces al día.
91. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 89,
caracterizado además porque el compuesto se administra tres veces al día.
- 20 92. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 89,
caracterizado además porque el compuesto se administra cuatro veces al día.
93. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92,
caracterizado además porque el compuesto se administra durante tres días consecutivos.
94. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92,
caracterizado además porque el compuesto se administra durante cuatro días consecutivos.
- 25 95. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92,

caracterizado además porque el compuesto se administra durante cinco días consecutivos.

96. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92, caracterizado además porque el compuesto se administra durante seis días consecutivos.

5 97. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92, caracterizado además porque el compuesto se administra durante siete días consecutivos.

98. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92, caracterizado además porque el compuesto se administra durante ocho días consecutivos.

99. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92, caracterizado además porque el compuesto se administra durante nueve días consecutivos.

10 100. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 92, caracterizado además porque el compuesto se administra durante diez días consecutivos.

101. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 100, caracterizado además porque que el humano tiene el serotipo 1 del virus del Dengue.

15 102. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 100, caracterizado además porque que el humano tiene el serotipo 3 del virus del Dengue.

103. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 100, caracterizado además porque que el humano tiene el serotipo 4 del virus del Dengue.

20 104. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 85 a 103, caracterizado además porque el compuesto se administra en combinación con un compuesto antiviral adicional.

105. El método de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de la proteasa NS2B-NS3.

106. El método de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de NS3.


25 107. El método de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es un inhibidor de la interacción NS3-NS4B.

108. El método de conformidad con la reivindicación 107, caracterizado además porque el inhibidor de la interacción NS3B-NS4B es JNJ-1802 o JNJ-A07.

30 109. El método de conformidad con la reivindicación 104, caracterizado además porque el compuesto antiviral adicional es otro inhibidor de NS5.

110. Un compuesto de fórmula:


114



Compuesto 1

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, para usarse para tratar la infección de virus del Dengue de serotipo 1, 3 o 4 en un huésped humano que lo necesite, en donde se administran aproximadamente 700 mg a aproximadamente 1000 mg del compuesto.

111. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 110, en donde el compuesto es



Compuesto 2


10

112. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 110 o 111, en donde el virus del Dengue es serotipo 1.

113. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 110 o 111, en donde el virus del Dengue es serotipo 3.

15 114. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 110 o 111, en donde el virus del Dengue es serotipo 4.


115. El uso de un compuesto de la fórmula:



Compuesto 1

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente en un portador farmacéuticamente aceptable, para el tratamiento de infección de virus del Dengue de serotipo 1, 3 o 4 en un huésped humano que lo necesite, caracterizado porque comprende administrar aproximadamente 700 mg a aproximadamente 1,000 mg del compuesto.

- 5 116. El uso como el que se reclama en la reivindicación 115, caracterizado además porque el compuesto es




Compuesto 2

117. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 115 o 116, en
10 donde el virus del Dengue es serotipo 1.

118. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 115 o 116, en
donde el virus del Dengue es serotipo 3.

119. El compuesto para usarse de conformidad con la reivindicación 115 o 116, en
donde el virus del Dengue es serotipo 4.


- 15 120. El uso de un compuesto de la fórmula



Compuesto 1

- o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente en un
portador farmacéuticamente aceptable, en la fabricación de un medicamento que comprende
aproximadamente 700 mg a aproximadamente 1,000 mg del compuesto para el tratamiento del virus
20 del Dengue.

121. El uso como el que se reclama en la reivindicación 120, en donde el compuesto
es



Compuesto 2

122. El uso como el que se reclama en la reivindicación 120 o 121, en donde el virus del Dengue es serotipo 1.

5 123. El uso como el que se reclama en la reivindicación 120 o 121, en donde el virus del Dengue es serotipo 2.

124. El uso como el que se reclama en la reivindicación 120 o 121, en donde el virus del Dengue es serotipo 3.

10 125. El uso como el que se reclama en la reivindicación 120 o 121, en donde el virus del Dengue es serotipo 4.

126. El proceso de conformidad con las reivindicaciones 70 a 74, caracterizado además porque la sal del compuesto de fórmula Intermedio A es la sal de dihidroquinina.