

REIVINDICACIONES

1. Un anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno que específicamente se une a tau humana, que comprende:

una región variable de cadena pesada ~~madura~~ que comprende CDR-H1 que comprende SEQ ID NO: 8, CDR-H2 que comprende SEQ ID NO: 9, y CDR-H3 que comprende la secuencia de LDF; y

una región variable de cadena ligera ~~madura~~ que comprende CDR-L1 que comprende SEQ ID NO: 12, CDR-L2 que comprende SEQ ID NO: 168, y CDR-L3 que comprende SEQ ID NO: 14.

- ~~2. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 1, en donde al menos una de las posiciones de Kabat H12, H13, H17, H24, H40, H43, H48, H66, H67, H76, H80, H81 y H91 está ocupada por V, K, T, A, R, Q, I, R, A, D, L, Q y F, respectivamente, y al menos una de las posiciones de Kabat L2, L12, L15, L37, L39, L45, L60 y L100 está ocupada por V, P, L, Q, R, R, D y Q respectivamente.~~

- 3.2. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 1, en donde la región variable de cadena pesada comprende SEQ ID NO: 18 y la región variable de cadena ligera comprende SEQ ID NO: 122.

- ~~4. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que es un anticuerpo.~~

- ~~5. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que es un fragmento de anticuerpo de unión a antígeno.~~

6.3. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 1 o 2~~cualquiera de las reivindicaciones 1-4~~, en donde el isotipo del anticuerpo es IgG1 humana, IgG2 humana o IgG4 humana.

7.4. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 1 o 2~~cualquiera de las reivindicaciones 1-3~~, en donde la región variable de cadena ligera ~~madura~~ se fusiona con una región constante de cadena ligera y la región variable de cadena pesada ~~madura~~ se fusiona con una región constante de cadena pesada, en donde la región constante de cadena pesada es del isotipo IgG1.

~~8. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de la reivindicación 7, en donde la región constante de cadena pesada es una forma mutante de una región constante de cadena pesada humana natural que tiene una unión reducida a un receptor Fcγ en relación con la región constante de cadena pesada humana natural.~~

~~9. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de la reivindicación 7 o la reivindicación 8, en donde la región constante de cadena pesada es del isotipo IgG1.~~

10.5. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 49, en donde la región constante de cadena pesada tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 176, con o sin la lisina C-terminal.

11.6. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 17, en donde la región variable de cadena pesada ~~madura~~ fusionada a una región

constante de cadena pesada tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 178, con o sin la lisina C-terminal.

12.7. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 17, que además comprende un péptido señal fusionado a la región variable ~~madura~~ de cadena pesada y/o ligera.

13.8. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 611, en donde la cadena pesada tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 180, con o sin la lisina C-terminal.

14.9. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 17, ~~en donde~~ la que comprende una región constante de cadena ligera que tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 177.

15.10. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 17, en donde la región variable de cadena ligera ~~madura se fusionada~~ con una región constante de cadena ligera que tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 179.

16.11. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 1015, en donde la cadena ligera tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 181.

17.12. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación 611, en donde la cadena pesada tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO:

178 con o sin la lisina C-terminal y la cadena ligera tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 179.

18-13. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con la reivindicación ~~813~~, en donde la cadena pesada tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 180 con o sin la lisina C-terminal y la cadena ligera tiene una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 181.

19-14. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1-~~1318~~, que tiene al menos una mutación en la región constante de cadena pesada.

~~20. El anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno de la reivindicación 19, en donde al menos una mutación en la región constante de cadena pesada reduce la fijación o activación del complemento por la región constante de cadena pesada.~~

21-15. Una composición farmacéutica que comprende un anticuerpo o fragmento de anticuerpo de unión a antígeno como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1-~~1420~~ y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

22-16. Un ácido nucleico que codifica ~~la una~~ cadena pesada y ~~o la una~~ cadena ligera de un anticuerpo de la reivindicación 1, en donde la cadena pesada está codificada por una secuencia que comprende SEQ ID NO: 182 y la cadena ligera está codificada por una secuencia que comprende SEQ ID NO: 183 ~~como se describe en cualquiera de las reivindicaciones 1-4 y 6-20.~~

~~23.~~ El ácido nucleico de conformidad con la reivindicación 22, en donde la cadena pesada está codificada por una secuencia que comprende SEQ ID NO: 182 y la cadena ligera está codificada por una secuencia que comprende SEQ ID NO: 183.

24.17. Un método para producir el anticuerpo de la reivindicación 1, el método comprende:

- (a) cultivar células transformadas con ácidos nucleicos que codifican las cadenas pesada y ligera del anticuerpo, de modo que las células secreten el anticuerpo; y
- (b) purificar el anticuerpo de medios de cultivo celular.

25.18. Un método para producir una línea celular que produce el anticuerpo de la reivindicación 1, el método comprende:

- (a) introducir un vector que codifica cadenas pesadas y ligeras del anticuerpo y un marcador seleccionable en las células;
- (b) propagar las células en condiciones para seleccionar células que tengan un número de copia mayor del vector;
- (c) aislar células individuales de las células seleccionadas;
- y

~~(c)~~ (d)

~~banquear~~ hacer un banco de células clonadas a partir de una única célula seleccionada en función del rendimiento del anticuerpo.