


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula II, un estereoisómero de este y/o una sal de este:



en donde:


L es alquilo, un ácido piridinocarboxílico sustituido o un acetato de azanediilo sustituido;

R² es alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; y

cada R³-R¹⁴ es independientemente H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde L es CH₂.


3. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, que es:



4. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde L es un grupo de ácido piridinocarboxílico sustituido.


5. El compuesto de la Reivindicación 1 o 4, en donde el grupo de ácido piridinocarboxílico sustituido es un piridin-dicarboxilato de dimetilo.

6. El compuesto de la Reivindicación 1 o 5, que es:




7. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde el grupo de acetato de azanediilo sustituido es un acetato de metilazanediilo.

8. El compuesto de la Reivindicación 1 o 7, que es:



9. Una composición que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

10. Un método para preparar un compuesto de Fórmula II,



en donde:


L es alquilo, un ácido piridinocarboxílico sustituido o un acetato de azanediilo sustituido;

R^2 es alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; y
 cada R^3 - R^{14} es independientemente H, F, Cl, Br, I, CN, NO_2 , alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo,


poniendo en contacto

(a) 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta, o


(b) un compuesto de formula:



(c) un compuesto de formula:




(d) un compuesto de formula:




con un compuesto reactivo adecuado para formar el compuesto de Fórmula II.

11. El método de la Reivindicación 10, en donde (b) un compuesto de formula:




se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con bicarbonato de sodio.

12. El método de la Reivindicación 10, en donde (c) un compuesto de formula:



se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con cloroformiato de 1-clorometilo.

13. El método de la Reivindicación 10, en donde (d) un compuesto de formula:



se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con cloroformiato de 1-cloroetilo.

14. El método de la Reivindicación 10, en donde el compuesto reactivo se selecciona del grupo que consiste en dibromuro de metileno, ácido 3,5-piridindicarboxílico y ácido metiliminodiacético.