


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula IV, un estereoisómero de este y/o una sal de este:




en donde:

Z es H, F, Cl, Br, I, un residuo de aminoácido, un residuo de aminoácido sustituido o un grupo que contiene nitrógeno;


R² es alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; y

cada R³-R¹⁴ es independientemente H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, en donde R² es CH₂CH₃.
3. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, en donde cada R³-R¹⁴ es H.
4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde Z es un grupo que contiene nitrógeno.
5. El compuesto de la Reivindicación 4, en donde el grupo que contiene nitrógeno es una amida.
6. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, que es:




7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, que es:



8. Una composición que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, o un estereoisómero y/o una sal de este, y un excipiente o portador farmacéuticamente aceptable.

9. Un método para preparar un compuesto de Fórmula IV, o un estereoisómero y/o una sal de este,



en donde:

Z es H, F, Cl, Br, I, un residuo de aminoácido, un residuo de aminoácido sustituido o un grupo que contiene nitrógeno;


R² es alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; y

cada R³-R¹⁴ es independientemente H, F, Cl, Br, I, CN, NO₂, alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo,


poniendo en contacto

(a) 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta, o


(b) un compuesto de formula:



(c) un compuesto de formula:




(d) un compuesto de formula:




con un compuesto reactivo adecuado para formar el compuesto de Fórmula IV.

10. El método de la Reivindicación 9, en donde (b) un compuesto de formula:




se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con bicarbonato de sodio.

11. El método de la Reivindicación 9, en donde (c) un compuesto de formula:



se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con cloroformiato de 1-clorometilo.


12. El método de la Reivindicación 9, en donde (d) un compuesto de formula:



se prepara haciendo reaccionar 2-((2-etoxifenoxi)metil)morfolina o una sal de esta con cloroformiato de 1-cloroetilo.

13. El método de la Reivindicación 9, en donde el compuesto reactivo se selecciona del grupo que consiste en dibromuro de metileno, ácido 3,5-piridindicarboxílico y ácido metiliminodiacético.

14. El método de la Reivindicación 9, en donde el compuesto reactivo se selecciona del grupo que comprende dibromuro de metileno, ácido 3,5-piridindicarboxílico, ácido



metiliminodiacético, poliformaldehído y

15. El método de la Reivindicación 9, en donde el compuesto reactivo es poliformaldehído.

16. El método de la Reivindicación 9, en donde el compuesto reactivo es:

