


REIVINDICACIONES

SE REIVINDICA:

1. Un compuesto representado por la estructura
5 de la Fórmula (I'):



o una sal farmacéuticamente aceptable de este en donde:

10

X se selecciona de CR⁴ o N;

A se selecciona de (a) y (b):

(a) alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de
15 halógeno, -OR^{11A}, -SR^{11A}, -N(R^{11A})₂, -C(O)R^{11A}, -C(O)N(R^{11A})₂, -N(R^{11A})C(O)R^{11A}, -C(O)OR^{11A}, -OC(O)R^{11A}, -S(O)R^{11A}, -S(O)₂R^{11A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{11A}), y -CN;

15

(b) -(CR'R'')_z(heterociclo de 3 a 10 miembros),
20 -(CR'R'')_z(carbociclo C₃₋₁₀), -O-(CR'R'')_z(heterociclo de 3 a 10 miembros), y -O-(CR'R'')_z(carbociclo C₃₋₁₀), el

heterociclo de 3 a 10 miembros y carbociclo C_{3-10} están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

- 5 halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-N(R^{11})S(O)_2R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $-CN$;
- 10 alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y el heterociclo de 3 a 10 miembros están
- 15 cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:
- 20 halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, $-CN$; y
- 25 alquilo C_{1-10} opcionalmente

sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{11A}$, $-$
 SR^{11A} , $-N(R^{11A})_2$, $-C(O)R^{11A}$, $-$
 5 $C(O)N(R^{11A})_2$, $-N(R^{11A})C(O)R^{11A}$, $-$
 $C(O)OR^{11A}$, $-OC(O)R^{11A}$, $-S(O)R^{11A}$, $-$
 $S(O)_2R^{11A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11A})$,
 y $-CN$; y
 carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a
 10 miembros, cada uno de los cuales
 está opcionalmente sustituido con uno
 o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-$
 15 $C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-$
 $N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-$
 $S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{11})$, $-CN$; y alquilo C_{1-10}
 opcionalmente sustituido con uno o más
 20 sustituyentes independientemente
 seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-$
 $N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-$
 $N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-$
 NO_2 , $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$;
 25 cada R' se selecciona de hidrógeno, halógeno,
 $-OR^{18A}$, $-N(R^{18A})_2$, $-C(O)R^{18A}$, $-C(O)N(R^{18A})_2$, $-$

NO_2 , $-\text{CN}$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente
 sustituido con uno o más de halógeno, $-\text{OR}^{18\text{A}}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18\text{A}})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18\text{A}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18\text{A}})_2$, $-\text{NO}_2$, y $-\text{CN}$;
 cada R'' se selecciona de hidrógeno, halógeno,
 5 $-\text{OR}^{19\text{A}}$, $-\text{N}(\text{R}^{19\text{A}})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{19\text{A}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{19\text{A}})_2$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CN}$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente
 sustituido con uno o más de halógeno, $-\text{OR}^{19\text{A}}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{19\text{A}})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{19\text{A}}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{19\text{A}})_2$, $-\text{NO}_2$, y $-\text{CN}$;
 B se selecciona de $-\text{C}(\text{R}^6)_3$ y carbociclo C_{3-10} ,
 10 en donde el carbociclo C_{3-10} está opcionalmente
 sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de:
 halógeno, $-\text{OR}^{12}$, $-\text{SR}^{12}$, $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{12})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{12})\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{N}(\text{R}^{12})\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{12}$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{12})$, $-\text{CN}$;
 15 alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} , cualquiera
 de los cuales está opcionalmente
 sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 20 halógeno, $-\text{OR}^{12}$, $-\text{SR}^{12}$, $-\text{N}(\text{R}^{12})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{12})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{12})\text{C}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{12}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{12}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{12}$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{12})$, $-\text{CN}$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo
 25 de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo

C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están
 cada uno opcionalmente sustituidos con uno
 o más sustituyentes seleccionados de:
 halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, -
 5 $C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, -
 $OC(O)R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{12})$, y $-CN$;
 cada R^6 se selecciona independientemente en
 cada caso de (i), (ii), y (iii):
 (i) hidrógeno, halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, -
 10 $N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, -
 $N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$,
 $-OC(O)R^{13}$, $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $-CN$;
 (ii) alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 15 independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$,
 $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, -
 $N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, -
 $S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 20 $=N(R^{13})$, $-CN$; y
 (iii) carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10
 miembros, cada uno de los cuales está
 opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
 25 seleccionados de:

hidrógeno, halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-$
 $N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-$
 $N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-N(R^{15})S(O)_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$,
 $-OC(O)R^{15}$, $-S(O)R^{15}$, $-S(O)_2R^{15}$, $-NO_2$, $-CN$;
 5 alquilo C_{1-10} y alquenilo C_{2-10} , cada uno de
 los cuales está opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-$
 10 $C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-$
 $N(R^{15})S(O)_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-$
 $S(O)R^{15}$, $-S(O)_2R^{15}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{15})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo
 de 3 a 10 miembros, el carbociclo C_{3-10} y
 15 heterociclo de 3 a 10 miembros están cada
 uno opcionalmente sustituidos con uno o
 más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-$
 $N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-$
 20 $N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$,
 $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$,
 $=S$, $=N(R^{15A})$, $-CN$; y alquilo C_{1-6}
 opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
 25 seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-$
 $N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-$

$N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$,
 $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$,
 $=S$, $=N(R^{15A})$, y $-CN$;
 carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10
 5 miembros, cada uno de los cuales está
 opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-$
 $N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-$
 10 $N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-N(R^{15})S(O)_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-$
 $OC(O)R^{15}$, $-S(O)R^{15}$, $-S(O)_2R^{15}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{15})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} , heterociclo
 de 3 a 10 miembros, y alquilo C_{1-6} , el
 carbociclo C_{3-10} , heterociclo de 3 a 10
 15 miembros, y alquilo C_{1-6} , están cada uno
 opcionalmente sustituidos con uno o más
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-$
 $N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-$
 20 $N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-N(R^{15})S(O)_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-$
 $OC(O)R^{15}$, $-S(O)R^{15}$, $-S(O)_2R^{15}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{15})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} , carbociclo
 $C_{3-10}-(alquilo\ C_{1-6})$, carbociclo $C_{3-10}-$
 $(haloalquilo\ C_{1-6})$, heterociclo de 3 a 10
 25 miembros, heterociclo(alquilo C_{1-6}) de 3

a 10 miembros, y heterociclo(haloalquilo C₁₋₆) de 3 a 10 miembros;
 cada R³ y R⁴ se selecciona independientemente en cada caso de:

5 hidrógeno, halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -
 N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶, -C(O)N(R¹⁶)₂, -
 N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁶)S(O)₂R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -
 OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, -CN; y
 alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con
 10 uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶,
 -C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -
 OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, =O,
 15 =S, =N(R¹⁶), y -CN;

cada R⁵ se selecciona independientemente en cada caso de:

 halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -
 C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -
 20 N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -
 S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, -CN; y
 alquilo C₁₋₁₀ y carbociclo C₃₋₁₀, cada uno
 de los cuales está opcionalmente
 sustituido con uno o más sustituyentes
 25 independientemente seleccionados de
 halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷,

$-C(O)N(R^{17})_2$, $-N(R^{17})C(O)R^{17}$, $-$
 $N(R^{17})S(O)_2R^{17}$, $-C(O)OR^{17}$, $-OC(O)R^{17}$, $-$
 $S(O)R^{17}$, $-S(O)_2R^{17}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{17})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y
5 heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde
el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a
10 miembros están cada uno opcionalmente
sustituídos con uno o más sustituyentes
seleccionados de: halógeno, $-OR^{17}$, $-SR^{17}$,
10 $-N(R^{17})_2$, $-C(O)R^{17}$, $-C(O)N(R^{17})_2$, $-$
 $N(R^{17})C(O)R^{17}$, $-N(R^{17})S(O)_2R^{17}$, $-C(O)OR^{17}$,
 $-OC(O)R^{17}$, $-S(O)R^{17}$, $-S(O)_2R^{17}$, $-NO_2$, $=O$,
 $=S$, $=N(R^{17})$, y $-CN$;
o dos R^5 se toman junto con los átomos a los
15 que están conectados, se unen para formar un
carbociclo C_{3-6} o heterociclo de 3 a 6 miembros;
el carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3 a 6
miembros están cada uno opcionalmente
sustituídos con uno o más sustituyentes
20 seleccionados de: halógeno, $-OR^{17A}$, $-SR^{17A}$, $-$
 $N(R^{17A})_2$, $-C(O)R^{17A}$, $-C(O)N(R^{17A})_2$, $-$
 $N(R^{17A})C(O)R^{17A}$, $-N(R^{17A})S(O)_2R^{17A}$, $-C(O)OR^{17A}$, $-$
 $OC(O)R^{17A}$, $-S(O)R^{17A}$, $-S(O)_2R^{17A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{17A})$, $-CN$, alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} ,
25 el alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} están cada
uno opcionalmente sustituídos con uno o más

sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{17A}$, $-SR^{17A}$, $-$
 $N(R^{17A})_2$, $-C(O)R^{17A}$, $-C(O)N(R^{17A})_2$, $-$
 $N(R^{17A})C(O)R^{17A}$, $-N(R^{17A})S(O)_2R^{17A}$, $-C(O)OR^{17A}$, $-$
 5 $OC(O)R^{17A}$, $-S(O)R^{17A}$, $-S(O)_2R^{17A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{17A})$, y $-CN$;
 o R^4 y una R^5 puede juntarse para formar un
 carbociclo de 3 a 6 miembros, en donde el
 carbociclo de 3 a 6 miembros está opcionalmente
 10 sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de:
 halógeno, $-OR^{20A}$, $-N(R^{20A})_2$, $-C(O)R^{20A}$, $-$
 $C(O)N(R^{20A})_2$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{20A})$, $-CN$;
 alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} , cada uno de
 15 los cuales está opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{20A}$, $-N(R^{20A})_2$, $-C(O)R^{20A}$, $-$
 $C(O)N(R^{20A})_2$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{20A})$, $-CN$;
 20 R^{11} , R^{11A} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} , R^{15A} , R^{16} , R^{17} , R^{17A} ,
 R^{18A} , R^{19A} , y R^{20A} se seleccionan cada uno
 independientemente en cada caso de:
 hidrógeno;
 alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con
 25 uno más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-O$ -alquilo C_{1-}

6, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂,
 =O, -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de
 3 a 10 miembros, en donde cada carbociclo
 C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros se
 5 sustituyen opcionalmente con uno o más
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de: halógeno, -OH, alquilo
 C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆,
 -NH₂, -NO₂, =O, y -CN; y
 10 carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
 miembros opcionalmente sustituido con
 uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de:
 halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -O-
 15 haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN;
 m se selecciona de 1, 2, y 3;
 n se selecciona de 1 y 2;
 p se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6; y
 z se selecciona de 0, 1, y 2.
 20 2. El compuesto o la sal de la reivindicación
 1, en donde A se selecciona de -(CR'R")_z(heterociclo de 3
 a 10 miembros), -(CR'R")_z(carbociclo C₃₋₁₀), -O-
 (CR'R")_z(heterociclo de 3 a 10 miembros) y -O-
 (CR'R")_z(carbociclo C₃₋₁₀), el heterociclo de 3 a 10
 25 miembros y carbociclo C₃₋₁₀ están cada uno opcionalmente

sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, $-CN$, y alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11A}$, $-SR^{11A}$, $-N(R^{11A})_2$, $-C(O)R^{11A}$, $-C(O)N(R^{11A})_2$, $-N(R^{11A})C(O)R^{11A}$, $-C(O)OR^{11A}$, $-OC(O)R^{11A}$, $-S(O)R^{11A}$, $-S(O)_2R^{11A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11A})$, y $-CN$.

3. El compuesto o la sal de la reivindicación 2, en donde A se selecciona de $-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros), $-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), $-O-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros) y $-O-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), el heterociclo de 3 a 10


miembros y carbociclo C_{3-10} están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno
5 o más sustituyentes seleccionados independientemente carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
10 seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, $-CN$, y alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
15 seleccionados de halógeno, $-OR^{11A}$, $-SR^{11A}$, $-N(R^{11A})_2$, $-C(O)R^{11A}$, $-C(O)N(R^{11A})_2$, $-N(R^{11A})C(O)R^{11A}$, $-C(O)OR^{11A}$, $-OC(O)R^{11A}$, $-S(O)R^{11A}$, $-S(O)_2R^{11A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11A})$, y $-CN$.

4. El compuesto o la sal de la reivindicación
20 3, en donde A se selecciona de $-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros), $-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), $-O-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros) y $-O-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), el heterociclo de 3 a 10 miembros y carbociclo C_{3-10} están cada uno opcionalmente
25 sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{11A}, -SR^{11A}, -N(R^{11A})₂, -C(O)R^{11A}, -C(O)N(R^{11A})₂, -N(R^{11A})C(O)R^{11A}, -C(O)OR^{11A}, -OC(O)R^{11A}, -S(O)R^{11A}, -S(O)₂R^{11A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{11A}), y -CN.

5. El compuesto o la sal de la reivindicación



6. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R² se selecciona de:

alquilo C₁₋₁₀ y alquenilo C₂₋₁₀, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros,


carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), -CN, y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), y -CN.

7. El compuesto o la sal de la reivindicación 6, en donde R² es alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), -CN, y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente

seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$, $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{15A})$, y $-CN$.

8. El compuesto o la sal de la reivindicación 7, en donde R² es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de azetidínico, pirrolidinilo, piperazinilo, y morfolinilo, el azetidínico, pirrolidinilo, piperazinilo, morfolinilo están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -NO₂, =O, y -CN, y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -NO₂, y -CN.

9. El compuesto o la sal de la reivindicación 8,




20 10. El compuesto o la sal de la reivindicación 7,
en donde R² es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno
o más heterociclos bicíclicos de 5 a 10 miembros

opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$, $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{15A})$, $-CN$, y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$, $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{15A})$, y $-CN$.

11. El compuesto o la sal de la reivindicación 10, en donde R^2 es alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más heterociclos en puente de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-NO_2$, y $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-NO_2$, y $-CN$.

12. El compuesto o la sal de la reivindicación



13. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde R^2 se selecciona de:



carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está

seleccionados de carbociclo C₃₋₁₀, heterociclo
 de 3 a 10 miembros, y alquilo C₁₋₆, el
 carbociclo C₃₋₁₀, heterociclo de 3 a 10 miembros
 y alquilo C₁₋₆, están cada uno opcionalmente
 5 sustituidos con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de halógeno,
 -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -
 N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -
 OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S,
 10 =N(R¹⁵), -CN, carbociclo C₃₋₁₀, carbociclo C₃₋₁₀-
 (alquilo C₁₋₆), carbociclo C₃₋₁₀-(haloalquilo C₁₋₆),
 heterociclo de 3 a 10 miembros,
 heterociclo(alquilo C₁₋₆) de 3 a 10 miembros, y
 heterociclo(haloalquilo C₁₋₆) de 3 a 10
 15 miembros.

15. El compuesto o la sal de la reivindicación
 0, en donde R² se selecciona de:
 carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
 miembros, cada uno de los cuales está
 20 opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
 seleccionados de carbociclo C₃₋₁₀, heterociclo
 de 3 a 10 miembros, y alquilo C₁₋₆, el
 carbociclo C₃₋₁₀, heterociclo de 3 a 10
 25 miembros y alquilo C₁₋₆, están cada uno
 opcionalmente sustituidos con uno o más

sustituyentes independientemente seleccionados de carbociclo C_{3-10} , carbociclo C_{3-10} -(alquilo C_{1-6}), carbociclo C_{3-10} -(haloalquilo C_{1-6}), heterociclo de 3 a 10 miembros, heterociclo(alquilo C_{1-6}) de 3 a 10 miembros, y heterociclo(haloalquilo C_{1-6}) de 3 a 10 miembros.


16. El compuesto o la sal de la reivindicación 15,




17. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde p es 0.

18. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en donde dos R^5 se toman junto con los átomos a los que están conectados, se unen para formar un carbociclo C_{3-5} o heterociclo de 3 a 5 miembros; el carbociclo C_{3-5} y heterociclo de 3 a 5 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de: halógeno, $-OR^{17A}$, $-SR^{17A}$, $-N(R^{17A})_2$, $-C(O)R^{17A}$, $-C(O)N(R^{17A})_2$, $-N(R^{17A})C(O)R^{17A}$, $-N(R^{17A})S(O)_2R^{17A}$, $-C(O)OR^{17A}$, $-OC(O)R^{17A}$, $-S(O)R^{17A}$, $-S(O)_2R^{17A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{17A})$, y $-CN$.


19. El compuesto o la sal de una cualquiera de




las reivindicaciones 1 a 18, en donde es




20. El compuesto o la sal de la reivindicación




21. El compuesto o la sal de una cualquiera de



las reivindicaciones 1 a 18, en donde es




22. El compuesto o la sal de la reivindicación



23. Un compuesto representado por la estructura

5 de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable de este en donde:

10 A se selecciona de $-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros), $-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), $-O-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros), y $-O-(CR'R'')_z$ (carbociclo C_{3-10}), el heterociclo de 3 a 10 miembros y carbociclo C_{3-10} están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, -

$N(R^{11})S(O)_2R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $-CN$;
 alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$; y carbociclo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$; y alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-$

$C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$;

cada R' se selecciona de hidrógeno, halógeno, $-OR^{18A}$, $-N(R^{18A})_2$, $-C(O)R^{18A}$, $-C(O)N(R^{18A})_2$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más de halógeno, $-OR^{18A}$, $-N(R^{18A})_2$, $-C(O)R^{18A}$, $-C(O)N(R^{18A})_2$, $-NO_2$, y $-CN$;

cada R'' se selecciona de hidrógeno, halógeno, $-OR^{19A}$, $-N(R^{19A})_2$, $-C(O)R^{19A}$, $-C(O)N(R^{19A})_2$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más de halógeno, $-OR^{19A}$, $-N(R^{19A})_2$, $-C(O)R^{19A}$, $-C(O)N(R^{19A})_2$, $-NO_2$, y $-CN$;

B se selecciona de $-CH(R^6)_2$ y carbociclo C_{3-10} , en donde el carbociclo C_{3-10} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, $-OR^{12}$, $-SR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-N(R^{12})S(O)_2R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $S(O)R^{12}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{12})$, $-CN$;

alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} , cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{12}$, $-SR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$,

$C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, $-$
 $OC(O)R^{12}$, $-S(O)R^{12}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{12})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo
 de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo
 C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están
 cada uno opcionalmente sustituidos con uno
 o más sustituyentes seleccionados de:
 halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-$
 $C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, $-$
 $OC(O)R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{12})$, y $-CN$;
 cada R^6 se selecciona independientemente en
 cada caso de (i), (ii), y (iii):
 (i) halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$,
 $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-$
 $N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-$
 $S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $-CN$;
 (ii) alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$,
 $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-$
 $N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-$
 $S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{13})$, $-CN$; y
 (iii) carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10
 miembros, cada uno de los cuales está

opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes independientemente
seleccionados de:

5 halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-$
 $C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$,
 $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$,
 $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{13})$, $-CN$; y
10 alquilo C_{1-10} opcionalmente
sustituido con uno o más
sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-$
 SR^{13} , $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$,
15 $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$,
 $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{13})$, y $-CN$;

R^1 se selecciona de:

 hidrógeno, halógeno, $-OR^{14}$, $-SR^{14}$, $-$
 $N(R^{14})_2$, $-C(O)R^{14}$, $-C(O)N(R^{14})_2$, $-$
20 $N(R^{14})C(O)R^{14}$, $-N(R^{14})S(O)_2R^{14}$, $-C(O)OR^{14}$, $-$
 $OC(O)R^{14}$, $-S(O)R^{14}$, $-S(O)_2R^{14}$, $-NO_2$, $-CN$; y
 alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con
 uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{14}$, $-SR^{14}$, $-$
25 $N(R^{14})_2$, $-C(O)R^{14}$, $-C(O)N(R^{14})_2$, $-$
 $N(R^{14})C(O)R^{14}$, $-N(R^{14})S(O)_2R^{14}$, $-C(O)OR^{14}$, $-$

OC(O)R¹⁴, -S(O)R¹⁴, -S(O)₂R¹⁴, -NO₂, =O, =S,
=N(R¹⁴), -CN;

R² se selecciona de:

5 hidrógeno, halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -
N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -
N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,
-OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, -CN;
alquilo C₁₋₁₀ y alquenilo C₂₋₁₀, cada uno de
los cuales está opcionalmente sustituido
10 con uno o más sustituyentes
independientemente seleccionados de
halógeno, - -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵,
-C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -
N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -
15 S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S,
=N(R¹⁵), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo
de 3 a 10 miembros, el carbociclo C₃₋₁₀ y
heterociclo de 3 a 10 miembros están cada
uno opcionalmente sustituidos con uno o
20 más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -
N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -
N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A},
-OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O,
25 =S, =N(R^{15A}), y -CN; y

carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), y -CN;

cada R³ y R⁴ se selecciona independientemente en cada caso de:

hidrógeno, halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶, -C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁶)S(O)₂R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶,

-C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -
 OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, =O,
 =S, =N(R¹⁶), y -CN;

cada R⁵ se selecciona independientemente en
 5 cada caso de:

halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -
 C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -
 N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -
 S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, -CN; y

10 alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷,
 -C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -
 15 N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -
 S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, =O, =S,
 =N(R¹⁷), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y
 heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde
 el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a
 20 10 miembros están cada uno opcionalmente
 sustituidos con uno o más sustituyentes
 seleccionados de: halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷,
 -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)N(R¹⁷)₂, -
 N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷,
 25 -OC(O)R¹⁷, -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, =O,
 =S, =N(R¹⁷), y -CN;

R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R^{15A}, R¹⁶, R¹⁷, R^{18A}, y
R^{19A} se seleccionan cada uno
independientemente en cada caso de:

hidrógeno;

- 5 alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con
uno más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, -O-alquilo C₁₋₆,
-O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂,
=O, -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de
10 3 a 10 miembros, en donde cada carbociclo
C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros se
sustituyen opcionalmente con uno o más
sustituyentes independientemente
seleccionados de: halógeno, -OH, alquilo
15 C₁₋₆, -O-alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆,
-NH₂, -NO₂, =O, y -CN; y
carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
miembros opcionalmente sustituido con
uno o más sustituyentes
20 independientemente seleccionados de:
halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -O-
haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN;
m se selecciona de 1, 2, y 3;
n se selecciona de 1 y 2;
25 p se selecciona de 1, 2, 3 y 4; y
z se selecciona de 0, 1, y 2.

24. El compuesto o la sal de la reivindicación 23, en donde z es 1.

25. El compuesto o la sal de la reivindicación 23 o la reivindicación 24, en donde R' y R" se seleccionan cada uno independientemente de hidrógeno, alquilo C₁₋₆, y haloalquilo C₁₋₆.

26. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 23 a 25, en donde A se selecciona -O-(CR'R")_z(heterociclo de 3 a 10 miembros) y -O-(CR'R")_z(carbociclo C₃₋₁₀), el heterociclo de 3 a 10 miembros y carbociclo C₃₋₁₀ están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, -OR¹¹, -SR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -C(O)N(R¹¹)₂, -N(R¹¹)C(O)R¹¹, -N(R¹¹)S(O)₂R¹¹, -C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -S(O)R¹¹, -S(O)₂R¹¹, -NO₂, -CN;

alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -SR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -C(O)N(R¹¹)₂, -N(R¹¹)C(O)R¹¹, -C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -S(O)R¹¹, -S(O)₂R¹¹, -NO₂, =O, =S, =N(R¹¹), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente

sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$; y

5 carbociclo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$; y alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$.

10

15

27. El compuesto o la sal de la reivindicación 26, en donde A es $-O-(CR'R'')_z$ (heterociclo de 3 a 10 miembros), el heterociclo de 3 a 10 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$; y alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:


20

25 halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$.

28. El compuesto o la sal de la reivindicación 27, en donde A es -O-(CR'R")_z(heteroarilo de 5 miembros), el heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -SR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -C(O)N(R¹¹)₂, -N(R¹¹)C(O)R¹¹, -C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -S(O)R¹¹, -S(O)₂R¹¹, -NO₂, -CN; y alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -C(O)N(R¹¹)₂, -N(R¹¹)C(O)R¹¹, -C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -NO₂, =O, =N(R¹¹), y -CN.

29. El compuesto o la sal de la reivindicación 28, en donde A es -O-(CR'R")_z(heteroarilo de 5 miembros), el heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -NO₂, -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -NO₂, -CN.

30. El compuesto o la sal de la reivindicación




31. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 23 a 30, en donde R² es alquilo C₁₋₁₀ y alqueno C₂₋₁₀, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵,


-C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros, carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros cada uno
 5 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), y -CN.

10 32. El compuesto o la sal de la reivindicación 31, en donde R² es alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más
 15 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), y -CN.

20 33. El compuesto o la sal de la reivindicación 32, en donde R² es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de oxtanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiraniilo, dioxoanilo, y morfolinilo.

34. El compuesto o la sal de la reivindicación 33,


25 en donde R² se selecciona de 




35. El compuesto o la sal de la reivindicación 31,
 en donde R^2 es alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno
 5 o más sustituyentes independientemente seleccionados de
 carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, carbociclo
 C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno
 opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$,
 10 $-N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$, $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-$
 $N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$, $-OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-$
 NO_2 , $=O$, $=S$, $=N(R^{15A})$, y $-CN$.

36. El compuesto o la sal de la reivindicación
 [0088], en donde R^2 es alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido
 15 con uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de azetidino, pirrolidino, piperidino,
 piperazino, octano, tetrahidrofurano,
 tetrahidropirano, morfolino e imidazolo, cada uno de
 los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más
 20 sustituyentes independientemente seleccionados de
 halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-NO_2$, y $-CN$.

37. El compuesto o la sal de la reivindicación 36,






38. El compuesto o la sal de la reivindicación 5 [0088], en donde R² es alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de heterociclo monocíclico de 3 a 8 miembros y heterociclo bicíclico de 5 a 10 miembros, están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), y -CN.


39. El compuesto o la sal de la reivindicación 38, en donde R² es alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más heterociclos bicíclicos de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR^{15A}, -SR^{15A}, -N(R^{15A})₂, -C(O)R^{15A}, -C(O)N(R^{15A})₂, -N(R^{15A})C(O)R^{15A}, -N(R^{15A})S(O)₂R^{15A}, -C(O)OR^{15A}, -OC(O)R^{15A}, -S(O)R^{15A}, -S(O)₂R^{15A}, -NO₂, =O, =S, =N(R^{15A}), y -CN.

40. El compuesto o la sal de la reivindicación 39,




41. El compuesto o la sal de la reivindicación 39,
5 en donde R^2 es alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno
o más heterociclos en puente de 5 a 10 miembros opcionalmente
sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, $-OR^{15A}$, $-SR^{15A}$, $-N(R^{15A})_2$, $-C(O)R^{15A}$,
 $-C(O)N(R^{15A})_2$, $-N(R^{15A})C(O)R^{15A}$, $-N(R^{15A})S(O)_2R^{15A}$, $-C(O)OR^{15A}$, -
10 $OC(O)R^{15A}$, $-S(O)R^{15A}$, $-S(O)_2R^{15A}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{15A})$, y $-CN$.

42. El compuesto o la sal de la reivindicación



43. El compuesto o la sal de la reivindicación 31,
en donde R^2 es alquenilo C_{2-6} opcionalmente sustituido con uno
15 o más sustituyentes independientemente seleccionados de
halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.

44. El compuesto o la sal de la reivindicación




45. El compuesto o la sal de una cualquiera de las
20 reivindicaciones 23 a 30, en donde R^2 se selecciona de
hidrógeno, halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, -

$C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-N(R^{15})S(O)_2R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-S(O)R^{15}$, $-S(O)_2R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.

46. El compuesto o la sal de la reivindicación 45, en donde R^2 es $-N(R^{15})_2$, en donde cada R^{15} se selecciona
5 independientemente de alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -haloalquilo C_{1-6} , $-NH_2-NO_2$, $=O$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, en donde cada carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10
10 miembros se sustituyen opcionalmente con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -haloalquilo C_{1-6} , $-NH_2-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

47. El compuesto o la sal de la reivindicación
15 46, en donde R^2 es $-N(R^{15})_2$ en donde cada R^{15} se selecciona independientemente de alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-NH_2$, $-CN$, y heterociclo de 4 miembros, en donde cada heterociclo de 4 miembros se
20 sustituyen opcionalmente con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OH$, alquilo C_{1-6} , $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -haloalquilo C_{1-6} , $-NH_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

48. El compuesto o la sal de la reivindicación

25 47, en donde R^2 es .

de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de:

5 halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$; y carbociclo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

10 independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$; y alquilo C_{1-10} opcionalmente

15 sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$;

20 B se selecciona de $-CH(R^6)_2$ y carbociclo C_{3-10} , en donde el carbociclo C_{3-10} está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

25 halógeno, $-OR^{12}$, $-SR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-$

$N(R^{12})S(O)_2R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-S(O)R^{12}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{12})$, $-CN$;
 alquilo C_{1-10} y carbociclo C_{3-10} ,
 cualquiera de los cuales está
 opcionalmente sustituido con uno o
 más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, $-OR^{12}$, $-SR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$,
 $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-S(O)R^{12}$, $-S(O)_2R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$,
 $=N(R^{12})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y
 heterociclo de 3 a 10 miembros; en
 donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo
 de 3 a 10 miembros están cada uno
 opcionalmente sustituidos con uno o
 más sustituyentes seleccionados de:
 halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $-C(O)OR^{12}$,
 $-OC(O)R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{12})$, y $-CN$;
 cada R^6 se selecciona independientemente en
 cada caso de (i), (ii), y (iii):
 (i) halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$,
 $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$,
 $N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$,
 $S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $-CN$;

- (ii) alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{13})$, $-CN$; y
- (iii) carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:
- halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{13})$, $-CN$; y
- alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-SR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-S(O)R^{13}$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{13})$, y $-CN$;

R¹ se selecciona de:

5 hidrógeno, halógeno, -OR¹⁴, -SR¹⁴, -
 N(R¹⁴)₂, -C(O)R¹⁴, -C(O)N(R¹⁴)₂, -
 N(R¹⁴)C(O)R¹⁴, -N(R¹⁴)S(O)₂R¹⁴, -C(O)OR¹⁴, -
 OC(O)R¹⁴, -S(O)R¹⁴, -S(O)₂R¹⁴, -NO₂, -CN; y
 alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido con
 uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, -OR¹⁴, -SR¹⁴, -
10 N(R¹⁴)₂, -C(O)R¹⁴, -C(O)N(R¹⁴)₂, -
 N(R¹⁴)C(O)R¹⁴, -N(R¹⁴)S(O)₂R¹⁴, -C(O)OR¹⁴, -
 OC(O)R¹⁴, -S(O)R¹⁴, -S(O)₂R¹⁴, -NO₂, =O, =S,
 =N(R¹⁴), -CN;

R² se selecciona de:

15 hidrógeno, halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -
 N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -
 N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,
 -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, -CN;
 y alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
20 independientemente seleccionados de
 halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -
 C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -
 N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -
 S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵),
25 y -CN; y

carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), y -CN;

cada R³ y R⁴ se selecciona independientemente en cada caso de:

hidrógeno, halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶, -C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁶)S(O)₂R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶,

-C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -
 OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, =O,
 =S, =N(R¹⁶), y -CN;

cada R⁵ se selecciona independientemente en
 5 cada caso de:

halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -
 C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -
 N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -
 S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, -CN; y

10 alquilo C₁₋₁₀ opcionalmente sustituido
 con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de
 halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷,
 -C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -
 15 N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -
 S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, =O, =S,
 =N(R¹⁷), -CN, carbociclo C₃₋₁₀ y
 heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde
 el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a
 20 10 miembros están cada uno opcionalmente
 sustituidos con uno o más sustituyentes
 seleccionados de: halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷,
 -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)N(R¹⁷)₂, -
 N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, -C(O)OR¹⁷,
 25 -OC(O)R¹⁷, -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, =O,
 =S, =N(R¹⁷), y -CN;

R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, R¹⁵, R¹⁶, y R¹⁷ se seleccionan
cada uno independientemente en cada caso de:

hidrógeno;

5 alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con
uno más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, -O-alquilo C₁₋₆,
-O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, -CN,
carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
10 miembros, en donde cada carbociclo C₃₋₁₀ y
heterociclo de 3 a 10 miembros están
opcionalmente sustituidos con uno o más
sustituyentes independientemente
seleccionados de: halógeno, -OH, -O-
alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -
15 NO₂, =O, y -CN; y
carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
miembros opcionalmente sustituido con
uno o más sustituyentes
independientemente seleccionados de:
20 halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -O-
haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN;


m se selecciona de 1, 2, y 3;

n se selecciona de 1 y 2; y

p se selecciona de 1, 2, 3, y 4.


25 50. El compuesto o la sal de la reivindicación
49, en donde m es 1.

51. El compuesto o la sal de la reivindicación 49 o la reivindicación 50, en donde la Fórmula (II) está representada por la estructura de la Fórmula (II-a):



52. El compuesto o la sal de la reivindicación 49, en donde m es 2.

53. El compuesto o la sal de la reivindicación 49 o la reivindicación 52, en donde la Fórmula (II) está representada por la estructura de la Fórmula (II-b):



15 54. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 53, en donde A es heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $-CN$;

5 alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$; y

10 carbociclo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.


55. El compuesto o la sal de la reivindicación
15 54, en donde A se selecciona de pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, y tetrazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
20 seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

56. El compuesto o la sal de la reivindicación
55, en donde A se selecciona de pirazolilo, isoxazolilo,
25 y oxadiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C_{1-3} opcionalmente


sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-NO_2$, y CN.


57. El compuesto o la sal de la reivindicación 56, en donde A se selecciona de es en donde A se selecciona
 5 de pirazolilo, isoxazolilo, y oxadiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con metilo, etilo, propilo, e isopropilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$,
 10 $N(R^{11})_2$, $-NO_2$, y $-CN$.

58. El compuesto o la sal de la reivindicación 57,



59. El compuesto o la sal de la reivindicación






60. El compuesto o la sal de la reivindicación 54, en donde A se selecciona de pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, y tetrazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más carbociclo C₃₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)R¹¹, -C(O)N(R¹¹)₂, -N(R¹¹)C(O)R¹¹, -C(O)OR¹¹, -OC(O)R¹¹, -NO₂, =O, y -CN.

61. El compuesto o la sal de la reivindicación 60, en donde A se selecciona de pirazolilo, isoxazolilo, y oxadiazolilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con carbociclo C₃₋₆ saturado opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -NO₂, y -CN.


62. El compuesto o la sal de la reivindicación 61, en donde A se selecciona de pirazolilo, isoxazolilo, y oxadiazolilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con ciclopropilo, ciclobutilo,

ciclopentilo, y ciclohexilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-NO_2$, y $-CN$.

5 63. El compuesto o la sal de la reivindicación 62,



64. El compuesto o la sal de la reivindicación



10 65. El compuesto o la sal de la reivindicación 54, en donde A se selecciona de pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo, triazolilo, y tetrazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C_{1-10}


15 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

20 66. El compuesto o la sal de la reivindicación 65, en donde A se selecciona de es en donde A se selecciona de pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo, triazolilo,

isoxazolilo, y oxadiazolilo, cada uno de los cuales está
 opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C₁₋₁₀
 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -
 5 N(R¹¹)₂, -NO₂ y CN.

67. El compuesto o la sal de la reivindicación
 66, en donde A se selecciona de es en donde A se selecciona
 de pirimidinilo, pirazolilo, imidazolilo, triazolilo,
 isoxazolilo, y oxadiazolilo, cada uno de los cuales está
 10 opcionalmente sustituido con metilo, etilo, propilo, terc-
 butilo, e isopropilo, cada uno de los cuales está
 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹¹, -
 N(R¹¹)₂, -NO₂, y -CN.

15 68. El compuesto o la sal de la reivindicación



69. El compuesto o la sal de la reivindicación 49,
 20 en donde A es heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente

sustituido con uno o más alquilo C_{1-10} opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-$
 $C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-$
5 $S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y
heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10}
y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de:
halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-$
10 $N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$.

70. El compuesto o la sal de la reivindicación 69,
en donde A se selecciona de pirimidinilo, pirazolilo,
imidazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxadiazolilo,
triazolilo, y tetrazolilo, cada uno de los cuales está
15 opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C_{1-10}
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados de carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10
miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a
10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno
20 o más sustituyentes seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-$
 $N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-$
 $OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$.


71. El compuesto o la sal de la reivindicación
70, en donde A se selecciona de pirazolilo, imidazolilo,
25 oxadiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente
sustituido con uno o más alquilo C_{1-3} opcionalmente

sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más
 5 sustituyentes seleccionados de: halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -NO₂, y CN.


72. El compuesto o la sal de la reivindicación 71, en donde A se selecciona de pirazolilo, imidazolilo, oxadiazolilo, cada uno de los cuales está opcionalmente
 10 sustituido con uno o más alquilo C₁₋₃ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de azetidinilo, pirrolidinilo, piperazinilo, y morfolinilo; en donde el azetidinilo, pirrolidinilo, piperazinilo y morfolinilo están
 15 seleccionados de: halógeno, -OR¹¹, -N(R¹¹)₂, -NO₂, y CN.

73. El compuesto o la sal de la reivindicación

72, en donde A se selecciona de



o



74. El compuesto o la sal de la reivindicación 49,
 20 en donde A es carbociclo C₃₋₆, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-N(R^{11})S(O)_2R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$, $-CN$;
 5 alquilo C_{1-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-SR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-S(O)R^{11}$, $-S(O)_2R^{11}$, $-NO_2$,
 10 $=O$, $=S$, $=N(R^{11})$, $-CN$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros; en donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están cada uno opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes
 15 seleccionados de: halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, $=O$, $=N(R^{11})$, y $-CN$.

75. El compuesto o la sal de la reivindicación 69, en donde A es carbociclo C_{3-6} , cualquiera de los cuales está
 20 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, y $-CN$.

76. El compuesto o la sal de la reivindicación 75, en donde A es carbociclo C_3 , cualquiera de los cuales está
 25 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{11}$, $-N(R^{11})_2$, $-C(O)R^{11}$, $-C(O)N(R^{11})_2$, $-N(R^{11})C(O)R^{11}$, $-C(O)OR^{11}$, $-OC(O)R^{11}$, $-NO_2$, y $-CN$.


77. El compuesto o la sal de la reivindicación

5 76, en donde A es  .

78. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 38 a 77, en donde B es carbociclo C_{6-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, CN , y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-C(O)R^{12}$, $-C(O)N(R^{12})_2$, $-N(R^{12})C(O)R^{12}$, $C(O)OR^{12}$, $-OC(O)R^{12}$, $-NO_2$, $=O$, y CN .


15 79. El compuesto o la sal de la reivindicación 78, en donde B se selecciona de ciclohexilo y cicloheptilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-NO_2$, $=O$, CN , y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-NO_2$, $=O$, y CN .

80. El compuesto o la sal de la reivindicación




79, en donde B se selecciona de:


81. El compuesto o la sal de la reivindicación



79, en donde B se selecciona de:



82. El compuesto o la sal de la reivindicación



83. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 77, en donde B es carbociclo C₄₋₁₀ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

15

halógeno, -OR¹², -N(R¹²)₂, -C(O)R¹², -C(O)N(R¹²)₂, -N(R¹²)C(O)R¹², C(O)OR¹², -OC(O)R¹², -NO₂, =O, CN, y carbociclo C₃₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -OR¹², -N(R¹²)₂, -C(O)R¹², -C(O)N(R¹²)₂, -N(R¹²)C(O)R¹², C(O)OR¹², -OC(O)R¹², -NO₂, =O, y CN.


84. El compuesto o la sal de la reivindicación 83,
 en donde B se selecciona de carbociclo monocíclico C₄₋₇,
 carbociclo fusionado C₅₋₁₀, y carbociclo espirocíclico C₅₋₁₀,
 cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con
 5 uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de:

halógeno, -OR¹², -N(R¹²)₂, -C(O)R¹², -
 C(O)N(R¹²)₂, -N(R¹²)C(O)R¹², C(O)OR¹², -
 OC(O)R¹², -NO₂, =O, CN, y

carbociclo C₃₋₆ opcionalmente sustituido con
 10 uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de: halógeno, -OR¹², -N(R¹²)₂,
 -C(O)R¹², -C(O)N(R¹²)₂, -N(R¹²)C(O)R¹²,
 C(O)OR¹², -OC(O)R¹², -NO₂, =O, y CN.


85. El compuesto o la sal de la reivindicación 84,
 15 en donde B se selecciona de ciclobutilo,
 biciclo[3.1.0]hexanilo, y espiro[3.3]heptanilo, cualquiera
 de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno,
 -OR¹², -N(R¹²)₂, -NO₂, =O, CN, y carbociclo C₃₋₆ opcionalmente
 20 sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, -OR¹², -N(R¹²)₂, -NO₂, =O, y CN.

86. El compuesto o la sal de la reivindicación 85,



87. El compuesto o la sal de la reivindicación 84, en donde B se selecciona de ciclobutilo, biciclo[3.1.0]hexanilo, biciclo[5.1.0]octanilo y espiro[3.3]heptanilo, cualquiera de los cuales está
 5 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-NO_2$, $=O$, CN , y carbociclo C_{3-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{12}$, $-N(R^{12})_2$, $-NO_2$, $=O$ y CN .

10 88. El compuesto o la sal de la reivindicación



89. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 77, en donde B es $-CH(R^6)_2$.

90. El compuesto o la sal de la reivindicación 84,
 15 en donde cada R^6 de $-CH(R^6)_2$ se selecciona independientemente de:


halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-NO_2$, $-CN$;

20 alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-$

$N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-NO_2$, $=O$,
 $=S$, $=N(R^{13})$, y CN ; y
 alquilo C_{3-8} opcionalmente sustituido con uno o
 más sustituyentes independientemente
 5 seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-$
 $C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-$
 $N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-NO_2$, $=O$,
 $=S$, $=N(R^{13})$, $-CN$; alquilo C_{1-6} opcionalmente
 sustituido con uno o más sustituyentes
 10 independientemente seleccionados de halógeno,
 $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)R^{13}$, $-C(O)N(R^{13})_2$, $-$
 $N(R^{13})C(O)R^{13}$, $-N(R^{13})S(O)_2R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$, $-$
 $OC(O)R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{13})$, y $-CN$.

91. El compuesto o la sal de la reivindicación
 15 90, en donde cada R^6 de $-CH(R^6)_2$ se selecciona
 independientemente de carbociclo C_{3-7} saturado
 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
 independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{13}$, $-$
 $N(R^{13})_2$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido
 20 con uno o más sustituyentes independientemente
 seleccionados de: halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-NO_2$, y $-CN$.

92. El compuesto o la sal de la reivindicación

91, en donde $-CH(R^6)_2$ es .

93. El compuesto o la sal de la reivindicación 90, en donde cada R^6 de $-\text{CH}(R^6)_2$ se selecciona independientemente de:



alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno
5 o más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, $-\text{OR}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{13}$, $\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{13})$, y CN ; y
10 alquilo C_{3-8} opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, $-\text{OR}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$,
15 $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{13})$, $-\text{CN}$; alquilo C_{1-6} opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes
independientemente seleccionados de halógeno,
 $-\text{OR}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{13})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{C}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{13}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{13}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{13}$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{13})$, y $-\text{CN}$.
20

94. El compuesto o la sal de la reivindicación 92, en donde cada R^6 de $-\text{CH}(R^6)_2$ se selecciona independientemente de:

alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno
25 o más sustituyentes independientemente

seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-NO_2$, $=O$, y CN ; y carbociclo C_{3-8} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-C(O)OR^{13}$, $-OC(O)R^{13}$, $-NO_2$, $=O$, $=S$, $=N(R^{13})$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{13}$, $-N(R^{13})_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

95. El compuesto o la sal de la reivindicación



96. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 95, en donde R^1 se selecciona de hidrógeno, halógeno, $-OR^{14}$, $-SR^{14}$, $-N(R^{14})_2$, $-C(O)R^{14}$, $-C(O)N(R^{14})_2$, $-N(R^{14})C(O)R^{14}$, $-N(R^{14})S(O)_2R^{14}$, $-C(O)OR^{14}$, $-OC(O)R^{14}$, $-S(O)R^{14}$, $-S(O)_2R^{14}$, $-NO_2$, y $-CN$.

97. El compuesto o la sal de la reivindicación 96, en donde R^1 es hidrógeno.


98. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 97, en donde R² se selecciona de:

5 hidrógeno, halógeno, -OR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -
 C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -
 N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -NO₂, CN;
 alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o
 más sustituyentes independientemente
 seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -
 C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -
10 N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -NO₂, =O,
 CN; y
 heterociclo saturado de 3 a 10 miembros
 opcionalmente sustituido con uno o más
 sustituyentes independientemente
15 seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -
 C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -
 N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -NO₂, =O,
 y -CN.

99. El compuesto o la sal de la reivindicación
20 98, en donde R² es hidrógeno.

100. El compuesto o la sal de la reivindicación
98, en donde R² se selecciona de metilo, etilo, propilo e
isopropilo, cada uno de los cuales está opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes independientemente
25 seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -NO₂, =O, y -CN.

101. El compuesto o la sal de la reivindicación

100, en donde R^2 se selecciona de  y .

102. El compuesto o la sal de la reivindicación

100, en donde R^2 es .

5 103. El compuesto de la reivindicación 100, en donde es R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo, e isopropilo.

104. El compuesto o la sal de la reivindicación

100, en donde R^2 se selecciona de  y .

10 105. El compuesto o la sal de la reivindicación 98, en donde R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo, isopropilo, y terc-butilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-NO_2$,
15 $=O$, y $-CN$.




106. El compuesto o la sal de la reivindicación




105, en donde R^2 es .

 107. El compuesto o la sal de la reivindicación 98, en donde R^2 se selecciona de metilo, etilo, propilo,
20 isopropilo y terc-butilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

independientemente seleccionados de halógeno, $-N(R^{15})_2$, $-OR^{15}$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

108. El compuesto o la sal de la reivindicación


107, en donde R^2 se selecciona de , , ,

5 , , y .

109. El compuesto o la sal de la reivindicación 98, en donde R^2 es heterociclo saturado de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

110. El compuesto o la sal de la reivindicación 109, en donde R^2 se selecciona de tetrahidropiraniilo, morfolinilo, 2-oxa-5-azabicyclo[2,2,1]heptaniilo, 6-oxa-3-azabicyclo[3,1,1]heptaniilo, 8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octaniilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.

111. El compuesto o la sal de la reivindicación


20 110, en donde R^2 es .

112. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 97, en donde R² es heterociclo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), y -CN.

113. El compuesto o la sal de la reivindicación 112, en donde R² se selecciona de heterociclo monocíclico de 3 a 8 miembros y heterociclo bicíclico de 5 a 10 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), -CN; y alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁵, -SR¹⁵, -N(R¹⁵)₂, -C(O)R¹⁵, -C(O)N(R¹⁵)₂, -N(R¹⁵)C(O)R¹⁵, -N(R¹⁵)S(O)₂R¹⁵, -C(O)OR¹⁵, -OC(O)R¹⁵, -S(O)R¹⁵, -S(O)₂R¹⁵, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁵), y -CN.

114. El compuesto o la sal de la reivindicación 113, en donde R^2 es heterociclo monocíclico de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.

115. El compuesto o la sal de la reivindicación 114, en donde R^2 se selecciona de




116. El compuesto o la sal de la reivindicación 113, en donde R^2 es heterociclo monocíclico de 3 a 8 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, $=O$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-$






$N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.

117. El compuesto o la sal de la reivindicación


116, en donde R^2 se selecciona de



5




10



118. El compuesto o la sal de la reivindicación 113, en donde R^2 es heterociclo bicíclico de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.


119. El compuesto o la sal de la reivindicación





120. El compuesto o la sal de la reivindicación 118, en donde R^2 es heterociclo en puente de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-$


$C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$,
y $-CN$.



121. El compuesto o la sal de la reivindicación

120, en donde R^2 se selecciona de ,

5 , y .

122. El compuesto o la sal de la reivindicación



120, en donde R^2 se selecciona de ,

, y .



123. El compuesto o la sal de la reivindicación



10 118, en donde R^2 es heterociclo espirocíclico de 5 a 10
miembros opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes independientemente seleccionados de
halógeno, $-OR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-$
15 $N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, $-CN$; y alquilo C_{1-}
6 opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-$
 $N(R^{15})_2$, $-C(O)R^{15}$, $-C(O)N(R^{15})_2$, $-N(R^{15})C(O)R^{15}$, $-C(O)OR^{15}$, $-$
 $OC(O)R^{15}$, $-NO_2$, y $-CN$.

124. El compuesto o la sal de la reivindicación

123, en donde R^2 se selecciona de  y .

125. El compuesto o la sal de la reivindicación

123, en donde R^2 se selecciona de , ,


5 , y .

126. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 97, en donde R^2 se selecciona de carbociclo C_{3-10} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-NO_2$, $=O$, $-CN$; y alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$.


127. El compuesto o la sal de la reivindicación 126, en donde R^2 es carbociclo C_{3-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, $-NO_2$, $=O$, $-CN$; y alquilo C_{1-3} opcionalmente sustituido con uno o más

sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{15}$, $-SR^{15}$, $-N(R^{15})_2$, y $-CN$.

128. El compuesto o la sal de la reivindicación



5 129. El compuesto o la sal de la reivindicación



130. El compuesto o la sal de la reivindicación

98, en donde R^2 es $-N(R^{15})_2$.

131. El compuesto o la sal de la reivindicación

10 120, en donde R^2 es $-N(R^{15})_2$ en donde cada R^{15} se selecciona independientemente en cada caso de:



alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -haloalquilo C_{1-6} , $-NH_2$, $-NO_2$, $=O$, $-CN$,
15 carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros, en donde cada carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos con uno o más
20 sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, $-OH$, $-O$ -alquilo C_{1-6} , $-O$ -haloalquilo C_{1-6} , $-NH_2$, $-NO_2$, $=O$, y $-CN$; y


carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN.

132. El compuesto o la sal de la reivindicación 121, en donde R² es -N(R¹⁵)₂ en donde cada R¹⁵ se selecciona independientemente en cada caso de:


alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -O-alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂-NO₂, =O, y -CN; y carbociclo C₃₋₆ y heterociclo de 4 a 6 miembros, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de: halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN.

133. El compuesto o la sal de la reivindicación

122, en donde R² se selecciona de , ,



134. El compuesto o la sal de la reivindicación



135. El compuesto o la sal de la reivindicación

82, en donde R² es -OR¹⁵, en donde R¹⁵ se selecciona

5 independientemente en cada caso de:

alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno
más sustituyentes independientemente
seleccionados de halógeno, -O-alquilo C₁₋₆, -O-
haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, -CN,
10 carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
miembros, en donde cada carbociclo C₃₋₁₀ y
heterociclo de 3 a 10 miembros están
opcionalmente sustituidos con uno o más
sustituyentes independientemente
15 seleccionados de: halógeno, -OH, -O-alquilo C₁₋₆,
-O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN; y
carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3 a 10
miembros opcionalmente sustituido con uno o
más sustituyentes independientemente
20 seleccionados de: halógeno, -OH, -O-alquilo
C₁₋₆, -O-haloalquilo C₁₋₆, -NH₂, -NO₂, =O, y -CN.

136. El compuesto o la sal de la reivindicación



137. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 49 a 136, en donde n es 1.

138. El compuesto o la sal de la reivindicación 137, en donde cada R³ y R⁴ se selecciona independientemente de hidrógeno, halógeno, -OR¹⁶, -SR¹⁶, -N(R¹⁶)₂, -C(O)R¹⁶, -C(O)N(R¹⁶)₂, -N(R¹⁶)C(O)R¹⁶, -N(R¹⁶)S(O)₂R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -OC(O)R¹⁶, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -NO₂, y -CN.

139. El compuesto o la sal de la reivindicación 138, en donde cada R³ y R⁴ es hidrógeno.

140. El compuesto o la sal de una cualquiera de las reivindicaciones 19 a 139, en donde p se selecciona de 1 y 2.

141. El compuesto o la sal de la reivindicación 140, en donde cada R⁵ se selecciona independientemente en cada caso de:

halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, CN; y

alquilo C₁₋₆ opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)S(O)₂R¹⁷, C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁷), y CN.

142. El compuesto o la sal de la reivindicación 141, en donde cada R^5 se selecciona independientemente en cada caso de alquilo C_{1-6} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, $-OR^{17}$, $-N(R^{17})_2$, $-C(O)R^{17}$, $-C(O)N(R^{17})_2$, $-NO_2$, $=O$, y CN.


143. El compuesto o la sal de la reivindicación 142, en donde cada R^5 se selecciona independientemente en cada caso de metilo, etilo, propilo, e isopropilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más halógenos, $-OR^{17}$, $-N(R^{17})_2$, y $-CN$.

144. El compuesto o la sal de la reivindicación 143, en donde R^5 es $-CF_3$.


145. El compuesto o la sal de la reivindicación 141, en donde cada R^5 se selecciona independientemente en cada caso de halógeno, $-OR^{17}$, $-SR^{17}$, $-N(R^{17})_2$, $-C(O)R^{17}$, $-NO_2$, y $-CN$.

146. El compuesto o la sal de la reivindicación 145, en donde R^5 es $-F$.

147. El compuesto o la sal de una cualquiera de las





reivindicaciones 23 a 146, en donde se selecciona








148. El compuesto o la sal de la reivindicación 23,

5 en donde el compuesto de la Fórmula (I) se selecciona de:










, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

149. El compuesto o la sal de la reivindicación 1, en donde el compuesto de la Fórmula (I') se selecciona de un
5 compuesto de la Tabla 1, o sales farmacéuticamente aceptables de este.


150. Un compuesto de la fórmula:



10


o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

151. El compuesto de la reivindicación 150 de la fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

152. El compuesto de la reivindicación 151 de la
5 fórmula:




153. El compuesto de la reivindicación 150 de la
10 fórmula:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

154. El compuesto de la reivindicación 150 de la fórmula:


5



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

155. Un compuesto de la fórmula:


10



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


156. El compuesto de la reivindicación 155 de la fórmula:

15




o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

157. El compuesto de la reivindicación 156 de la
5 fórmula:




158. Un compuesto de la fórmula:

10



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

159. El compuesto de la reivindicación 158 de la fórmula



5

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


160. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 159 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

161. Un método para modular la IL-17A en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto un compuesto o una sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 159 o una composición farmacéutica de la reivindicación 160.

162. Un método para tratar una enfermedad o afección inflamatoria que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un compuesto o una sal de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 159 o una composición farmacéutica de la reivindicación 160.


163. El método de la reivindicación 162, en donde la enfermedad o afección inflamatoria se selecciona de psoriasis en placas, psoriasis guttata, psoriasis inversa, psoriasis pustulosa, psoriasis eritrodérmica, artritis
5 psoriásica, espondilitis anquilosante, hidradenitis supurativa, artritis reumatoide, psoriasis palmoplantar, espondiloartritis, y uveítis no infecciosa.

164. Un método para tratar una enfermedad inflamatoria o una afección inflamatoria seleccionada del
10 grupo que consiste en espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, psoriasis eritrodérmica, psoriasis guttata, hidradenitis supurativa, psoriasis inversa, uveítis no infecciosa, psoriasis palmoplantar, psoriasis en placas, psoriasis pustulosa, artritis reumatoide y
15 espondiloartritis, en donde el método comprende administrar a un sujeto que lo necesita un compuesto de la




fórmula: , o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

165. El método de la reivindicación 164, en donde
20 el compuesto es




166. Un método para tratar la psoriasis, que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un




5 compuesto de la fórmula: , o una sal farmacéuticamente aceptable.

167. El método de la reivindicación 166, en donde el compuesto es




168. Un método para tratar la artritis psoriásica, que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un




compuesto de la fórmula: , o una sal farmacéuticamente aceptable.

5 169. El método de la reivindicación 168, en donde el compuesto es



10 170. Un método para la espondilitis anquilosante, que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un



compuesto de la fórmula: , o una sal farmacéuticamente aceptable.

171. El método de la reivindicación 170, en donde el compuesto es

5

