

REIVINDICACIONES

1. Una forma de dosificación parenteral que comprende:
una solución acuosa estable, estéril y lista para inyectar que comprende:
 - (i) Cetrorelix, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en una cantidad de 0,25 mg/ml,
 - (ii) ácido láctico para ajustar el pH en el intervalo de 3 a 5,
 - (iii) un agente osmótico, y
 - (iv) agua para inyección.
2. La forma de dosificación parenteral de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende un dispositivo de inyección que tiene un depósito que contiene la solución acuosa estable, estéril, lista para inyectar está presente en el depósito de un dispositivo de inyección.
3. La forma de dosificación parenteral de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el dispositivo de inyección es una jeringa precargada.
4. La forma de dosificación parenteral de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el dispositivo de inyección es un autoinyector.
5. La forma de dosificación parenteral de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el dispositivo de inyección es un autoinyector de lápiz.
6. La forma de dosificación parenteral según la reivindicación 1, en la que la sal farmacéuticamente aceptable es acetato de cetrorelix.
7. La forma de dosificación parenteral según la reivindicación 1, en la que el agente osmótico es manitol.
8. La forma de dosificación parenteral según la reivindicación 7, en la que la solución acuosa contiene entre 40,0 mg/ml y 60,0 mg/ml de manitol.
9. La forma de dosificación parenteral según la reivindicación 1, en la que la solución acuosa está libre de uno o todos los agentes complejantes, codisolventes, conservantes y antioxidantes.