


REIVINDICACIONES

[Reivindicación 1]

Un compuesto representado por la fórmula (1):

[Fórmula 1]



en donde

R₄ se selecciona del grupo que consiste en aril C₆-C₁₀ opcionalmente sustituido (R_{4A}), heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido y heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido (R_{4HA});

R₅ y R₆, junto con los átomos a los que están unidos, forman un Anillo D opcionalmente sustituido;

el Anillo D se selecciona del grupo que consiste en un anillo cicloalifático monocíclico de 3 a 10 miembros, un anillo benceno, un anillo heterocíclico monocíclico de 3 a 12 miembros y un anillo heterocíclico aromático monocíclico de 5 a 6 miembros (D_{HA}); y

dos sustituyentes adyacentes cualquiera en el Anillo D, junto con los átomos a los que están unidos, pueden formar el Anillo E opcionalmente sustituido;

o una de sus sales o solvatos.

[Reivindicación 2]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el Anillo D es un anillo benceno o un anillo heterocíclico aromático monocíclico de 5 a 6 miembros (D_{HA}).

[Reivindicación 3]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde

el Anillo D no está sustituido o está sustituido con uno o más R_D ;

cada uno de uno o más R_D se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 -tio, acilo C_1-C_6 -amino, monoalquilo C_1-C_6 -amino, alquilo C_1-C_6 -sulfonilamino, cicloalquilo C_3-C_8 -sulfonilamino, alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , hidroxialcoxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_6 , heterociclilo de 4 a 10 miembros-alcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , heterocicliलोxi de 4 a 10 miembros, acilo C_1-C_6 , monocicloalquilo C_3-C_8 -aminocarbonilo, aminocarbonilo cíclico de 4 a 8 miembros, dialquilo C_1-C_6 -fosforilo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , dialquilo C_1-C_6 -aminocarbonilalquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , hidroxialqueno C_2-C_6 , alquino C_2-C_6 , hidroxialquino C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros; y

el alquilo C_1-C_6 -tio, alcoxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_6 , heterociclilo de 4 a 10 miembros-alcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , heterocicliलोxi de 4 a 10 miembros, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos, de modo independiente, con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , oxo, haloalquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 .

[Reivindicación 4]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde

el Anillo D no está sustituido o está sustituido con uno o más R_D ; y

cada uno de uno o más R_D se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , cicloalquil C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , alquil C_1-C_6 , haloalquil C_1-C_6 , cicloalquil C_3-C_8 -alquil C_1-C_6 y cicloalquil C_3-C_8 .

[Reivindicación 5]


El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde dos sustituyentes adyacentes cualquiera en el Anillo D, junto con los átomos a los que están unidos, forman un Anillo E opcionalmente sustituido.

[Reivindicación 6]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde

el Anillo D y el Anillo E forman un biciclo representado por la siguiente fórmula:

[Fórmula 2]




en donde * representa un carbono al que se une R_5 en la fórmula (1) y ** representa un carbono al que se une R_6 en la fórmula (1); el Anillo D se menciona como "Anillo D" y el Anillo E se menciona

como "Anillo E" en la fórmula.

[Reivindicación 7]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la fórmula (2):

[Fórmula 3]



en donde

R_4 se selecciona del grupo que consiste en aril C_6-C_{10} opcionalmente sustituido (R_{4A}), heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido y heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido (R_{4HA});

X_5 es CR_{x5} o N;

X_6 es CR_{x6} o N;

X_{10a} es CR_{x10a} o N;

cada uno de R_{x5} , R_{x6} , R_{6a} y R_{x10a} se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, tio, amino, alcoxi C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 -tio, carbonilo, carboxi, sulfonilo, fosforilo, borilo, alquil C_1-C_6 , alquenil C_2-C_6 , alquinil C_2-C_6 , cicloalquil C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, aril C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros;

el hidroxilo, tio, amino, alcoxi C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 -tio, carbonilo, carboxi, sulfonilo, fosforilo, borilo, alquil C_1-C_6 , alquenil C_2-C_6 , alquinil C_2-C_6 , cicloalquil C_3-C_8 , heterociclilo de

4 a 10 miembros, aril C₆-C₁₀ y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos; y

R_{x5} y R_{x6}, R_{x6} y R_{6a} o R_{6a} y R_{x10a}, junto con los átomos a los que están unidos, pueden formar el Anillo E opcionalmente sustituido.

[Reivindicación 8]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 7, en donde

X₅ es CH;

X₆ es CR_{x6}; y

X_{10a} es CR_{x10a}.

[Reivindicación 9]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 7 u 8, en donde R_{6a} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, haloalcoxi C₁-C₆ y alquil C₁-C₆.

[Reivindicación 10]


El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, en donde R_{x10a} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquil C₁-C₆, alquenil C₂-C₆, alquinil C₂-C₆ y cicloalquil C₃-C₈.

[Reivindicación 11]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10, en donde

el Anillo E está representado por la siguiente fórmula:

[Fórmula 4]



en donde * representa un carbono al que se une R_{6a} en la

fórmula (2) y ** representa un carbono al que se une R_{x10a} en la fórmula (2); el Anillo E se menciona como "Anillo E" en la fórmula.

[Reivindicación 12]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en donde


el Anillo E no está sustituido o está sustituido con uno o más R_E ; y

cada uno de uno o más R_E se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, alcoxi C_1-C_6 , borilo y alquil C_1-C_6 .

[Reivindicación 13]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 1 o 7, en donde el compuesto está representado por la fórmula (3):

[Fórmula 5]



en donde

R_4 se selecciona del grupo que consiste en aril C_6-C_{10} opcionalmente sustituido (R_{4A}), heterociclilo de 4 a 10 miembros opcionalmente sustituido y heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido (R_{4HA});

X_5 es CR_{x5} o N;

X_6 es CR_{x6} o N;

X_7 es CR_{x7} o N;

X_8 es CR_{x8} o N;

X_9 es CR_{x9} o N;

X_{10} es CR_{x10} o N;

cada uno de R_{x5} , R_{x6} , R_{x7} , R_{x8} , R_{x9} y R_{x10} se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en hidrógeno, deuterio, halógeno, ciano, nitro, hidroxilo, tio, amino, alcoxi C_1-C_6 , alquilo C_1-C_6 -tio, carbonilo, carboxi, sulfonilo, fosforilo, borilo, alquilo C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , alquino C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros; y

el hidroxilo, tio, amino, alcoxi C_1-C_6 , alquilo C_1-C_6 -tio, carbonilo, carboxi, sulfonilo, fosforilo, borilo, alquilo C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , alquino C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos.

[Reivindicación 14]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 13, en donde

X_5 es CH;

X_6 es CR_{x6} ;

X_7 es CR_{x7} o N;

X_8 es CR_{x8} o N;

X_9 es CR_{x9} o N; y

X_{10a} es CR_{x10a} o N.

[Reivindicación 15]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 13 o 14, en donde

X_7 es N, X_8 es CR_{x8} , X_9 es CR_{x9} y X_{10} es CR_{x10} , o

X_7 es CR_{x7} , X_8 es N, X_9 es CR_{x9} y X_{10} es CR_{x10} , o

X_7 es CR_{x7} , X_8 es CR_{x8} , X_9 es N y X_{10} es CR_{x10} , o

X_7 es CR_{x7} , X_8 es CR_{x8} , X_9 es CR_{x9} y X_{10} es N, o

X_7 es N, X_8 es CR_{x8} , X_9 es CR_{x9} y X_{10} es N, o

X_7 es CR_{x7} , X_8 es N, X_9 es CR_{x9} y X_{10} es N, o

X_7 es N, X_8 es CR_{x8} , X_9 es CR_{x9} y X_{10} es CR_{x10} .

[Reivindicación 16]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 15, en donde

R_{x6} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 -tio, acilo C_1-C_6 -amino, monoalquilo C_1-C_6 -amino, alquilo C_1-C_6 -sulfonilamino, cicloalquilo C_3-C_8 -sulfonilamino, alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 , hidroxialcoxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_6 , heterociclilo de 4 a 10 miembros-alcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , heterociclioxi de 4 a 10 miembros, acilo C_1-C_6 , monocicloalquilo C_3-C_8 -aminocarbonilo, aminocarbonilo cíclico de 4 a 8 miembros, dialquilo C_1-C_6 -fosforilo, alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , dialquilo C_1-C_6 -aminocarbonilo alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 , alqueno C_2-C_6 , hidroxialqueno C_2-C_6 , alquino C_2-C_6 , hidroxialquino C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros; y

el alquilo C_1-C_6 -tio, alcoxi C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 -alcoxi C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alcoxi C_1-C_6 , heterociclilo de 4 a 10 miembros-alcoxi C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 , heterociclioxi de 4 a 10 miembros, alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 -alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , heterociclilo de 4 a 10 miembros, arilo C_6-C_{10} y heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos, de modo independiente, con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , oxo, haloalquilo C_1-C_6 y cicloalquilo C_3-C_8 .

[Reivindicación 17]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con

cualquiera de las reivindicaciones 7 a 16, en donde R_{x6} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, metoxi, etoxi, propoxi, propan-2-ilo, 3-metilbutoxi, [(2S)-butan-2-il]oxi, [(2R)-butan-2-il]oxi, metilo, etilo, propilo, propan-2-ilo, 2-metilpropilo, butan-2-ilo, 3-metilbutilo, pentan-3-ilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo, 1-metilciclopropilo, 3,3-dimetilciclobutilo y espiro[2.3]hexan-5-ilo.

[Reivindicación 18]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 17, en donde R_{x7} es hidrógeno, halógeno, alcoxi C_1-C_6 o alquil C_1-C_6 .

[Reivindicación 19]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, en donde R_{x8} es hidrógeno, halógeno, alcoxi C_1-C_6 o alquil C_1-C_6 .

[Reivindicación 20]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19, en donde R_{x9} se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, alcoxi C_1-C_6 , alquil C_1-C_6 y borilo.

[Reivindicación 21]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 20, en donde R_{x10} es hidrógeno, halógeno, alcoxi C_1-C_6 o alquil C_1-C_6 .

[Reivindicación 22]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en donde R_4 es heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido (R_{4HA}).

[Reivindicación 23]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la

reivindicación 22, en donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros (R_{4HA}) se selecciona del grupo que consiste en pirimidilo, bencimidazolilo, indolilo, indazolilo y pirazolopiridilo.

[Reivindicación 24]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con la reivindicación 22 o 23, en donde

el heteroarilo de 5 a 10 miembros (R_{4HA}) no está sustituido o está sustituido con uno o más R_a ; y

cada uno de uno o más R_a se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, amino, alquil C_1-C_6 , haloalquil C_1-C_6 , hidroxialquil C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , haloalcoxi C_1-C_6 y alquilsulfonilamino.

[Reivindicación 25]

El compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 22 a 24, en donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros (R_{4HA}) es 1H-indazol-4-ilo o 1H-indazol-4-ilo sustituido con uno o más halógenos.

[Reivindicación 26]

Un compuesto seleccionado de los siguientes compuestos:

3-amino-7-cloro-6-ciclopropil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-benzo[h]quinolin-2-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-benzo[h]quinolin-2-ona,

3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-benzo[h]quinolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-ciclopropil-1H-benzo[h]quinolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-benzo[h]quinolin-2-ona,

3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-propan-2-il-1H-1,7-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-propan-2-iloxi-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-ciclopropil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-ciclobutil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-etil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(5-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(5-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

(S)-3-amino-6-ciclopropil-4-(5-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-etil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-6-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-etoxi-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-6-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-propan-2-iloxi-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-6-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-ciclopropil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(7-cloro-6-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-

fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metoxi-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-propoxi-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-metoxi-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-etoxi-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-propan-2-iloxi-
1H-1,7-fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-cloro-1H-indazol-4-il)-6-metoxi-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-cloro-6-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metoxi-1H-
1,7-fenantrolin-2-ona,
3-amino-6-etoxi-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-6-ciclopropil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-6-etil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-6-ciclobutil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metoxi-1H-1,10-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-6-ciclopropil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,10-
fenantrolin-2-ona,
3-amino-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,10-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-etil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,10-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-9-fluoro-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metoksi-1H-

1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-9-fluoro-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-

1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-9-fluoro-6-metoksi-

1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-9-fluoro-6-metil-

1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

8-amino-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-5-metoksi-10H-

pirido[2,3-f]quinoxalin-9-ona,

8-amino-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-5-propan-2-iloksi-10H-

pirido[2,3-f]quinoxalin-9-ona,

8-amino-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-5-metil-10H-pirido[2,3-

f]quinoxalin-9-ona,

8-amino-5-ciclopropil-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-10H-

pirido[2,3-f]quinoxalin-9-ona,

8-amino-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-5-metil-10H-pirido[3,2-

h]quinazolin-9-ona,

8-amino-5-ciclopropil-7-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-10H-

pirido[3,2-h]quinazolin-9-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,8-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5,6-dimetil-1H-1,7-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5-

metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5-metil-1H-1,7-

fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5-fluoro-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-ciclopropil-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5-fluoro-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(6,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-5-fluoro-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(5,7-difluoro-1H-indazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-6-metil-4-(1H-pirazolo[4,3-c]piridin-4-il)-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

3-amino-4-(1H-benzotriazol-4-il)-6-metil-1H-1,7-fenantrolin-2-ona, and

3-amino-6-(ter-butil)-4-(7-fluoro-1H-indazol-4-il)-1H-1,7-fenantrolin-2-ona,

o una de sus sales o solvatos.

[Reivindicación 27]

Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26 o una de sus sales o solvatos, como un ingrediente activo.

[Reivindicación 28]

Una composición farmacéutica para tratar o prevenir un cáncer en un paciente oncológico en el que se ha detectado positividad de la mutación del gen RB1, o expresión disminuida del gen o proteína RB1, en combinación con un agente quimioterapéutico, en donde la composición farmacéutica comprende un inhibidor de MYT1 como ingrediente activo,

en donde el inhibidor de MYT1 es el compuesto o una de sus sales o solvatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26.

