


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):




Compuesto I

que es 4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-il)metil)-5-(2,4-difluorofenil)tetrahidrofuran-3-il)metoxi)-3-metilfenil)piperazin-1-il)-N-(4-fluorofenil)benzamida en una forma cristalina en la que la forma cristalina es la Forma polimórfica 1, y en donde la forma cristalina tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo que contiene siete picos en 7,0, 7,4, 7,9, 18,2, 19,7, 20,8, y 24,7 grados 2-theta ($\pm 0,2$) medido utilizando radiación Cu K α .

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la forma cristalina tiene dimensiones de celda unitaria de 16,80 Å, 23,58 Å y 25,58 Å, y ángulos α , β y γ de 90°.

3. Un compuesto de la Fórmula (I):



Compuesto I

que es 4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-il)metil)-5-(2,4-difluorofenil)tetrahidrofuran-3-il)metoxi)-3-metilfenil)piperazin-1-il)-N-(4-fluorofenil)benzamida en una forma cristalina en la que la forma cristalina es la Forma polimórfica 2, y en donde la forma cristalina tiene un patrón de difracción de rayos X en polvo que contiene seis picos en 10,8, 17,0, 20,3, 22,7, 23,9 y 24,3 grados 2-theta ($\pm 0,2$) medido utilizando radiación Cu K α .

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 3, en donde la forma cristalina tiene dimensiones de celda unitaria de 16,81 Å, 5,65 Å y 35,56 Å, y un ángulo α de 90°, un ángulo β de 101,54° y un ángulo γ de 90°.

5. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el compuesto está en forma de partículas suspendidas en un medio acuoso y la concentración del compuesto es de 1 a 10 mg/mL.

6. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 5, en donde el medio acuoso comprende 95% de agua.
7. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 6, en donde el medio acuoso comprende un agente de ajuste de la tonicidad cargado, el cual es cloruro de sodio.
8. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 6 o la Reivindicación 7, en donde el medio acuoso comprende un cosolvente, el cual es propilenglicol.
9. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 6 a 8, en donde el medio acuoso comprende un tensioactivo, el cual es fosfatidilcolina.
