


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto tal como se muestra en la fórmula (I), un isómero óptico de este o una sal farmacéuticamente aceptable de este,



en donde,

T₁ se selecciona de N o C(R₇);

T₂ se selecciona de N o C(R₈);

T₃ se selecciona de N o C(R₉);


T₄ se selecciona de N o C(R₁₀);

R₁, R₂, R₈, R₉ se seleccionan cada uno independientemente de H, halógeno, OH, NH₂, CN, SF₅, alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, vinil-alquil C₁₋₆-, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3-6 miembros, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₆-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₆-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₆-O-, fenil-alquil C₁₋₃-, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₃-O-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-NH-, heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-, heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-O- y heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-NH-, el alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, alquilamino C₁₋₆, vinil-alquil C₁₋₆-, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3-6 miembros, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₆-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₆-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₆-O-, fenil-alquil C₁₋₃-, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₃-O-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-NH-, heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-, heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-O- o heteroaril de 5-6 miembros-alquil C₁₋₃-NH- está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R;

y, cuando T₃ se selecciona de N, R₁ no es H;

R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_{10} se seleccionan cada uno independientemente de H, halógeno, OH, NH_2 , SF_5 , CN, alquilo C_{1-6} , alquilamino C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , -O-(cicloalquilo C_{3-6}), heterocicloalquilo de 3-6 miembros, (cicloalquil C_{3-6})-(alquil C_{1-6})- y heterocicloalquil de 3-6 miembros-(alquil C_{1-6})-, el alquilo C_{1-6} , alquilamino C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , cicloalquilo C_{3-6} , -O-(cicloalquilo C_{3-6}), heterocicloalquilo de 3-6 miembros, (cicloalquil C_{3-6})-(alquil C_{1-6})- o heterocicloalquil de 3-6 miembros-(alquil C_{1-6})- está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R;

R_7 se selecciona de H, F, Cl, Br, I, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} y alquilamino C_{1-6} , el alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} o alquilamino C_{1-6} está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R;


L_1 se selecciona de C(=O), NH y  ;

L_2 se selecciona de O, S, NH y CH_2 , el CH_2 está sustituido opcionalmente con 1 o 2 R, y NH está sustituido opcionalmente con R;

R_{11} y R_{12} se seleccionan cada uno independientemente de H, halógeno, OH, NH_2 y alquilo C_{1-6} , el alquilo C_{1-6} está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R; o, R_{11} y R_{12} se conectan entre sí para formar un anillo de 3-6 miembros; cada R_{13} se selecciona independientemente de H, halógeno y alquilo C_{1-6} , el alquilo C_{1-6} está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R;

n se selecciona de 1, 2 o 3;

cada R se selecciona independientemente de H, D, halógeno, OH, NH_2 , CN,

, alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} y alquilamino C_{1-6} , el alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , alquiltio C_{1-6} o alquilamino C_{1-6} está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R';

R' se selecciona de F, Cl, Br, I, OH, NH_2 y CH_3 ;

el heterocicloalquilo de 3-6 miembros o heteroarilo de 5-6 miembros contiene 1, 2 o 3 heteroátomos o grupos de heteroátomos seleccionados independientemente de -O-, -NH-, -S-, -C(=O)-, -C(=O)O-, -S(=O)-, -S(=O)₂- y N.


2. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R se

selecciona de H, D, F, Cl, Br, I, OH, NH₂, , Me, CF₃, CHF₂, CH₂F, ,  y .


3. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1 o 2, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R₁, R₂, R₈, R₉ se seleccionan cada uno independientemente de H, halógeno, OH, NH₂, CN, SF₅, alquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, alquilamino C₁₋₃, vinil-alquil C₁₋₃-, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3-6 miembros, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₃-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-, fenil-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-NH-, piridil-alquil C₁₋₃-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-, tiofenil-alquil C₁₋₃-, tiazolil-alquil C₁₋₃-, pirazolil-alquil C₁₋₃-, imidazolil-alquil C₁₋₃-, piridil-alquil C₁₋₃-O-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-O-, tiofenil-alquil C₁₋₃-O-, tiazolil-alquil C₁₋₃-O-, pirazolil-alquil C₁₋₃-O-, imidazolil-alquil C₁₋₃-O-, piridil-alquil C₁₋₃-NH-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-NH-, tiofenil-alquil C₁₋₃-NH-, tiazolil-alquil C₁₋₃-NH-, pirazolil-alquil C₁₋₃-NH- e imidazolil-alquil C₁₋₃-NH-, el alquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, alquilamino C₁₋₃, vinil-alquil C₁₋₃-, cicloalquilo C₃₋₆, heterocicloalquilo de 3-6 miembros, cicloalquil C₃₋₆-alquil C₁₋₃-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-, heterocicloalquil de 3-6 miembros-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-, fenil-alquil C₁₋₃-O-, fenil-alquil C₁₋₃-NH-, piridil-alquil C₁₋₃-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-, tiofenil-alquil C₁₋₃-, tiazolil-alquil C₁₋₃-, pirazolil-alquil C₁₋₃-, imidazolil-alquil C₁₋₃-, piridil-alquil C₁₋₃-O-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-O-, tiofenil-alquil C₁₋₃-O-, tiazolil-alquil C₁₋₃-O-, pirazolil-alquil C₁₋₃-O-, imidazolil-alquil C₁₋₃-O-, piridil-alquil C₁₋₃-NH-, pirimidinil-alquil C₁₋₃-NH-, tiofenil-alquil C₁₋₃-NH-, tiazolil-alquil C₁₋₃-NH-, pirazolil-alquil C₁₋₃-NH- o imidazolil-alquil C₁₋₃-NH- está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R.

4. El compuesto tal como se define en la reivindicación 3, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R₁, R₂, R₈, R₉ se seleccionan cada uno independientemente de H, F, Cl, Br, I, OH, NH₂, CN, SF₅, Me, CF₃, CHF₂, CF₃CF₂, CH₂F, OCF₃, HOCH₂CH₂O, CH₃NHCH₂CH₂O,


(CH₃)₂NCH₂CH₂O, , , , , , , , .



5. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1 o 4, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, el








7. El compuesto tal como se define en la reivindicación 6, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_{10} se seleccionan cada uno independientemente de H, F, Cl, Br, I, OH,























resto estructural


se selecciona de













9. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, el resto




10. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R_{11} , R_{12} se seleccionan cada uno independientemente de H, F, Cl, Br, I, OH, NH_2 , Me,




11. El compuesto tal como se define en la reivindicación 1, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, R_{11} y R_{12} se conectan entre sí para formar un ciclopropilo, oxetanilo, azetidino y ciclopentanono.

12. El compuesto tal como se define en la reivindicación 10 u 11, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, L_1 se



13. El compuesto tal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde, el compuesto se selecciona de



en donde,

T₁ es como se define en la reivindicación 1 o 9;

R₁, R₂, T₂, T₃ son como se definen en la reivindicación 1, 3, 4 o 5;

R₃, R₄, R₅, R₆, T₄ son como se definen en la reivindicación 1, 6, 7 u 8;


L₁ es como se define en la reivindicación 1, 10, 11 o 12;

L₂ es como se define en la reivindicación 1;


R_{13a}, R_{13b} se seleccionan cada uno independientemente de H, halógeno y alquilo C₁₋₆, el alquilo C₁₋₆ está sustituido opcionalmente con 1, 2 o 3 R;

R es como se define en la reivindicación 1 o 2.


14. Un compuesto tal como se muestra a continuación en la fórmula, un isómero óptico de este o una sal farmacéuticamente aceptable de este que se selecciona de




P-2022/18947
Reivindicaciones Modificadas
27 de enero de 2023




P-2022/18947
Reivindicaciones Modificadas
27 de enero de 2023




P-2022/18947
Reivindicaciones Modificadas
27 de enero de 2023




P-2022/18947
Reivindicaciones Modificadas
27 de enero de 2023



P-2022/18947
Reivindicaciones Modificadas
27 de enero de 2023





15. Una composición farmacéutica, en donde, la composición farmacéutica comprende el compuesto tal como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, el isómero óptico de este o la sal farmacéuticamente aceptable de este.

16. La composición farmacéutica tal como se define en la reivindicación 15, en donde, la composición farmacéutica comprende además un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.