

RESUMEN

Un compuesto de la Fórmula (I): o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde: X^1 es CH o N; p es 0, 1 o 2; donde: cada R^1 es un sustituyente en cualquier átomo C y se selecciona independientemente de F, Cl, alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} , en donde dicho alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} pueden sustituirse opcionalmente de manera independiente con uno o más F; R^N se selecciona de H y Me; n es 0, 1 o 2; m es 0 o 1; Q^1 es CH o N; cuando n y m son ambos distintos de 0, Q^2 es CH o N; cuando n y m son ambos 0, Q^2 es CH; cuando n es 0 o 1, Q^3 es CH; cuando n es 2 y Q^2 es N, Q^3 es CH; cuando n es 2 y Q^2 es CH, Q^3 es CH u O; R^{2a} y R^{2b} son sustituyentes en el mismo átomo de C o en átomos de C diferentes distintos de Q^1 o Q^2 , cada uno independientemente seleccionado de H, F y alquilo C_{1-3} , o R^{2a} y R^{2b} juntos forman un grupo $-(CH_2)_r-$ donde r es 1, 2 o 3; Q^4 es un enlace único o $-NR^4C(=O)$; R^4 es H o Me; 0, 1 o 2 de Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 y Y^5 es/son N, y son de cualquier otra manera C; cada R^3 es un sustituyente de cualquier átomo C en Y^1 , Y^2 , Y^3 , Y^4 y Y^5 , y se selecciona independientemente de F, Cl, CN, alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} , en donde dicho alquilo C_{1-3} y alcoxi C_{1-3} pueden sustituirse opcionalmente de manera independiente con uno o más F; q es 0, 1 o 2; en donde el Enlazador está unido a cualquier átomo C disponible en Y^4 y Y^5 ; el Enlazador es un marco saturado o

parcialmente o totalmente insaturado que comprende átomos de C y H y al menos un heteroátomo, en donde dicho marco tiene puntos finales de unión 'a' y 'b' y una longitud de 5 a 26 átomos entre 'a' y 'b'; en donde dicho marco puede 5 incluir una o más cadenas lineales y/o ramificadas y/o anillos y está opcionalmente sustituido en cualquier átomo(s) de C disponible(s) por uno o más F; y W es una unidad de unión al cereblon de la ligasa de ubiquitina E3.