


CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Segundo Examen de Fondo)

1. Un polimorfo de la Fórmula (I-491):



en donde el polimorfo es la Forma B de I-491, y

(i) se caracteriza por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con patrón de Cu-K α que tiene picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,2^\circ$ en cada uno de 7,88; 10,20; 15,42; 16,28; 19,02; 20,70 y 26,88 grados; y

(ii) se caracteriza por una endoterma a 185-200°C; y/o

(iii) se caracteriza por una endoterma a 192,7 °C $\pm 2^\circ$ C; y/o

(iv) dimensiones de celda unitaria de a=11,93 Å, b=13,24 Å, c=13,51 Å, $\alpha=65,40^\circ$, $\beta=80,08^\circ$ y $\gamma=89,18^\circ$.

2. El polimorfo de la Reivindicación 1, caracterizado por una endoterma a 185-200°C.

3. El polimorfo de la Reivindicación 1 o 2, caracterizado por una endoterma a 192,7 °C $\pm 2^\circ$ C.

4. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, que tiene dimensiones de celda unitaria de a=11,93 Å, b=13,24 Å, c=13,51 Å, $\alpha=65,40^\circ$, $\beta=80,08^\circ$ y $\gamma=89,18^\circ$.

5. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde el polimorfo tiene una pureza quiral del 99,9%.

6. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α que tiene picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,2^\circ$ en cada uno de 15,24; 17,70; 20,18 y 21,56 grados.

7. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α que tiene picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,2^\circ$ en cada uno de 7,32; 13,40; 18,48 y 25,38 grados.

8. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α que tiene picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,2^\circ$ en cada uno de 10,88; 14,68; 21,98; 22,94; 23,16; 23,86; 24,24; 24,78; 26,40 y 28,74grados.

9. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α sin picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,05^\circ$ en cada uno de 0 a 6,80 y 8,15 a 9,00 grados.
10. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α que carece de picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,05^\circ$ a 0 a 6,80 grados.
11. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, caracterizado por un patrón de difracción de rayos X en polvo obtenido por irradiación con Cu-K α que carece de picos expresados en grados 2-theta $\pm 0,05^\circ$ a 8,15 a 9,00 grados.
12. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, caracterizado por una endoterma a 170-185°C.
13. El polimorfo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde el polimorfo tiene un sistema de cristal triclinico y un grupo espacial de P1.
