


REIVINDICACIONES


1. Un compuesto de bencimidazol de la Fórmula I para el tratamiento de obesidad, diabetes, enfermedad de hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica caracterizado porque la Fórmula I es la siguiente:



Fórmula I

o sales, cristales, hidratos, solvatos, prodrogas o metabolitos del mismo farmacéuticamente aceptables.

2. Composición farmacéutica para el tratamiento de obesidad, diabetes, enfermedad de hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica que comprende un compuesto de bencimidazol de la Fórmula I:



Fórmula I

o sales, cristales, hidratos, solvatos, prodrogas o metabolitos del mismo farmacéuticamente aceptables y excipientes farmacéuticamente aceptables.

3. Composición farmacéutica, de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende 0,01 a 5000 mg del compuesto de bencimidazol de la Fórmula I.

4. Composición farmacéutica, de acuerdo con la reivindicación 2, en donde las sales farmacéuticamente aceptables del compuesto de bencimidazol de la Fórmula I son elegidas de las sales de adición inorgánicas clorhidrato, bromhidrato, sulfato, nitrato, fosfato; de las sales de adición orgánicas acetato, propionato, hexanoato, heptanoato, glicolato, piruvato, lactato, malonato, malato, maleato, fumarato, tartrato, citrato, succinato, mesilato, acistrato, besilato, tosilato, xinafoato, benzoato, p-toluensulfonato, cinnamato, p-clorobencensulfonato, 2-naftalensulfonato, p-toluensulfonato, canforsulfonato, trimetilacetato, t-butilacetato, laurilsulfato, gluconato, glutarato, hidroxinaftoato, salicilato, estearato, muconato, mandelato, 2-hidroxietansulfonato; y de las sales de adición alcalinas de los metales sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, bismuto, bromuro; y de sales farmacéuticamente aceptables con las bases orgánicas aminas primarias, secundarias o terciarias; y sales con los aminoácidos arginina, lisina, histidina, cafeína, procaína, hidrobamina, colina, betaína, etilendiamina, glicosamina, teobromina, purina, morfolina.