

REIVINDICACIONES

1. Un método de desarrollo de una planta *Scabiosa atropurpurea*, el método comprende:
 - (a) cubrir plantas de *Scabiosa atropurpurea* con una cubierta de una película de polietileno que bloquea al menos el 90% de la radiación UV y al menos 40% de radiación PAR;
y
 - (b) seleccionar una planta de dichas plantas que crecen en dicha temperatura que no exceden los 25°C bajo dicha cubierta de dicha película de polietileno que exhibe una inflorescencia que tiene un diámetro mayor, longitud de pedicelo y/o diámetro de pedicelo que el de dichas plantas de *Scabiosa atropurpurea* en la misma etapa de desarrollo y condiciones de crecimiento controlado sin dicha cubierta.
2. El método de la reivindicación 1, en el que dicha inflorescencia comprende un flósculo de rayos que exhibe un aumento en el número de flósculo en comparación con el de dichas plantas *Scabiosa atropurpurea* en la misma etapa de desarrollo y condiciones de crecimiento controlado sin dicha cubierta.
3. El método de la reivindicación 1, en el que dicha inflorescencia comprende un flósculo de disco que exhibe un aumento en el número de flósculo en comparación con el de dichas plantas *Scabiosa atropurpurea* en la misma etapa de desarrollo y condiciones de crecimiento controlado sin dicha cubierta.
4. El método de la reivindicación 2 que comprende seleccionar inflorescencia que tiene un diámetro mayor.
5. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que dicho paso de cubrir se realiza en un invernadero o túnel.
6. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que dicha cubierta bloquea más del 90% de la radiación UV de la radiación solar.
7. El método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, donde dicha selección es

para obtener una planta de *Scabiosa atropurpurea* caracterizada por tener un diámetro de inflorescencia superior a 7 cm; un diámetro del pedicelo superior a 5 mm y una longitud del pedicelo superior a 60 cm.