




Figura 1. Cambios en el peso del ratón (A) y la puntuación DAI (B). $n = 10$ ratones por grupo, los datos se muestran como valores medios $\pm$ SEM, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,005$, **** $p < 0,0001$, versus Vehículo, dos vías-ANOVA, prueba de Dunnet para comparaciones múltiples.




Figura 2. Cambios en el peso del ratón (A) y la puntuación DAI (B). $n = 8$ ratones por grupo, los datos se muestran como valores medios $\pm$ SEM, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,005$, **** $p < 0,0001$, versus Vehículo, dos vías-ANOVA, prueba de Dunnet para comparaciones múltiples.





Figura 3. Células inmunes en sangre completa, n = 5 ratones por grupo, los datos se muestran como valores medios $\pm$ SEM, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,005$, **** $p < 0,0001$, versus Vehículo, dos vías-ANOVA, prueba de Dunnet para comparaciones múltiples.

**FIG. 3.** (Cont.)




Figura 4. Recuento de células T CD4⁺ (A) y puntuación histológica en colon (B). n = 8 ratones por grupo, los datos se muestran como valores medios $\pm$ SEM, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,005, **** p<0,0001, versus Vehículo, dos vías-ANOVA, prueba de Dunnet para comparaciones múltiples.