

REIVINDICACIONES:

1. Una composición que comprende una combinación de insecticida y ácido ortosilícico (H_4SiO_4);

5 en donde el insecticida se selecciona de flonicamida, flonicamida y fipronil, acefato, imidacloprid, acefato e imidacloprid, novalurón, novalurón y lambda cihalotrina, o novalurón y emamectina;

en donde la composición está adaptada para una dosis de:

- 10 - 50 a 100 g/ha de flonicamida y 625 to 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 50 a 100 g/ha de flonicamida, 37,5 a 50 g/ha de fipronil y 625 a 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 730 a 970 g/ha de acefato y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 18,3 a 24,5 g/ha de imidacloprid y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 15 - 390 a 520 g/ha of acefato + imidacloprid y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 56 a 75 g/ha de novalurón y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4);
- 67,5 a 90 g/ha de novalurón + lambda cihalotrina y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4); o
- 20 - 93,5 a 125 g/ha de novalurón + emamectina y 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4).

2. La composición como se reivindica en la reivindicación 1, en donde dicha composición está adaptada para una dosis de:

- 50 a 100 g/ha de flonicamida y 625 to 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4); o
- 50 a 100 g/ha de flonicamida, 37,5 a 50 g/ha de fipronil y 625 a 25 g/ha de ácido ortofosfórico (H_4SiO_4).